This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 06911356 5

Die

organiſche Chemie

in

ihrer Anwendung

auf

Phyſiologie und Pathologie.

Druck und Papier
von Fr. Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Die

organiſche Chemie

in

ihrer Anwendung

11957

auf

Phyſiologie und Pathologie.

Von

Juſtus Liebig,

Dr. der Medizin und Philoſophie,
Profeſſor der Chemie an der Ludwigs-Univerſität zu Gießen,
Ritter des Großherzogl. Heſſiſchen Ludwigsordens und des Kaiſerl. Ruſſiſchen St. Annenordens 3ter Klaſſe,
auswärtiges Mitglied der Königl. Akademie der Wiſſenſchaften zu Stockholm, der Royal Society zu London,
Ehrenmitglied der British association for the advancement of Science, Ehrenmitglied der Königlichen
Akademie zu Dublin, correſpondirendes Mitglied der Königlichen Akademieen der Wiſſenſchaften
zu Berlin, München und St. Petersburg, des Königlichen Inſtitutes zu Amſterdam,
der Königlichen Societät der Wiſſenſchaften zu Göttingen, der
naturforſchenden Geſellſchaft zu Heidelberg ꝛc. ꝛc. ꝛc.

Braunſchweig,

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1842.

4

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
513270B
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1949 L

Meinem Freunde

J. J. Berzelius

als ein Zeichen

inniger Zuneigung und aufrichtiger Hochachtung

gewidmet.

Vorwort.

Durch die Uebertragung der Methoden, welche die Phyſiker ſeit Jahrhunderten in der Ermittelung der Urſachen der Naturerſcheinungen befolgen, auf die Chemie, durch Beachtung von Maß und Gewicht, iſt von Lavoiſier der Grundſtein einer neuen Wiſſenſchaft gelegt worden, welche durch die Pflege ausgezeichneter Männer in außerordentlich kurzer Zeit einen hohen Grad von Vollendung erhalten hat.

Es war die Aufſuchung und das Feſthalten aller Bedingungen, die ſich zu einer Beobachtung vereinigen müſſen, es war die Erkenntniß der richtigeren Grundſätze zu Forſchungen, welche die Chemiker vor Irrthümern ſchützten und ſie auf einem ebenſo einfachen als ſicheren Wege zu Entdeckungen führten, welche in die früher dunkelſten und unbegreiflichſten Naturerſcheinungen Licht und Klarheit brachten.

Die nützlichſten Anwendungen auf Künſte und Induſtrie und alle der Chemie verwandten Zweige des Wiſſens, ergaben ſich aus den von ihnen erforſchten Geſetzen und dieſer Einfluß zeigte ſich nicht erſt, nachdem die Chemie den erreichbaren Grad von Vollendung erhalten hatte, ſondern er machte ſich mit jeder einzelnen neuen Erfahrung geltend.

Alle in den anderen Fächern bereits vorhandenen Erfahrungen und Beobachtungen wirkten in ganz gleicher Weise fördernd, auf die Ausbildung und Entwicklung der Chemie zurück, so daß sie eben so viel von der Metallurgie und Industrie empfing, als sie gegeben hatte; indem sie zusammen an Reichthum zunahmen, bildeten sie sich mit und neben einander aus.

Nach der allmäligen Vervollkommnung der Mineralchemie wandten sich die Arbeiten der Chemiker einer andern Richtung zu; aus der Untersuchung der Bestandtheile der Pflanzen und Thiere sind neue und veränderte Ansichten hervorgegangen; das vorliegende Werk ist ein Versuch zu ihrer Anwendung in der Physiologie und Pathologie.

In früheren Zeiten hat man, in vielen Fällen mit großem Erfolg, die aus der Bekanntschaft mit den chemischen Erfahrungen erworbenen Ansichten auf die Zwecke der Heilwissenschaft anzuwenden versucht; ja, die großen Aerzte, welche zu Ende des siebenzehnten Jahrhunderts lebten, waren die ausschließlichen Kenner und Begründer der Chemie; das phlogistische System der Chemie, mit allen seinen Unvollkommenheiten, erschien als die Morgenröthe eines neuen Tages, es war der Sieg der Philosophie über die roheste Experimentirkunst.

Die neuere Chemie hat mit allen ihren Entdeckungen der Physiologie und Pathologie nur unbedeutende Dienste geleistet, und Niemand kann sich über die Ursache dieser Theilnahmlosigkeit täuschen, wer in Erwägung zieht, daß alle in

dem Gebiete der anorganischen Chemie erworbenen Erfahrungen, die Kenntniß des Verhaltens der einfachen Körper und ihrer in Laboratorien darstellbaren Verbindungen mit dem lebendigen Thierkörper und dem Verhalten seiner Bestandtheile in keine Art von Beziehung gebracht werden konnten.

Die Physiologie nahm keinen Theil an den Fortschritten der Chemie, weil sie lange Zeit hindurch, zu ihrer eigenen Förderung, nichts von dieser Wissenschaft zu empfangen hatte. Dieser Zustand hat sich seit fünfundzwanzig Jahren geändert; allein auch in der Physiologie sind in dieser Zeit neue Wege und Mittel zu Forschungen in ihrem eigenen Gebiete gewonnen worden, und erst mit der Erschöpfung dieser Quellen von Entdeckungen ließ sich einer neuen Richtung in den Arbeiten der Physiologen entgegensehen. Auch diese Zeit liegt uns nahe, und ein Weiterschreiten auf dem eingeschlagenen Wege würde jetzt das Gebiet der Physiologie, aus dem sich sehr bald fühlbar machenden Mangel an frischen Anhaltspunkten zu Forschungen, nur breiter, aber weder tiefer noch gründlicher machen.

Niemand wird den Muth haben zu behaupten, daß die Ermittelung der Formen und der Bewegungserscheinungen nicht nothwendig oder nützlich wäre, sie muß im Gegentheil als durchaus unentbehrlich zur Erkenntniß der Lebensprocesse angesehen werden; allein sie umfaßt nur eine einzige Klasse von Bedingungen zur Erkenntniß, und diese reichen für sich allein nicht dazu hin.

Die Erforschung der Zwecke und Functionen der einzelnen Organe und ihres gegenseitigen Verbandes im Thierkörper, war in früherer Zeit der Hauptgegenstand der physiologischen Untersuchungen; er ist in der neuern Zeit in den Hintergrund getreten. Die größte Masse aller neueren Entdeckungen hat die vergleichende Anatomie weit mehr als die Physiologie bereichert.

Für die Erkennung der ungleichen Formen und Zustände im gesunden und kranken Organismus geben diese Arbeiten ohne Zweifel die werthvollsten Resultate, allein für eine tiefere Einsicht in das Wesen der vitalen Acte bieten sie keine Aufschlüsse dar.

Durch die genaueste, anatomische Kenntniß der Gebilde kann man zuletzt nicht erfahren, zu welchem Zwecke sie dienen, und mit der mikroskopischen Untersuchung der feinsten Verzweigungen der Gefäßnetze wird man nicht mehr von ihren Verrichtungen wissen, als man über den Gesichtssinn durch das Zählen der Flächen auf dem Auge einer Stubenfliege erfahren hat. Die schönste und erhabenste Aufgabe des menschlichen Geistes, die Erforschung der Gesetze des Lebens, kann nicht gelöst, sie kann nicht gedacht werden, ohne eine genaue Kenntniß der chemischen Kräfte, der Kräfte nämlich, die nicht in Entfernungen wirken, die in einer ähnlichen Weise zur Aeußerung gelangen, wie die letzten Ursachen, von welchen die Lebenserscheinungen bedingt werden, die sich überall thätig zeigen, wo sich differente Materien berühren.

Die Pathologie versucht noch heutzutage, wiewohl ganz

nach dem Muſter der phlogiſtiſchen Chemiker (der qualitativen Methode), Anwendung von chemiſchen Erfahrungen zur Beſeitigung von Krankheitszuſtänden zu machen, allein den Urſachen und dem Weſen der Krankheit iſt man mit allen dieſen zahlloſen Verſuchen um keinen Schritt näher gekommen.

Ohne beſtimmte Fragen zu ſtellen, hat man Blut, Harn und alle Beſtandtheile des geſunden und kranken Organismus mit Alkalien und Säuren und allen Arten von chemiſchen Reagentien in Berührung gebracht und aus der Kenntniß der vorgegangenen Aenderungen Rückſchlüſſe auf ihr Verhalten im Körper gemacht.

Auf dieſem Wege konnte der Zufall vielleicht zu nützlichen Heilmitteln führen, allein eine rationelle Pathologie kann auf Reactionen nicht begründet, der lebendige Thierkörper kann nicht für ein chemiſches Laboratorium angeſehen werden.

Bei krankhaften Zuſtänden, in deſſen Folge das Blut eine dickflüſſige Beſchaffenheit erhält, kann dieſe nicht durch eine chemiſche Wirkung auf die in den Blutkanälen circulirende Flüſſigkeit dauernd gehoben werden; die Abſcheidung von Sedimenten im Harn läßt ſich vielleicht durch Alkalien verhindern, ohne daß damit nur entfernt die Krankheitsurſache beſeitigt ſein kann; und wenn man im Typhus unlösliche Ammoniakſalze in den Faeces und eine ähnliche Aenderung der Beſchaffenheit der Blutkörperchen beobachtet, ſo wie ſie durch Ammoniakflüſſigkeit künſtlich im Blute hervorgebracht werden kann, ſo darf deshalb das im Körper vorhandene Ammoniak

nicht als die Urſache, ſondern ſtets nur als der Effect einer Urſache angeſehen werden.

So hat die Medizin, nach dem Vorbilde der ariſtoteliſchen Philoſophie, ſich Vorſtellungen geſchaffen über Ernährung und Blutbildung, man hat die Speiſen claſſificirt in nahrhafte und nichtnahrhafte; aber auf Beobachtungen geſtützt, denen die weſentlichſten Erforderniſſe zu richtigen Schlüſſen mangelten, konnten dieſe Theorien nicht als Ausdrücke der Wahrheit gelten.

In welcher Klarheit erſcheinen uns jetzt die Beziehungen der Speiſen zu den Zwecken, zu welchen ſie im Thierkörper dienen, ſeitdem die organiſche Chemie ihre quantitative Unterſuchungsmethode auf ihre Ermittelung in Anwendung brachte!

Wenn eine magere 4 Pfund wiegende Gans in 36 Tagen, während welchen ſie mit 24 Pfund Welſchkorn (Mays) gemäſtet worden iſt, 5 Pfund über ihr urſprüngliches Gewicht zunimmt und man 3½ Pfund reines Fett aus ihr gewinnt, ſo kann dieſes Fett nicht fertig gebildet in der Nahrung geweſen ſein, da dieſe noch nicht den tauſendſten Theil an Fett oder fettähnlichen Materien enthält. Und wenn eine gewiſſe Anzahl Bienen, deren Gewicht man genau kennt, mit reinem, wachsfreiem Honig gefüttert, für je 20 Theile verbrauchten Honigs einen Theil Wachs liefern, ohne daß ſich ſonſt in ihrem Geſundheitszuſtande oder in ihrem Gewichte etwas ändert, ſo kann man über die Erzeugung von Fett in dem Thierkörper aus Zucker nicht im Zweifel ſein.

Ganz ähnlich wie bei der Entſcheidung der Frage über die Fettbildung, verhält es ſich mit der Erforſchung des Ur-

ſprungs und der Veränderung der Secrete und anderer Erſcheinungen im Thierkörper. Von dem Augenblick, wo man anfängt die Antworten auf Fragen, mit Ernſt und Gewiſſenhaftigkeit zu ſuchen, wo man ſich die Mühe nimmt, durch Maß und Gewicht die Beobachtungen feſtzuhalten und in Gleichungen auszudrücken, ergeben ſich die Antworten von ſelbſt.

Durch eine noch ſo große Anzahl von Beobachtungen, welche nur die eine Seite der Frage erläutern, wird man niemals im Stande ſein, das Weſen einer Naturerſcheinung in ſeiner ganzen Bedeutung zu erforſchen; ſie müſſen nothwendig, wenn ſie Nutzen ſchaffen ſollen, nach einem ganz beſtimmten Zweck und Ziel gerichtet ſein, ſie müſſen einen organiſchen Zuſammenhang beſitzen.

Mit Recht ſchreiben die Phyſiker und Chemiker ihren Forſchungsmethoden den größten Theil des Erfolgs in ihren Arbeiten zu. Jede chemiſche oder phyſikaliſche Arbeit, welche einigermaßen den Stempel der Vollendung an ſich trägt, läßt ſich im Reſultate in wenigen Worten wiedergeben. Allein dieſe wenigen Worte ſind unvergängliche Wahrheiten, zu deren Auffindung zahlloſe Verſuche und Fragen erforderlich waren; die Arbeiten ſelbſt, die mühſamen Verſuche und verwickelten Apparate fallen der Vergeſſenheit anheim, ſobald die Wahrheit ermittelt iſt; es ſind die Leitern, die Schachte und Werkzeuge, welche nicht entbehrt werden konnten, um zu dem reichen Erzgang zu gelangen; es ſind die Stollen und Luftzüge, welche die Gruben von Waſſer und böſen Wettern frei hielten.

Eine jede, auch die kleinste chemische oder physikalische Arbeit, wenn sie auf Beachtung Ansprüche macht, muß heutzutage diesen Character an sich tragen; aus einer gewissen Anzahl von Beobachtungen muß ein Schluß, gleichgültig ob er viel oder wenig umfaßt, gezogen werden können.

Es kann nur in der Methode, nur in ihrer Untersuchungsweise liegen, daß seit einem halben Jahrhundert in Beziehung auf eine tiefere Einsicht in die Functionen der wichtigsten Organe, der Milz, der Leber und zahlreichen Drüsen, von den Physiologen so wenig neue feststehende Wahrheiten gewonnen worden sind, und sicher wird die unvollkommene Bekanntschaft mit den Forschungsmethoden der Chemie das Haupthinderniß bleiben, was den Fortschritten der Physiologie entgegensteht, der Hauptvorwurf, den sie nicht zu beseitigen vermag.

Die Chemie stand der Physik vor Lavoisier, Scheele und Priestley nicht näher, als heutzutage der Physiologie; sie ist jetzt mit der Physik so innig verschmolzen, daß es schwer halten dürfte, zwischen beiden eine scharfe Grenzlinie zu ziehen; ganz dasselbe Band vereinigt die Chemie mit der Physiologie, und in einem halben Jahrhundert wird man ihre Trennung für ebenso unmöglich halten.

Unsere Fragen und Versuche durchschneiden in unzähligen krummen Linien die grade Linie, die zur Wahrheit führt, es sind die Kreuzungspunkte, die uns die wahre Richtung erkennen lassen; es liegt in der Unvollkommenheit des menschlichen Geistes, daß die krummen Linien gemacht werden

müſſen. Die Chemiker und Phyſiker behalten ſtets ihr Ziel im Auge, dem einen gelingt es, ſtreckenweiſe den geraden Weg zu verfolgen, allein alle ſind auf die Umwege vorbereitet; des Erfolgs ihrer Anſtrengungen bei Beharrlichkeit und Ausdauer gewiß, wächſt die Begierde und ihr Muth mit den Schwierigkeiten.

Einzelne Beobachtungen ohne Zuſammenhang ſind auf einer Ebene zerſtreute Punkte, die uns nicht geſtatten, einen beſtimmten Weg zu wählen. In der Chemie hatte man Jahrhunderte lang nichts als dieſe Punkte, deren Zwiſchenräume auszufüllen Mittel genug in Anwendung kamen; allein bleibende Entdeckungen, wahre Fortſchritte wurden erſt dann gemacht, als man ihre Verknüpfung nicht mehr der Phantaſie überließ.

Ich habe den Zweck gehabt, die Kreuzungspunkte der Phyſiologie und Chemie in dieſem Buche hervorzuheben und die Stellen anzudeuten, wo beide Wiſſenſchaften gegenſeitig in einander greifen. Es enthält eine Sammlung von Aufgaben, ſo wie ſie gegenwärtig von der Chemie geſtellt werden, und eine Anzahl von Schlüſſen, die nach ihren Regeln aus den vorhandenen Erfahrungen ſich ergeben.

Dieſe Fragen und Aufgaben werden ihre Löſung erhalten, und kein Zweifel kann darüber ſein, daß wir alsdann eine neue Phyſiologie und eine rationelle Pathologie haben werden. Gewiß iſt unſer Senkblei nicht lang genug, um die Tiefe des Meeres zu meſſen, allein es verliert deshalb ſeinen Werth für uns nicht; wenn es uns vorläufig nur hilft, um

die Klippen und Sandbänke zu vermeiden, ſo iſt dieſer Nutzen groß genug. In der Hand des Phyſiologen muß die organiſche Chemie zu einem geiſtigen Hilfsmittel werden, mit dem er im Stande ſein wird, die Urſachen von Erſcheinungen zu erforſchen, die das leibliche Auge nicht mehr erkennt; und wenn von den Reſultaten, die ich in dieſem Buche entwickelt oder angedeutet habe, nur ein Einziges eine nützliche Anwendung zuläßt, ſo halte ich den Zweck, für den es geſchrieben iſt, für vollkommen erreicht. Der Weg, der dazu geführt hat, wird andere Wege bahnen, und dies betrachte ich als den höchſten Gewinn.

Gießen, im April 1842.

Dr. Juſtus Liebig.

Erſter Theil.

Der chemiſche Proceß

der

Reſpiration und Ernährung.

I.

In dem Thierei, in dem Samen einer Pflanze erkennen wir eine merkwürdige Thätigkeit, eine Urſache der Zunahme an Maſſe, des Erſatzes an verbrauchtem Stoff, eine Kraft in dem Zuſtande der Ruhe. Durch äußere Bedingungen, durch die Begattung, durch Gegenwart von Feuchtigkeit und Luft wird der Zuſtand des ſtatiſchen Gleichgewichtes dieſer Thätigkeit aufgehoben; die in Bewegung übergehende Kraft äußert ſich in einer Reihe von Formbildungen, welche, wenn auch zuweilen durch grade Linien eingeſchloſſen, doch weit entfernt von geometriſchen Geſtalten ſind, ſo wie wir ſie beim kryſtalliſirenden Minerale beobachten. Dieſe Kraft heißt Lebenskraft.

Die Zunahme an Maſſe in einer Pflanze wird durch den Akt einer Zerſetzung bedingt, die in gewiſſen Pflanzentheilen durch die Einwirkung des Lichts und der Wärme vor ſich geht.

Dieſer Zerſetzung unterliegen in dem Lebensproceß der Pflanze ausſchließlich nur anorganiſche Materien, und wenn man mit ausgezeichneten Mineralogen die Luft und gewiſſe andere Gaſe als Mineralien gelten läßt, ſo kann man ſagen, daß die vegetative Lebensthätigkeit die Verwandlung

des Minerals in einen mit Leben begabten Organismus bewirkt, das Mineral wird Theil eines Trägers der Lebenskraft.

Die Zunahme an Maſſe in einer lebenden Pflanze ſetzt voraus, daß gewiſſe Beſtandtheile der Nahrung zu Beſtandtheilen des Pflanzenkörpers werden, und eine Vergleichung der chemiſchen Zuſammenſetzung von beiden, zeigt mit unzweifelhafter Gewißheit, welche von den Beſtandtheilen der Nahrung ausgetreten, welche aſſimilirt worden ſind.

Die Beobachtungen der Pflanzenphyſiologen und die Unterſuchungen der Chemiker, ſie haben gegenſeitig dazu gedient, um den Beweis zu führen, daß das Wachsthum und die Entwickelung der Pflanze abhängig ſind von einer Ausſcheidung von Sauerſtoff, der ſich von den Beſtandtheilen ihrer Nahrungsmittel trennt.

Im geraden Gegenſatz zu dem Pflanzenleben äußert ſich das Thierleben in einer nie aufhörenden Einſaugung und Verbindung des Sauerſtoffs der Luft mit gewiſſen Beſtandtheilen des Thierkörpers.

Während kein Theil eines organiſchen Weſens zur Nahrung einer Pflanze dienen kann, wenn er nicht vorher, in Folge von Fäulniß und Verweſungsproceſſen, die Form eines anorganiſchen Körpers angenommen hat, bedarf der thieriſche Organismus zu ſeiner Erhaltung und Entwickelung höher organiſirter Atome. Die Nahrungsmittel aller Thiere ſind unter allen Umſtänden Theile von Organismen.

Durch ihre Fähigkeit, den Ort zu wechſeln, und im All-

gemeinen durch die Sinne unterscheidet sich das Thier von der Pflanze.

Alle diese Thätigkeiten gehen von gewissen Werkzeugen aus, die in der Pflanze fehlen. Die vergleichende Anatomie zeigt, daß die Bewegungs- und Gefühlsäußerungen von gewissen Apparaten abhängig sind, die mit einander in keinem andern Zusammenhange stehen, als daß sie sich in einem gemeinschaftlichen Centrum vereinigen. Die Substanz des Rückenmarks, der Nerven, der Gehirnmaterie sind in ihrer Zusammensetzung und ihrem chemischen Verhalten wesentlich von der Substanz der Zellen, Membranen, Muskeln und der Haut verschieden.

Alles, was im Thierorganismus Bewegung genannt werden kann, geht von den Nervenapparaten aus. Die Bewegungserscheinungen in den Pflanzen, die Saftcirculation, die man in manchen Charen beobachtet hat, das Schließen der Blüthen und Blätter hängt von physikalischen und mechanischen Ursachen ab. Eine Pflanze enthält keine Nerven. Wärme und Licht sind die entfernteren Ursachen der Bewegungen in Pflanzen, in den Thieren erkennen wir in den Nervenapparaten eine Quelle von Kraft, die sich in jedem Zeitmomente ihres Lebens wieder zu erneuern vermag.

Aehnlich wie die Assimilation der Nahrungsmittel in den Pflanzen, ihr ganzer Bildungsproceß, abhängig ist von gewissen äußeren Ursachen, welche die Bewegungen vermitteln, ist die Entwickelung des Thierorganismus bis zu einem gewissen Grade unabhängig von diesen äußeren Ursachen, eben

weil er in ſich ſelbſt durch ein beſonderes Syſtem von Apparaten die zu dem Lebensproceß unentbehrliche Kraft der Bewegung erzeugt.

Der Bildungsproceß, die Aſſimilation, der Uebergang des in Bewegung befindlichen Stoffs in den Zuſtand der Ruhe geht bei Pflanzen und Thieren in einerlei Weiſe vor ſich, es iſt die nämliche Urſache, die in beiden die Zunahme an Maſſe bedingt, es iſt dies das eigentliche vegetative Leben, es äußert ſich ohne Bewußtſein.

In der Pflanze giebt ſich die vegetative Lebensthätigkeit unter Mitwirkung von äußeren Kräften, in Thieren durch Thätigkeiten kund, die ſich in ihrem Organismus erzeugen. Die Verdauung, der Blutumlauf, die Abſonderung der Säfte, ſie ſtehen jedenfalls unter der Herrſchaft des Nervenſyſtems, allein es iſt ein und dieſelbe Kraft, welche dem Keim, dem Blatt, der Wurzelfaſer die nämlichen wunderbaren Eigenſchaften giebt, welche die ſecernirende Haut, die Drüſe beſitzen, welche jedes Organ im Thier befähigt, ſeinen eigenen Funktionen vorzuſtehen; nur die Urſachen der Bewegungen ſind in beiden verſchieden.

Während wir in den niedrigſten Thierklaſſen die Apparate der Bewegung, wie im befruchteten Keim des Thierei's, in dem ſie ſich zu allererſt entwickeln, nie vermiſſen, finden wir in höheren Thierklaſſen beſondere Apparate des Gefühls und Empfindens, des Bewußtſeins und des höheren geiſtigen Lebens.

Der Patholog zeigt uns, daß das eigentlich vegetative Leben keineswegs an das Vorhandenſein dieſer Apparate ge-

knüpft ist, daß der Nutritionsproceß in den Theilen des Körpers, wo diejenigen Nerven gelähmt sind, welche das Gefühl oder die willkürlichen Bewegungen vermitteln, in der nämlichen Form vor sich geht, wie in anderen, in denen sie sich in normalem Zustande befinden, so wie auf der andern Seite die kräftigste Energie des Willens auf die Zusammenziehung des Herzens, auf die Bewegung der Eingeweide und die Secretionsprocesse keinen Einfluß auszuüben vermag.

Die Erscheinungen des höheren geistigen Lebens, sie können auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft nicht auf ihre nächsten, viel weniger auf ihre letzten Ursachen zurückgeführt werden, wir wissen weiter nichts davon, als daß sie vorhanden sind; wir schreiben sie einer immateriellen Thätigkeit zu, und zwar insofern ihre Aeußerungen an die Materie sich gebunden finden, einer Kraft, welche durchaus verschieden ist und nichts gemein hat mit der Lebenskraft.

Diese eigenthümliche Kraft übt, wie nicht geleugnet werden kann, einen gewissen Einfluß auf die vegetative Lebensthätigkeit aus, ähnlich wie dies von anderen immateriellen Potenzen, von Licht, Elektricität, Wärme und Magnetismus geschieht, allein dieser Einfluß ist nicht bedingender Art, sondern er äußert sich nur als eine Beschleunigung, Störung oder Verlangsamung der vegetativen Lebensprocesse; auf eine ganz ähnliche Weise übt die vegetative Lebensthätigkeit rückwärts gewisse Wirkungen auf das bewußte geistige Leben aus.

Es sind zwei Kräfte, die sich neben einander in Aktion

befinden, allein Bewußtſein und Geiſt, ſie fehlen im Thiere und der lebendigen Pflanze, ohne daß wir in dieſen etwas Anderes vermiſſen, als den Mangel einer beſondern Urſache der Steigerung oder Störung; abgeſehen davon, gehen alle vitalchemiſchen Proceſſe im Menſchen und Thiere auf einerlei Weiſe vor ſich.

Das unaufhörlich ſich erneuernde Streben, die Beziehungen der Pſyche zu dem animaliſchen Leben ermitteln zu wollen, hat von jeher die Fortſchritte der Phyſiologie aufgehalten, es war ein beſtändiges Heraustreten aus dem Gebiete der Naturforſchung in das Reich der phantaſtiſchen Gebilde; denn die begeiſterten Phyſiologen, ſie waren weit davon entfernt, die Geſetze des rein thieriſchen Lebens zu kennen. Keiner von ihnen hatte eine klare Vorſtellung über den Entwickelungs- und Ernährungsproceß, keiner von der wahren Urſache des Todes. Sie erklärten die verborgenſten pſychiſchen Erſcheinungen und waren nicht im Stande zu ſagen, was Fieber iſt und in welcher Weiſe das Chinin bei ſeiner Heilung wirkt!

Um die Geſetze der Bewegungen im Thierkörper zu ermitteln, war nur die eine Bedingung, die Kenntniß der Apparate erforſcht, welche die Bewegungen vermitteln, aber die Subſtanz der Organe, die Veränderungen, welche die Nahrungsmittel im lebenden Körper erfahren, ihr Uebergang zu Beſtandtheilen der Organe und rückwärts wieder in lebloſe Verbindungen, der Antheil, den die Atmoſphäre an den Lebensproceſſen nimmt, alle dieſe Grundlagen zu weiteren Schlüſſen waren noch nicht gegeben.

Was hat die Psyche, was hat Bewußsein und Geist mit der Entwickelung des menschlichen Fötus, mit der des Fötus im Hühnerei zu schaffen? gewiß nicht mehr als sie Antheil nimmt an der Entwickelung des Samens einer Pflanze! Suchen wir vor der Hand die nicht psychischen Erscheinungen auf ihre letzten Ursachen zurückzuführen, und hüten wir uns vor Schlüssen, ehe wir eine Grundlage haben. Wir kennen genau den Mechanismus des Auges, allein weder die Anatomie, noch Chemie wird uns jemals Aufschluß geben, wie der Lichtstrahl zum Bewußtsein gelangt. Die Naturforschung hat eine bestimmte Grenze, die sie nicht überschreiten darf, sie muß sich stets daran erinnern, daß mit allen Entdeckungen nicht in Erfahrung gebracht werden kann, was Licht, Elektricität und Magnetismus für Dinge sind, eben weil der menschliche Geist nur Vorstellungen hat für Dinge, welche Materialität besitzen. Wir können aber die Gesetze ihres Zustands der Ruhe und der Bewegung erforschen, eben weil sie sich in Erscheinungen äußern. So können zweifellos die Gesetze des Lebens und Alles, was sie stört, befördert oder ändert, erforscht werden, ohne daß man jemals wissen wird, was das Leben ist; so führte die Erforschung der Gesetze des Falles und der Bewegung der Himmelskörper auf eine vorher nie gedachte Vorstellung über ihre Ursache. Diese Vorstellung konnte in ihrer Klarheit nicht entstehen ohne die Kenntniß der Erscheinungen, aus denen sie sich entwickelte; an und für sich ist ja die Schwerkraft, wie das Licht für einen Blindgebornen, ein bloßes Wort.

Die neue Wiſſenſchaft der Phyſiologie hat die Methode des Ariſtoteles verlaſſen, ſie erfindet keinen horror vacui, keine Quinta essentia mehr, um den gläubigen Zuhörern Aufſchlüſſe und Erklärungen von Erſcheinungen zu geben, deren eigentlicher Verband mit anderen, deren letzte Urſache nicht ermittelt iſt, zum Heil der Wiſſenſchaft, muß man hinzuſetzen, und zum Segen für die Menſchheit.

Wenn wir feſthalten, daß alle Erſcheinungen in dem Organismus der Pflanzen und des Thieres einer ganz eigenthümlichen Urſache zugeſchrieben werden müſſen, welche in ihren Aeußerungen durchaus verſchieden iſt von allen anderen Urſachen, die Zuſtandsänderungen oder Bewegungen bedingen, wenn wir die Lebenskraft alſo gelten laſſen für eine für ſich beſtehende Kraft, ſo haben wir in den Erſcheinungen des organiſchen Lebens, wie in allen anderen Erſcheinungen, welche Kräften zugeſchrieben werden müſſen, eine Statik (Zuſtand des Gleichgewichtes, bedingt durch einen Widerſtand) und eine Dynamik der Lebenskraft.

Alle Theile des Thierkörpers bilden ſich aus einer eigenthümlichen, in ſeinem Organismus circulirenden Flüſſigkeit, in Folge einer, jeder Zelle, jedem Organe oder Theile eines Organs inwohnenden Thätigkeit. Die Phyſiologie lehrt, daß alle Beſtandtheile des Körpers urſprünglich Blut waren, oder daß ſie wenigſtens den entſtehenden Organen durch dieſe Flüſſigkeit zugeführt worden ſind.

Die gewöhnlichſten Erfahrungen geben ferner zu erkennen, daß in jedem Momente des Lebens in dem Thierorga-

nismus ein fortdauernder, mehr oder minder beschleunigter Stoffwechsel vor sich geht, daß ein Theil der Gebilde sich zu formlosen Stoffen umsetzt, daß sie ihren Zustand des Lebens verlieren und wieder erneuert werden müssen. Die Physiologie hat entscheidende Gründe genug für die Meinung, daß jede Bewegung, jede Kraftäußerung die Folge einer Umsetzung der Gebilde oder der Substanz derselben ist, daß jede Vorstellung, jeder Affekt Veränderungen in der chemischen Beschaffenheit der abgesonderten Säfte zur Folge hat, daß jeder Gedanke, jede Empfindung von einer Aenderung in der Zusammensetzung der Gehirnsubstanz begleitet ist.

Zur Unterhaltung der Lebenserscheinungen im Thiere gehören gewisse Stoffe, Theile von Organismen, die man Nahrungsmittel nennt; in Folge einer Reihe von Veränderungen dienen sie entweder zur Vermehrung seiner Masse (zur Ernährung), oder zum Ersatze an verbrauchtem Stoff (Reproduktion), oder sie dienen zur Hervorbringung von Kraft.

II.

Wenn wir die Aufnahme von Nahrungsmitteln als die eine Bedingung des Lebens bezeichnen, so ist die zweite eine fortdauernde Einsaugung von Sauerstoff aus der atmosphärischen Luft.

Von dem Standpunkte des Naturforschers aus zeigt sich das Thierleben in einer Reihe von Erscheinungen, deren Zu-

ſammenhang und Wiederkehr vermittelt wird durch eine in dem Organismus vorgehende Veränderung, welche die Nahrungsmittel und der eingeſaugte atmoſphäriſche Sauerſtoff unter der Mitwirkung der Lebenskraft erleiden.

Alle vitalen Thätigkeiten entſpringen aus der Wechſelwirkung des Sauerſtoffs der Luft und der Beſtandtheile der Nahrungsmittel.

In der Ernährung und Reproduktion erkennen wir den Uebergang des Stoffs aus dem Zuſtande der Bewegung in den Zuſtand der Ruhe (des ſtatiſchen Gleichgewichts); durch den Einfluß des Nervenſyſtems gelangt dieſer Stoff in den Zuſtand der Bewegung. Die letzten Urſachen dieſer Zuſtände der Lebenskraft ſind die chemiſchen Kräfte.

Die Urſache des Zuſtandes der Ruhe iſt ein Widerſtand, welcher bedingt wird durch eine Kraft der Anziehung (Verbindung), welche zwiſchen den kleinſten Theilchen der Materie wirkt und nur bei unmittelbarer Berührung, oder in unmeßbar kleinen Entfernungen ſich thätig zeigt.

Dieſe beſondere Art der Anziehung, man kann ihr natürlich die verſchiedenſten Namen geben, der Chemiker nennt ſie aber Affinität.

Die Bedingung des Zuſtandes der Bewegung liegt in einer Reihe von Veränderungen, welche die Nahrungsmittel in dem Organismus erleiden, in Folge alſo von Zerſetzungsproceſſen, welche die Nahrungsmittel an und für ſich, oder die daraus entſprungenen Gebilde, oder Beſtandtheile der Organe erleiden.

Der Hauptcharacter des vegetativen Lebens ist ein steter Uebergang des in Bewegung gesetzten Stoffs in den Zustand des statischen Gleichgewichtes. So lange die Pflanze lebt, ist kein Stillstand in der Zunahme bemerklich, kein Theil eines Organs der Pflanze nimmt an Masse ab. Wenn eine Zersetzung erfolgt, so ist sie eine Folge der Assimilation. Eine Pflanze erzeugt in sich selbst keine Kraft der Bewegung, kein Theil ihrer Gebilde verliert, durch eine in ihrem Organismus vorhandene Ursache, den Zustand des Lebens und geht in formlose Verbindungen über, in ihr findet kein Verbrauch statt. Der Verbrauch im Thier ist eine Aenderung des Zustandes und der Zusammensetzung gewisser Bestandtheile des Thierkörpers, er geht mithin vor sich in Folge chemischer Actionen. Der Einfluß der Gifte, der Arzneimittel auf den lebenden thierischen Körper zeigt auf eine evidente Weise, daß der Act der chemischen Zersetzung und Verbindung im Thierkörper, die sich uns in der Form von Lebenserscheinungen zu erkennen geben, daß sie durch ähnlich wirkende chemische Kräfte gesteigert, durch entgegengesetzt wirkende verlangsamt und aufgehoben werden können, daß wir auf jeden Theil eines Organs durch Stoffe, die eine bestimmte chemische Action besitzen, eine Wirkung auszuüben vermögen.

Aehnlich also wie in der geschlossenen galvanischen Säule durch gewisse Veränderungen, welche ein anorganischer Körper, ein Metall, bei seiner Berührung mit einer Säure, erleidet, ein gewisses Etwas für unsere Sinne wahrnehmbar wird, was wir mit einem Strome electrischer Materie bezeichnen,

entſtehen in Folge von Umſetzungen und Veränderungen von Materien, die früher Theile von Organismen waren, gewiſſe Bewegungs- und Thätigkeitsäußerungen, die wir Leben nennen.

Der electriſche Strom giebt ſich uns zu erkennen durch gewiſſe Erſcheinungen der Anziehung und Abſtoßung, welche andere, an und für ſich bewegungsloſe, Materien durch ihn empfangen, durch Erſcheinungen der Bildung und Zerſetzung chemiſcher Verbindungen, die ſich überall äußern, wo der Widerſtand die Bewegung nicht aufhebt.

Von dieſem Standpunkte allein und von keinem andern aus darf die Chemie die Lebenserſcheinungen ſtudiren. Wunder finden wir überall; die Bildung eines Kryſtalls, eines Octaeders iſt nicht minder unbegreiflich, wie die Entſtehung eines Blatts oder einer Muskelfaſer, und die Entſtehung des Zinnobers aus Queckſilber und Schwefel iſt ein ebenſo großes Räthſel, wie die Bildung eines Auges aus der Subſtanz des Blutes.

Aufnahme von Nahrungsmitteln und Sauerſtoff ſind die erſten Bedingungen des thieriſchen Lebens.

In jedem Zeittheilchen ſeines Lebens nimmt der Menſch durch die Organe der Reſpiration Sauerſtoff auf; nie iſt, ſo lange das Thier lebt, ein Stillſtand bemerklich.

Die Beobachtungen der Phyſiologen zeigen, daß der Körper eines erwachſenen Menſchen, nach 24 Stunden, bei hinlänglicher Nahrung, am Gewicht weder zu- noch abgenommen hat, dennoch iſt die Menge von Sauerſtoff, die in dieſer

Zeit in seinen Organismus aufgenommen wurde, höchst beträchtlich.

Nach Lavoisier's Versuchen werden von einem erwachsenen Manne in einem Jahre 746 Pfd., nach Menzies 837 Pfd. Sauerstoffgas aus der Atmosphäre in seinen Körper aufgenommen, und dennoch finden wir sein Gewicht zu Anfang und Ende des Jahres entweder ganz unverändert, oder die Ab- und Zunahme bewegt sich um wenige Pfunde [1]).

Wo ist, kann man fragen, dieses enorme Gewicht an Sauerstoff hingekommen, was ein Individuum im Verlaufe eines Jahres in sich aufnimmt?

Diese Frage ist mit befriedigender Sicherheit gelöst; kein Theil des aufgenommenen Sauerstoffs bleibt im Körper, sondern er tritt in der Form einer Kohlenstoff- oder einer Wasserstoffverbindung wieder aus.

Der Kohlenstoff und Wasserstoff von gewissen Bestandtheilen des Thierkörpers haben sich mit dem durch die Haut und Lunge aufgenommenen Sauerstoff verbunden, sie sind als Kohlensäure und Wasserdampf wieder ausgetreten.

Mit jedem Athemzuge, in jedem Lebensmomente trennen sich von dem Thierorganismus gewisse Mengen seiner Bestandtheile, nachdem sie mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft eine Verbindung in dem Körper selbst eingegangen sind.

Wenn wir, um einen Anhaltspunkt zu einer Rechnung zu haben, mit Lavoisier und Seguin annehmen, daß der erwachsene Mensch täglich 65 Loth Sauerstoff (46037 Cu-

einem und demſelben Thiere die Menge der zu genießenden Nahrung wechſelt, je nach der Stärke und Anzahl der Athemzüge.

Ein Kind, deſſen Reſpirationswerkzeuge ſich in größerer Thätigkeit befinden, muß häufiger und verhältnißmäßig mehr Nahrung zu ſich nehmen, als ein Erwachſener, es kann den Hunger weniger leicht ertragen. Ein Vogel ſtirbt bei Mangel an Nahrung den dritten Tag; eine Schlange, die in einer Stunde, unter einer Glasglocke athmend, kaum ſo viel Sauerſtoff verzehrt, daß die davon erzeugte Kohlenſäure wahrnehmbar iſt, lebt drei Monate und länger ohne Nahrung.

Im Zuſtand der Ruhe beträgt die Anzahl der Athemzüge weniger als im Zuſtand der Bewegung und Arbeit. Die Menge der in beiden Zuſtänden nothwendigen Nahrung muß in dem nämlichen Verhältniß ſtehen.

Ein Ueberfluß von Nahrung und Mangel an eingeathmetem Sauerſtoff (an Bewegung), ſo wie ſtarke Bewegung (die zu einem größeren Maaß von Nahrung zwingt) und ſchwache Verdauungsorgane ſind unverträglich mit einander.

Die Menge des Sauerſtoffs, welche ein Thier durch die Lunge aufnimmt, iſt aber nicht allein abhängig von der Anzahl der Athemzüge, ſondern auch von der Temperatur und der Dichtigkeit der eingeathmeten Luft.

Die Bruſthöhle eines Thieres hat eine unveränderliche Größe, mit jedem Athemzuge tritt eine gewiſſe Menge Luft ein, die in Beziehung auf ihr Volumen als gleichbleibend

angesehen werden kann. Aber ihr Gewicht und damit das Gewicht des darin enthaltenen Sauerstoffs bleibt sich nicht gleich. In der Wärme dehnt sich die Luft aus, in der Kälte zieht sie sich zusammen. In einem gleichen Volum kalter und warmer Luft haben wir ein ungleiches Gewicht Sauerstoff. Im Sommer enthält die atmosphärische Luft Wassergas, im Winter ist sie trocken; der Raum, den das Wassergas in der warmen Luft einnimmt, wird im Winter durch Luft eingenommen, d. h. sie enthält bei gleichem Volum im Winter mehr Sauerstoff.

Im Sommer und Winter, am Pole und Aequator athmen wir ein gleiches Luftvolumen ein. Die kalte Luft erwärmt sich beim Einathmen in der Luftröhre und den Lungenzellen, und nimmt die Temperatur des Körpers an. Um ein gewisses Sauerstoffvolumen in die Lunge zu bringen, ist im Winter ein geringerer Kraftaufwand nöthig, als im Sommer; für denselben Kraftverbrauch athmet man im Winter mehr Sauerstoff ein.

Es ist einleuchtend, daß wir bei einer gleichen Anzahl von Athemzügen an dem Ufer des Meeres eine größere Menge von Sauerstoff verzehren, als auf Bergen; daß die Menge der austretenden Kohlensäure, so wie das eingesaugte Sauerstoffgas mit dem Barometerstande sich ändert.

Das aufgenommene Sauerstoffgas tritt im Sommer und Winter in ähnlicher Weise verändert wieder aus, wir athmen in niederer Temperatur und höherem Luftdrucke mehr Kohlenstoff aus wie in höherer, und wir müssen in dem nämlichen

Verhältniß mehr oder weniger Kohlenſtoff in den Speiſen genießen, in Schweden mehr wie in Sicilien, in unſern Gegenden im Winter ein ganzes Achtel mehr wie im Sommer.

Selbſt wenn wir dem Gewicht nach gleiche Quantitäten Speiſe in kalten und warmen Gegenden genießen, ſo hat eine unendliche Weisheit die Einrichtung getroffen, daß dieſe Speiſen höchſt ungleich in ihrem Kohlenſtoffgehalte ſind. Die Früchte, welche der Südländer genießt, enthalten im friſchen Zuſtande nicht über 12 pCt. Kohlenſtoff, während der Speck und Thran des Polarländers 66 bis 80 pCt. Kohlenſtoff enthalten.

Es iſt keine ſchwere Aufgabe, ſich in warmen Gegenden der Mäßigkeit zu befleißigen, oder lange Zeit den Hunger unter dem Aequator zu ertragen, allein Kälte und Hunger reiben in kurzer Zeit den Körper auf.

Die Wechſelwirkung der Beſtandtheile der Speiſen und des durch die Blutcirculation im Körper verbreiteten Sauerſtoffs iſt die Quelle der thieriſchen Wärme.

III.

Alle lebenden Weſen, deren Exiſtenz auf einer Einſaugung von Sauerſtoff beruht, beſitzen eine von der Umgebung unabhängige Wärmequelle.

Dieſe Wahrheit bezieht ſich auf alle Thiere, ſie erſtreckt ſich auf den keimenden Samen, auf die Blüthe der Pflanze und auf die reifende Frucht.

Nur in den Theilen des Thieres, zu welchen arterielles

Blut, und durch dieses der in dem Athmungsproceß aufgenommene Sauerstoff gelangen kann, wird Wärme erzeugt. Haare, Wolle, Federn besitzen keine eigenthümliche Temperatur.

Diese höhere Temperatur des Thierkörpers oder, wenn man will, Wärmeausscheidung ist überall und unter allen Umständen die Folge der Verbindung einer brennbaren Substanz mit Sauerstoff.

In welcher Form sich auch der Kohlenstoff mit Sauerstoff verbinden mag, der Akt der Verbindung kann nicht vor sich gehen, ohne von Entwicklung von Wärme begleitet zu seyn, gleichgültig, ob sie langsam oder rasch erfolgt, ob sie in höherer oder niederer Temperatur vor sich geht, stets bleibt die freigewordene Wärmemenge eine unveränderliche Größe.

Der Kohlenstoff der Speisen, der sich im Thierkörper in Kohlensäure verwandelt, muß eben so viel Wärme entwickeln, als wenn er in der Luft oder im Sauerstoff direct verbrannt worden wäre; der einzige Unterschied ist der, daß die erzeugte Wärmemenge sich auf ungleiche Zeiten vertheilt; in reinem Sauerstoffgas geht die Verbrennung schneller vor sich, die Temperatur ist höher, in der Luft langsamer, die Temperatur ist niedriger, sie hält aber länger an.

Es ist klar, daß mit der Menge des in gleichen Zeiten durch den Athmungsproceß zugeführten Sauerstoffs die Anzahl der freigewordenen Wärmegrade zu- oder abnehmen muß. Thiere, welche rasch und schnell athmen und demzufolge viel Sauerstoff verzehren, besitzen eine höhere Temperatur als

andere, die in derſelben Zeit, bei gleichem Volum des zu erwärmenden Körpers, weniger in ſich aufnehmen; ein Kind mehr (39°) als ein erwachſener Menſch (37,5°), ein Vogel mehr (40—41°) wie ein vierfüßiges Thier (37—38°), wie ein Fiſch oder Amphibium, deſſen Eigentemperatur ſich 1½ bis 2° über das umgebende Medium erhebt [5]). Alle Thiere ſind warmblütig, allein nur bei denen, welche durch Lungen athmen, iſt die Eigenwärme ganz unabhängig von der Temperatur der Umgebung.

Die zuverläſſigſten Beobachtungen beweiſen, daß in allen Klimaten, in der gemäßigten Zone ſowohl wie am Aequator oder an den Polen, die Temperatur des Menſchen, ſo wie die aller ſogenannten warmblütigen Thiere, niemals wechſelt; allein wie verſchieden ſind die Zuſtände, in denen ſie leben.

Der Thierkörper iſt ein erwärmter Körper, der ſich zu ſeiner Umgebung verhält wie alle warmen Körper; er empfängt Wärme, wenn die äußere Temperatur höher, er giebt Wärme ab, wenn ſie niedriger iſt, als ſeine eigene Temperatur.

Wir wiſſen, daß die Schnelligkeit der Abkühlung eines warmen Körpers wächſt mit der Differenz ſeiner eignen Temperatur und der des Mediums, worin er ſich befindet, d. h. je kälter die Umgebung iſt, in deſto kürzerer Zeit kühlt ſich der warme Körper ab.

Wie ungleich iſt aber der Wärmeverluſt, den ein Menſch in Palermo erleidet, wo die äußere Temperatur nahe gleich iſt der Temperatur des Körpers, und der eines Menſchen,

der am Pole lebt, wo die Temperatur 40—50 Grade niedriger ist.

Trotzt diesem so höchst ungleichen Wärmeverlust, zeigt die Erfahrung, daß das Blut des Polarländers keine niedrigere Temperatur besitzt, als das des Südländers, der in einer so verschiedenen Umgebung lebt.

Diese Thatsache ihrer wahren Bedeutung nach anerkannt, beweis't, daß die nach Außen hin abgegebene Wärme in dem Thierkörper mit großer Schnelligkeit ersetzt wird; im Winter erfolgt diese Erneuerung schneller wie im Sommer, am Pole rascher wie am Aequator.

In verschiedenen Klimaten wechselt nun die Menge des durch die Respiration in den Körper tretenden Sauerstoffs nach der Temperatur der äußern Luft; mit dem Wärmeverlust durch Abkühlung steigt die Menge des eingeathmeten Sauerstoffs; die zur Verbindung mit diesem Sauerstoff nöthige Menge Kohlenstoff oder Wasserstoff, sie muß in einem ähnlichen Verhältniß zunehmen.

Es ist klar, daß der Wärmeersatz bewirkt wird durch die Wechselwirkung der Bestandtheile der Speisen, die sich mit dem eingeathmeten Sauerstoff verbinden. Um einen trivialen aber deswegen nicht minder richtigen Vergleich anzuwenden, verhält sich in dieser Beziehung der Thierkörper, wie ein Ofen, den wir mit Brennmaterial versehen. Gleichgültig, welche Formen die Speisen nach und nach im Körper annehmen, welche Veränderungen sie auch erleiden mögen, die letzte Veränderung, die sie erfahren, ist eine Verwandlung

ihres Kohlenſtoffs in Kohlenſäure, ihres Waſſerſtoffs in Waſſer; der Stickſtoff und der unverbrannte Kohlenſtoff, ſie werden in dem Urin und den feſten Excrementen abgeſchieden. Um eine conſtante Temperatur im Ofen zu haben, müſſen wir, je nach der äußern Temperatur wechſelnd, eine ungleiche Menge von Brennmaterial einſchieben.

In Beziehung auf den Thierkörper ſind die Speiſen das Brennmaterial; bei gehörigem Sauerſtoffzutritt erhalten wir die durch ihre Oxydation freiwerdende Wärme. Im Winter, bei Bewegung in kalter Luft, wo die Menge des eingeathmeten Sauerſtoffs zunimmt, wächſt in dem nämlichen Verhältniß das Bedürfniß nach kohlen- und waſſerſtoffreichen Nahrungsmitteln, und in Befriedigung dieſes Bedürfniſſes erhalten wir den wirkſamſten Schutz gegen die grimmigſte Kälte. Ein Hungernder friert. Jedermann weiß, daß die Raubthiere der nördlichen Klimate an Gefräßigkeit weit den in ſüdlichen Gegenden voranſtehen.

In der kalten und temperirten Zone treibt uns die Luft, die ohne Aufhören den Körper zu verzehren ſtrebt, zur Arbeit und Anſtrengung, um uns die Mittel zum Widerſtande gegen dieſe Einwirkung zu ſchaffen, während in heißen Klimaten die Anforderungen zur Herbeiſchaffung an Speiſe bei weitem nicht ſo dringend ſind.

Unſere Kleider ſind nur Aequivalente für die Speiſen; je wärmer wir uns kleiden, deſto mehr vermindert ſich das Bedürfniß zu eſſen, eben weil der Wärmeverluſt, die Abkühlung und damit der nöthige Erſatz durch Speiſen kleiner wird.

Gingen wir nackt wie der Indianer, oder wären wir beim Jagen und Fischen denselben Kältegraden ausgesetzt wie der Samojede, so würden wir 10 Pfund Fisch oder Fleisch und noch obendrein ein Dutzend Talglichter bewältigen können, wie uns warmbekleidete Reisende mit Verwunderung erzählt haben; wir würden dieselbe Menge Branntwein oder Thran ohne Nachtheil genießen können, eben weil ihr Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt dazu dient, um ein Gleichgewicht mit der äußeren Temperatur hervorzubringen.

Die Menge der zu genießenden Speisen richtet sich nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen, nach der Anzahl der Athemzüge, nach der Temperatur der Luft, die wir einathmen und nach dem Wärmequantum, was wir nach außen hin abgeben.

Keine isolirte, entgegenstehende Thatsache kann die Wahrheit dieses Naturgesetzes ändern. Ohne der Gesundheit einen vorübergehenden oder bleibenden Nachtheil zuzufügen, kann der Neapolitaner nicht mehr Kohlenstoff und Wasserstoff in den Speisen zu sich nehmen, als er ausathmet, und kein Nordländer kann mehr Kohlenstoff und Wasserstoff ausathmen, als er in den Speisen zu sich genommen hat, wenn nicht im Zustand der Krankheit, oder wenn er hungert, Zustände, die wir näher beleuchten werden.

Der Engländer sieht mit Bedauern seinen Appetit, der ihm einen häufig wiederkehrenden Genuß darbietet, in Jamaica schwinden, und es gelingt ihm in der That, durch Cayennepfeffer und die kräftigsten Reizmittel die nämliche

Menge von Speiſen zu ſich zu nehmen wie in ſeiner Heimath; allein der in den Körper übergegangene Kohlenſtoff dieſer Speiſen, er wird nicht verbraucht, die Temperatur der Luft iſt zu hoch und eine erſchlaffende Hitze erlaubt nicht die Anzahl der Athemzüge (durch Bewegung und Anſtrengung) zu ſteigern, den Verbrauch alſo mit dem, was er zu ſich genommen, in Verhältniß zu ſetzen.

Im Gegenſatz hierzu ſendet England ſeine Patienten, deren kranken Verdauungsorganen die Fähigkeit abgeht oder vermindert iſt, die Speiſen in den Zuſtand zu verſetzen, in welchem ſie ſich zur Verbindung mit dem Sauerſtoff eignen, welche alſo weniger Widerſtand produziren, als das Klima, die Temperatur ihrer Heimath verlangt, nach ſüdlichen Gegenden, wo die Menge des eingeathmeten Sauerſtoffs in einem ſo großen Verhältniß ſich vermindert, und das Reſultat, eine Verbeſſerung des Geſundheitzuſtandes, iſt ſichtbar. Die kranken Verdauungsorgane haben Kraft genug, um die geringere Menge von Speiſe in Verhältniß zu ſetzen mit dem verbrauchten Sauerſtoff; in dem kälteren Klima würden die Reſpirationsorgane ſelbſt zu dieſem Widerſtande dienen müſſen.

Im Sommer ſind bei uns die Leberkrankheiten (Kohlenſtoffkrankheiten), im Winter die Lungenkrankheiten (Sauerſtoffkrankheiten) vorherrſchend.

Die Abkühlung des Körpers, durch welche Urſache es auch ſei, bedingt eine größeres Maaß von Speiſe. Der bloße Aufenthalt in freier Luft, gleichgültig ob im Reiſewagen oder auf dem Verdecke von Schiffen, erhöht durch

Strahlung und gesteigerte Verdunstung den Wärmeverlust, selbst ohne vermehrte Bewegung; er zwingt uns mehr wie gewöhnlich zu essen. Dasselbe muß für Personen gelten, welche gewohnt sind große Quantitäten kaltes Wasser zu trinken, welches auf 37° erwärmt wieder abgeht, es vermehrt den Appetit, und schwächliche Constitutionen müssen durch anhaltende Bewegung den zum Ersatz der an das kalte Wasser abgegebenen Wärme nöthigen Sauerstoff dem Körper hinzuführen. Starkes und anhaltendes Sprechen und Singen, das Schreien der Kinder, feuchte Luft, alles dieses übt einen bestimmten nachweisbaren Einfluß auf die zu genießenden Speisen aus.

IV.

In dem Vorhergehenden ist angenommen worden, daß vorzüglich der Kohlenstoff und Wasserstoff zur Verbindung mit dem Sauerstoff und zur Hervorbringung der animalischen Wärme dient; die einfachsten Beobachtungen zeigen in der That, daß der Wasserstoff der Speisen eine nicht minder wichtige Rolle wie der Kohlenstoff spielt.

Der ganze Respirationsproceß erscheint in völliger Klarheit, wenn wir den Zustand eines Menschen oder Thieres, bei Enthaltung aller Speise, ins Auge fassen. Die Athembewegungen bleiben ungeändert, es wird nach wie vor Sauerstoff aus der Atmosphäre aufgenommen und Kohlensäure und Wasserdampf ausgeathmet. Wir wissen mit unzweifelhafter

Beſtimmtheit, woher der Kohlenſtoff und Waſſerſtoff ſtammt, denn mit der Dauer des Hungers ſehen wir den Kohlenſtoff und Waſſerſtoff des Körpers ſich vermindern.

Die erſte Wirkung des Hungers iſt ein Verſchwinden des Fettes; dieſes Fett iſt weder in den ſparſamen Faeces, noch im Urin nachweisbar, ſein Kohlenſtoff und Waſſerſtoff ſind durch Haut und Lunge in der Form von Sauerſtoffverbindungen ausgetreten; es iſt klar, dieſe Beſtandtheile haben zur Reſpiration gedient.

Jeden Tag treten 65 Loth Sauerſtoff ein und nehmen beim Austreten einen Theil von dem Körper des Hungernden mit. (Currie ſah einen Kranken, der nicht ſchlingen konnte, während eines Monates über 100 Pfd. an ſeinem Gewichte verlieren, und ein fettes Schwein, was durch einen Bergſturz verſchüttet wurde, lebte 160 Tage ohne Nahrung, und hatte über 120 Pfd. am Gewichte verloren. (Martell in den Transactions of the Linnéan Soc. Vol. XI. p. 411.) Das Verhalten der Winterſchläfer, ſo wie die periodenweiſe Anſammlung von Fett bei andern Thieren, von Fett, was in andern Perioden ihres Lebens wieder verſchwindet, ohne eine Spur zu hinterlaſſen, alle dieſe wohlbekannten Thatſachen beweiſen, daß der Sauerſtoff in dem Reſpirationsproceß keine Auswahl unter den Stoffen trifft, die ſich zu einer Verbindung mit ihm eignen. Der Sauerſtoff verbindet ſich mit allem, was ihm dargeboten wird, und nur Mangel an Waſſerſtoff iſt der Grund, warum ſich überhaupt Kohlenſäure bildet, eben weil bei der Temperatur des Körpers die Ver-

wandtschaft des Wasserstoffs zum Sauerstoff bei weitem die des Kohlenstoffs übertrifft.

Wir wissen in der That, daß die grasfressenden Thiere ein dem eingeathmeten Sauerstoff gleiches Volum Kohlensäure wieder ausathmen, während bei den Fleischfressern, der einzigen Thierklasse, welche Fett in ihrer Nahrung genießt, mehr Sauerstoff aufgenommen wird, als dem ausgeathmeten Kohlensäurevolum entspricht; bestimmte Versuche haben dargethan, daß in manchen Fällen nur die Hälfte von dem Volumen des Sauerstoffs an Kohlensäuregas ausgeathmet wird. Diese Beobachtungen sind keiner Widerlegung fähig, sie sind überzeugender, als alle die künstlich und willkürlich hervorgerufenen Erscheinungen, die man Versuche nennt, Versuche, welche, völlig entbehrlich, alles Gegengewichtes ermangeln, wenn die Gelegenheit zur Beobachtung in der Natur sich darbietet und diese Gelegenheit verständig benutzt wird.

Bei Hungernden verschwindet aber nicht allein das Fett, sondern nach und nach alle der Löslichkeit fähigen, festen Stoffe. In dem völlig abgezehrten Körper der Verhungerten sind die Muskeln dünn und mürbe, der Contractibilität beraubt, alle Theile des Körpers, welche fähig waren, in den Zustand der Bewegung überzugehen, sie haben dazu gedient, um den Rest der Gebilde vor der alles zerstörenden Wirkung der Atmosphäre zu schützen; zuletzt nehmen die Bestandtheile des Gehirns Antheil an diesem Oxydationsproceß, es erfolgt Wahnsinn, Irrereden und der Tod, das heißt, aller Widerstand hört völlig auf, es tritt der chemische Pro-

ceß der Verweſung ein, alle Theile des Körpers verbinden ſich mit dem Sauerſtoff der Luft.

Die Zeit, in welcher ein Verhungernder ſtirbt, richtet ſich nach dem Zuſtand der Fettleibigkeit, nach dem Zuſtand der Bewegung (Anſtrengung und Arbeit), nach der Temperatur der Luft, und iſt zuletzt abhängig von der Gegenwart oder Abweſenheit des Waſſers. Durch die Haut und Lunge verdunſtet eine gewiſſe Menge Waſſer, durch deren Austreten, als die Bedingung aller Vermittelung von Bewegungen, der Tod beſchleunigt wird. Es giebt Fälle, wo bei ungeſchmälertem Waſſergenuß der Tod erſt nach 20, in einem Fall erſt nach 60 Tagen erfolgte.

In allen chroniſchen Krankheiten erfolgt der Tod durch die nämliche Urſache, durch die Einwirkung der Atmoſphäre. Wenn die Stoffe fehlen, welche in dem Organismus zur Unterhaltung des Reſpirationsproceſſes beſtimmt ſind, wenn die Organe des Kranken ihre Funktion verſagen, wenn ſie die Fähigkeit verlieren, zu ihrem eignen Schutz die genoſſenen Speiſen in den Zuſtand zu verſetzen, in dem ſich ihre Beſtandtheile mit dem Sauerſtoff der Luft zu verbinden vermögen, ſo wird ihre eigne Subſtanz, das Fett, das Gehirn, die Subſtanz der Muskeln und Nerven dazu verwendet *).

Die eigentliche Urſache des Todes iſt in dieſen Fällen der Reſpirationsproceß, die Einwirkung der Atmoſphäre.

*) In Beziehung auf den wahren Vorgang verweiſe ich auf die Betrachtung des Stoffwechſels in dem Körper der Carnivoren (ſ. im Folgenden).

Mangel an Nahrung, an Fähigkeit, ſie zu Beſtandtheilen des Organismus zu machen, iſt Mangel an Widerſtand, es iſt die negative Urſache des Aufhörens der Lebensthätigkeit. Die Flamme geht aus, weil das Oel verzehrt iſt; es iſt der Sauerſtoff der Luft, der es verzehrt hat.

In manchen Krankheitszuſtänden erzeugen ſich Stoffe, die zur Aſſimilation nicht verwendbar ſind, durch bloße Enthaltung von Speiſen werden ſie aus dem Körper entfernt, ſie verſchwinden, ohne eine Spur zu hinterlaſſen, indem ihre Beſtandtheile mit dem Sauerſtoff der Luft in Verbindung treten.

Von dem Augenblicke an, wo die Funktion der Haut oder Lunge eine Störung erleidet, erſcheinen kohlenſtoffreichere Stoffe im Urin, der ſeine gewöhnliche Farbe in braun umändert. Von der ganzen Oberfläche des menſchlichen Körpers wird Sauerſtoff aus der Luft aufgenommen, der ſich mit allen Materien verbindet, die ſeiner Action keinen Widerſtand entgegenſetzen; an allen Stellen des Körpers, wo der Zutritt des Sauerſtoffs gehemmt iſt, unter den Achſelhöhlen und an den Füßen z. B., bemerken wir eine Ausſcheidung von Stoffen, die ſich durch ihren Zuſtand oder durch den Geruch den Sinnen zu erkennen geben.

Die Reſpiration iſt das fallende Gewicht, die geſpannte Feder, welche das Uhrwerk in Bewegung erhält, die Athemzüge ſind die Pendelſchläge, die es reguliren. Wir kennen bei unſeren gewöhnlichen Uhren mit mathematiſcher Schärfe die Aenderungen, welche durch die Länge des Pendels oder durch äußere Temperaturen ausgeübt werden, auf ihren re-

gelmäßigen Gang; allein nur von Wenigen iſt in ſeiner Klarheit der Einfluß erkannt, den Luft und Temperatur auf den Geſundheitszuſtand des menſchlichen Körpers ausüben, und doch iſt die Ausmittelung der Bedingungen, um ihn im normalen Zuſtand zu erhalten, nicht ſchwieriger, wie bei einer gewöhnlichen Uhr.

V.

Der Mangel an einer richtigen Anſicht von Kraft und Wirkung und dem Zuſammenhang der Naturerſcheinungen hat die Chemiker dahin geführt, einen Theil der im Thierorganismus ſich erzeugenden Wärme den Wirkungen des Nervenſyſtems zuzuſchreiben. Wenn man damit einen Stoffwechſel als Bedingung der Nervenwirkungen ausſchließt, ſo will dies nichts anders ſagen, als das Vorhandenſein einer Bewegung, die Aeußerung einer Thätigkeit hervorgehen zu machen aus Nichts. Allein aus Nichts kann keine Kraft, keine Thätigkeit entſtehen.

Niemand wird ernſtlich den Antheil läugnen, welchen die Nervenapparate an dem Reſpirationsproceß nehmen, keine Art von Zuſtandsänderung kann im Thierkörper vor ſich gehen, ohne die Nerven, denn ſie ſind die Bedinger aller Bewegungen. Durch ſie, durch ihre Mitwirkung produciren die Eingeweide die Stoffe, welche als Mittel zum Widerſtande gegen die Einwirkung des Sauerſtoffs zur Hervorbringung der animaliſchen Wärme dienen, und mit dem Aufhören ihrer Funktionen muß der ganze Akt der Sauerſtoff-

aufnahme eine andere Form annehmen. Beim Durchschneiden des Gehirns von Hunden beim Pons varolii, bei Contusionen gegen Scheitel und Hinterhaupt fährt das Thier eine Zeitlang zu athmen fort, oft rascher und lebhafter, wie im gesunden Zustande, die Schnelligkeit des Blutumlaufs nimmt in der ersten Zeit eher zu als ab, allein das Thier erkaltet, wie wenn ein plötzlicher Tod eingetreten wäre, der dann auch unabwendbar erfolgt; ganz ähnliche Erfahrungen hat man bei Durchschneidung des Rückenmarks, des Nervus vagus gemacht. Die Athembewegungen dauern eine Zeitlang fort, allein der Sauerstoff findet die Stoffe auf seinem Wege nicht vor, mit denen er sich im normalen Zustande verbunden haben würde, weil sie ihm von den gelähmten Unterleibsorganen nicht geliefert werden können. Die sonderbare Ansicht über die Erzeugung der thierischen Wärme durch die Nerven, sie ist, wie man leicht bemerkt, aus der Vorstellung hervorgegangen, daß das eingesaugte Sauerstoffgas in dem Blute selbst zu Kohlensäure werde, in welchem Fall, in obigen Versuchen, freilich die Temperatur des Körpers nicht abnehmen dürfte, allein es kann, wie später entwickelt werden soll, keinen größeren Irrthum geben.

Aehnlich wie bei Durchschneidung der pneumogastrischen Nerven die Bewegung des Magens und die Secretion des Magensaftes aufgehoben und damit dem Verdauungsproceß eine unmittelbare Gränze gesetzt wird, ändert die Lähmung der Bewegungsorgane des Unterleibs den Respirationsproceß; beide stehen in dem engsten Zusammenhang mit einan-

gelmäßigen Gang; allein nur von Wenigen iſt in ſeiner Klarheit der Einfluß erkannt, den Luft und Temperatur auf den Geſundheitszuſtand des menſchlichen Körpers ausüben, und doch iſt die Ausmittelung der Bedingungen, um ihn im normalen Zuſtand zu erhalten, nicht ſchwieriger, wie bei einer gewöhnlichen Uhr.

V.

Der Mangel an einer richtigen Anſicht von Kraft und Wirkung und dem Zuſammenhang der Naturerſcheinungen hat die Chemiker dahin geführt, einen Theil der im Thierorganismus ſich erzeugenden Wärme den Wirkungen des Nervenſyſtems zuzuſchreiben. Wenn man damit einen Stoffwechſel als Bedingung der Nervenwirkungen ausſchließt, ſo will dies nichts anders ſagen, als das Vorhandenſein einer Bewegung, die Aeußerung einer Thätigkeit hervorgehen zu machen aus Nichts. Allein aus Nichts kann keine Kraft, keine Thätigkeit entſtehen.

Niemand wird ernſtlich den Antheil läugnen, welchen die Nervenapparate an dem Reſpirationsproceß nehmen, keine Art von Zuſtandsänderung kann im Thierkörper vor ſich gehen, ohne die Nerven, denn ſie ſind die Bedinger aller Bewegungen. Durch ſie, durch ihre Mitwirkung produciren die Eingeweide die Stoffe, welche als Mittel zum Widerſtande gegen die Einwirkung des Sauerſtoffs zur Hervorbringung der animaliſchen Wärme dienen, und mit dem Aufhören ihrer Funktionen muß der ganze Akt der Sauerſtoff-

aufnahme eine andere Form annehmen. Beim Durchschneiden des Gehirns von Hunden beim Pons varolii, bei Contusionen gegen Scheitel und Hinterhaupt fährt das Thier eine Zeitlang zu athmen fort, oft rascher und lebhafter, wie im gesunden Zustande, die Schnelligkeit des Blutumlaufs nimmt in der ersten Zeit eher zu als ab, allein das Thier erkaltet, wie wenn ein plötzlicher Tod eingetreten wäre, der dann auch unabwendbar erfolgt; ganz ähnliche Erfahrungen hat man bei Durchschneidung des Rückenmarks, des Nervus vagus gemacht. Die Athembewegungen dauern eine Zeitlang fort, allein der Sauerstoff findet die Stoffe auf seinem Wege nicht vor, mit denen er sich im normalen Zustande verbunden haben würde, weil sie ihm von den gelähmten Unterleibsorganen nicht geliefert werden können. Die sonderbare Ansicht über die Erzeugung der thierischen Wärme durch die Nerven, sie ist, wie man leicht bemerkt, aus der Vorstellung hervorgegangen, daß das eingesaugte Sauerstoffgas in dem Blute selbst zu Kohlensäure werde, in welchem Fall, in obigen Versuchen, freilich die Temperatur des Körpers nicht abnehmen dürfte, allein es kann, wie später entwickelt werden soll, keinen größeren Irrthum geben.

Aehnlich wie bei Durchschneidung der pneumogastrischen Nerven die Bewegung des Magens und die Secretion des Magensaftes aufgehoben und damit dem Verdauungsproceß eine unmittelbare Gränze gesetzt wird, ändert die Lähmung der Bewegungsorgane des Unterleibs den Respirationsproceß; beide stehen in dem engsten Zusammenhang mit einan-

der; eine jede Störung des Nervenſyſtems, der Verdauungsnerven übt rückwärts einen wahrnehmbaren Einfluß auf den Reſpirationsproceß aus.

Man hat zuletzt die Beobachtung gemacht, daß durch die Contraction der Muskeln Wärme erzeugt wird, ähnlich wie in einem Stücke Kautſchuck, was man, raſch aus einander gezogen, ſich wieder contrahiren läßt. Man iſt ſo weit gegangen, einen Theil der thieriſchen Wärme den mechaniſchen Bewegungen im Körper zuzuſchreiben, als ob die Bewegungen ſelbſt entſtehen könnten, ohne einen gewiſſen Aufwand von Kraft, welche durch dieſe Bewegungen verzehrt wird. Durch was aber, kann man hier fragen, wird dieſe Kraft erzeugt?

Durch verbrennenden Kohlenſtoff, durch Auflöſung eines Metalls in einer Säure, durch die Vereinigung der beiden Elektricitäten, durch Einſaugung von Licht entſteht Wärme. Gleichermaßen entſteht Wärme, wenn wir zwei Stücke eines feſten Körpers mit einer gewiſſen Geſchwindigkeit auf einander reiben.

Durch eine Menge in ihren Aeußerungen höchſt verſchiedener Urſachen können wir einerlei Effekt hervorbringen. Wir haben in der Verbrennung und in der Elektricitätserzeugung einen Stoffwechſel, oder, wie in dem Licht und der Reibungswärme, die Verwandlung einer vorhandenen Bewegung in eine neue, die auf eine andere Weiſe auf unſere Sinne wirkt. Wir haben ein Subſtrat, etwas Gegebenes, was die Form eines andern Subſtrates annimmt, in allen Fällen eine Kraft und eine Wirkung. Wir können

durch Feuer unter einer Dampfmaschine alle möglichen Arten von Bewegungen, und durch ein gegebenes Maaß von Bewegung Feuer hervorbringen.

Ein Stück Zucker, das wir auf einem Reibeisen reiben, erleidet an den Berührungsflächen des Eisens die nämliche Veränderung, wie durch eine hohe Temperatur, und zwei Stücke Eis schmelzen an den Punkten, wo sie sich reibend berühren.

Man muß sich nur erinnern, daß die ausgezeichnetsten Physiker die Erscheinungen der Wärme nur als Bewegungserscheinungen gelten lassen, eben weil der Begriff der Erzeugung einer Materie, wenn auch einer gewichtslosen, schlechterdings nicht vereinbar ist mit ihrer Entstehung durch mechanische Ursachen, wie durch Reibung und Bewegung.

Alles zugegeben, was von elektrischen und magnetischen Störungen in dem Thierkörper Antheil nehmen mag an den Funktionen seiner Organe, die letzte Ursache aller dieser Thätigkeiten ist ein Stoffwechsel, ausdrückbar durch einen in einer gewissen Zeit stattfindenden Uebergang der Bestandtheile der Speisen in Sauerstoffverbindungen; diejenigen unter ihnen, welche diesen allmähligen Verbrennungsproceß nicht erfahren, sie werden unverbrannt oder unverbrennlich in der Form von Excrementen ausgestoßen.

Es ist nun schlechterdings unmöglich, daß eine gegebene Menge Kohlenstoff oder Wasserstoff, welche verschiedene Formen sie auch im Laufe der Verbrennung annehmen mögen, mehr Wärme hervorzubringen fähig ist, als wie sie

liefert, wenn ſie im Sauerſtoffgas oder in der Luft direkt verbrannt wird.

Wenn wir Feuer unter eine Dampfmaſchine machen und die erhaltene Kraft benutzen, um durch Reibung Wärme hervorzubringen, ſo kann dieſe in keiner Weiſe jemals größer ſein, als die Wärme, die wir nöthig gehabt haben, um den Dampfkeſſel zu heizen, und wenn wir in einer galvaniſchen Säule den Strom zur Hervorbringung von Wärme benutzen, ſo iſt dieſe unter allen Umſtänden nicht größer, als wir ſie haben können durch die Verbrennung des Zinks, was ſich in der Säure auflöſ't.

Die Contraction der Muskeln erzeugt Wärme, die hierzu nöthige Kraft äußert ſich durch die Organe der Bewegung, die ſie durch einen Stoffwechſel empfangen. Die letzte Urſache der erzeugten Wärme kann natürlich nur dieſer Stoffwechſel ſein.

Durch die Auflöſung eines Metalls in einer Säure entſteht ein elektriſcher Strom; durch einen Draht geleitet, wird dieſer zu einem Magneten, durch den wir verſchiedene Effekte hervorzubringen vermögen. Die Urſache aller erzeugten Erſcheinungen iſt der Magnetismus, die Urſache der magnetiſchen Wirkungen ſuchen wir in dem elektriſchen Strom, und die letzte Urſache des elektriſchen Stromes, wir finden ſie in einem Stoffwechſel, in einer chemiſchen Action.

Es giebt verſchiedene Urſachen der Krafterzeugung; eine geſpannte Feder, ein Luftſtrom, eine fallende Waſſermaſſe, Feuer, was unter einem Dampfkeſſel brennt, ein Metall, was ſich in einer

Säure löst, durch alle diese verschiedenen Ursachen der Bewegung läßt sich einerlei Effekt hervorbringen. In dem thierischen Körper erkennen wir aber als die letzte Ursache aller Krafterzeugung nur eine, und diese ist die Wechselwirkung, welche die Bestandtheile der Speisen und der Sauerstoff der Luft auf einander ausüben. Die einzige bekannte und letzte Ursache der Lebensthätigkeit im Thier sowohl, wie in der Pflanze ist ein chemischer Proceß; schließen wir ihn aus, so stellen sich die Lebensäußerungen nicht ein, oder sie hören auf, wahrnehmbar zu sein; hindern wir die chemische Action, so nehmen die Lebenserscheinungen andere Formen an.

Nach den Versuchen von Despretz entwickelt 1 Loth Kohlenstoff bei seiner Verbrennung so viel Wärme, daß damit 105 Loth Wasser von 0° auf 75° erwärmt werden können, im Ganzen also 105mal 75° = 7875° Wärme. Die 27,8 Loth Kohlenstoff, welche sich in dem Körper eines Soldaten in Kohlensäure verwandeln, entwickeln mithin 27,8mal 7875° Wärme = 218825° Wärme. Mit dieser Wärmemenge kann man 1 Loth Wasser auf diese Temperatur erheben oder 68$^{1}/_{10}$ Pfd. Wasser zum Sieden oder 185 Pfd. auf 37° erhitzen, oder 12 Pfd. Wasser bei 37° in Dampf verwandeln.

Wenn wir nun annehmen, daß die Ausdünstung durch Haut und Lunge in 24 Stunden 48 Unzen (3 Pfd.) betrage, so bleiben, die hierzu nöthige Wärmemenge abgezogen, 162093 Grad Wärme, welche durch Strahlung, durch Erwärmung der ausgeathmeten Luft, durch Faeces und Urin aus dem Körper treten.

Es iſt in dieſer Rechnung die durch den verbrennenden Waſſerſtoff, durch ſeinen Uebergang in Waſſer, erzeugte Wärmemenge nicht in Anſchlag gebracht. Wenn man ſich nun erinnert, daß die ſpecifiſche Wärme der Knochen, des Fettes, der Subſtanz der Organe weit geringer iſt, als die des Waſſers, daß ſie alſo, um auf 37° erwärmt zu werden, weit weniger Wärme bedürfen, als ein gleiches Gewicht Waſſer, ſo kann es keinem Zweifel unterliegen, daß, alle dieſe Verhältniſſe mit in Rechnung gezogen, die durch den Verbrennungsproceß erzeugte Wärme vollkommen hinreicht, um die conſtante Temperatur des Körpers und die Verdunſtung zu erklären.

VI.

Alle Verſuche der Phyſiker über die Sauerſtoffmenge, die ein Thier in einer gegebenen Zeit verzehrt, ſo wie die Schlüſſe, die man daraus auf die Entſtehung der animaliſchen Wärme gezogen hat, ſind völlig bedeutungslos, denn dieſe Sauerſtoffmengen wechſeln, nach der Temperatur und der Dichtigkeit der Luft, nach dem Zuſtand der Bewegung, Arbeit und Anſtrengung, ſie ändern ſich nach der Menge und Qualität der genoſſenen Nahrung, mit der mehr oder weniger warmen Kleidung, nach der Zeit, in welcher die Speiſe verzehrt wurde. Die Gefangenen in dem Zuchthaus (Arbeitshaus) zu Marienſchloß verzehren nicht über 21 Loth Kohlenſtoff, die in dem Arreſthaus zu Gießen, denen alle Bewegung mangelt,

nicht über 17 Loth *) und in einer mir bekannten Haushaltung verzehrten 9 Personen (4 Kinder, 5 Erwachsene) durchschnittlich nicht über 19 Loth Kohlenstoff *). Annäherungsweise kann angenommen werden, daß die aufgenommenen Sauerstoffmengen sich wie diese Zahlen verhalten, allein durch Fleisch, Wein und Fettgenuß ändern sich diese Verhältnisse in Folge des ausgetretenen Wasserstoffs dieser Nahrungsmittel, der in seiner Verwandlung in Wasser bei gleichem Gewichte eine weit größere Wärmemenge hervorbringt.

Die Versuche über die Bestimmung der Wärmemenge, die sich für einen gegebenen Sauerstoffverbrauch aus einem Thier entwickelt, sind nicht minder bedeutungslos. Man hat Thiere in geschlossenen, mit kaltem Wasser umgebenen Räumen athmen lassen, die Wärmezunahme der Umgebung durch den Thermometer gemessen und die Menge des verschwundenen Sauerstoffgases, so wie die erzeugte Kohlensäure durch die Analyse der ein- und ausgetretenen Luft bestimmt. In diesen Versuchen hat man gefunden, daß das Thier mehr Wärme verlor, als dem verzehrten Sauerstoff entsprach, und zwar $\frac{1}{10}$ mehr, und wenn man dem Thiere die Luftröhre zugebunden haben würde, so wäre das merkwürdige Verhältniß eingetreten, daß das umgebende Wasser durch das erkaltende Thier Wärme empfangen hätte, ohne allen Ver-

*) In dieser Haushaltung wurden im Monat verbraucht 151 Pfd. Schwarzbrod, 70 Pfd. Weißbrod, 132 Pfd. Fleisch, 19 Pfd. Zucker, 15,9 Pfd. Butter, 57 Maaß Milch, der Kohlenstoff der Gemüse und Kartoffeln, des Wildprets, Geflügels und Weins für die Excremente angeschlagen.

brauch von Sauerstoff. Die Temperatur des Thiers war 38°, die des umgebenden Wassers in den Versuchen von Despretz 8,5°. Diese Versuche beweisen also, daß bei einer großen Differenz der Temperatur des Körpers und der der Umgebung, beim Mangel aller Bewegung, mehr Wärme entweicht, als dem eingeathmeten Sauerstoff entspricht; in gleichen Zeiten bei freier ungehinderter Bewegung würde eine weit größere Menge Sauerstoff aufgenommen worden sein, ohne bemerkbare Erhöhung des Wärmeverlustes. Dieser Zustand tritt bei Menschen und Thieren zu gewissen Jahreszeiten ein, und wir sagen in diesem Fall, daß wir frieren. Es ist klar, daß, wenn wir einen Menschen mit einem metallischen Kleide umgeben, der Wärmeverlust, wenn wir ihm Hände und Füße binden, bei gleichem Sauerstoffverbrauch weit größer sein wird, als wenn wir ihn in Pelz und Wolle stecken, ja wir finden sogar, daß er in dem letztern Fall anfängt zu schwitzen, daß warmes Wasser quellenweise aus den feinen Schweißlöchern seiner Haut tritt.

Wenn man hinzunimmt, daß ganz bestimmte Beobachtungen vorliegen, wo Thiere, die gebunden in einer unnatürlichen Stellung, z. B. auf dem Rücken liegend, athmeten, daß die Temperatur ihres Körpers durch den Thermometer meßbar abnimmt, so kann man wohl schwerlich über die Schlüsse, die man aus diesen Versuchen gezogen hat, im Zweifel sein.

Diese Schlüsse haben für die Meinung, daß eine andere

unbekannte Quelle der Wärme in dem thierischen Körper existire, nicht den allergeringsten Werth.

VII.

Wenn wir die Erzeugung von Kraft, die Bewegungserscheinungen mit Nervenleben, und den Widerstand, den Zustand des statischen Gleichgewichtes mit vegetativem Leben bezeichnen, so ist klar, daß im jugendlichen Alter bei allen Thierklassen das letztere, nämlich das vegetative Leben, das Nervenleben überwiegt.

Der Uebergang des in Bewegung befindlichen Stoffs in den Zustand der Ruhe zeigt sich in einer Zunahme an Masse, in einem Ersatz an verbrauchtem Stoffe; die Bewegung selbst, die Krafterzeugung stellt sich dar als ein Verbrauch an Stoff.

In dem jugendlichen Thiere ist der Verbrauch kleiner, als die Zunahme, und diesen Zustand eines intensiveren vegetativen Lebens behält das weibliche Thier bis zu einem gewissen Lebensalter unverändert bei, es erreicht nicht, wie beim männlichen Thiere, mit der Ausbildung aller Organe eine Gränze.

Das weibliche Thier ist zu gewissen Perioden des Jahrs der Fortpflanzung fähig, durch äußere Bedingungen, Temperatur, Nahrung ꝛc. wird das vegetative Leben in seinem Organismus gesteigert, er producirt mehr als er verwendet; diese Fähigkeit zeigt sich in der Fortpflanzung. Unabhängig von äußeren Bedingungen der Steigerung des vegetativen

Lebens iſt das Weib des Menſchen, mit der Ausbildung aller ſeiner Organe, zu jeder Zeit der Fortpflanzung fähig, die Empfängniß iſt an keine Periode gebunden, und eine wunderbare Weisheit hat in ſeinen Körper die Fähigkeit gelegt, bis zu einem beſtimmten Lebensalter alle Beſtandtheile ſeiner Organe in größerer Menge zu erzeugen, als ſie zur Reproduktion der umgeſetzten Gebilde erforderlich ſind. Dieſes Erzeugniß enthält nachweisbar alle Elemente eines ihm gleichen Weſens, es vermehrt ſich in jedem Lebensmomente und wird, bis es Verwendung findet, periodenweiſe aus dem Körper abgeſchieden. Mit der Befruchtung des Ei's hört dieſe Abſcheidung auf, jeder Tropfen des mehrerzeugten Blutes formt ſich zu einem der Mutter ähnlichen Organismus.

Durch Bewegung und Anſtrengung wird die Menge des abgeſchiedenen Blutes geringer, und bei krankhafter Unterdrückung der Menſtruation zeigt ſich das vegetative Leben in einer geſteigerten Fettbildung. Wird das Gleichgewicht des vegetativen und Nervenlebens bei dem Manne geſtört, wird die Intenſität des letztern, wie bei den Caſtraten, verringert, ſo zeigt ſich das Uebergewicht des erſtern in einer gleichen Form, in einer Steigerung der Fettbildung.

VIII.

Wenn wir feſthalten, daß die Zunahme an Maſſe in dem thieriſchen Körper, daß die Ausbildung ſeiner Organe und ihrer Reproduktion aus dem Blute, d. h. aus den Be-

standtheilen des Blutes, geschieht, so können nur diejenigen Materien Nahrungsmittel genannt werden, welche fähig sind zu Blut zu werden. Die Untersuchung der Stoffe, die sich hierzu eignen, beschränkt sich hiernach auf die Ausmittelung der Zusammensetzung der Nahrungsmittel und ihrer Vergleichung mit der Zusammensetzung der Bestandtheile des Blutes.

Zwei Materien sind als Hauptbestandtheile des Blutes vorzüglich in Betracht zu ziehen. Die eine davon scheidet sich augenblicklich aus dem Blute ab, sobald es aus der Circulation genommen wird. Jedermann weiß, daß das Blut in diesem Fall gerinnt, es trennt sich in eine gelbliche Flüssigkeit, in Blutserum, und eine gallertartige Masse, die sich in weichen, zähen elastischen Fäden an einen Stab oder eine Ruthe anhängt, mit denen man das frische Blut während seines Gerinnens peitscht oder schlägt. Dieser Körper ist das Fibrin, Blutfaserstoff, er ist identisch in seinen Eigenschaften mit der von allen anderen Materien befreiten Muskelfaser.

Der zweite Hauptbestandtheil des Blutes ist im Blutserum enthalten, er ertheilt dieser Flüssigkeit alle Eigenschaften des weißen Theils des Hühnerei's, indem er identisch mit diesem Bestandtheil aller Eier ist. Er gerinnt in der Hitze zu einer weißen elastischen Masse; dieser gerinnende Bestandtheil hat den Namen Albumin erhalten.

Fibrin und Albumin, die Hauptbestandtheile des Blutes, enthalten im Ganzen 7 chemische Elemente, unter welche

namentlich Stickſtoff, Phosphor und Schwefel, ſo wie die Subſtanz der Knochen gehört. In dem Serum befinden ſich Kochſalz und Salze in Auflöſung, welche Kali, Natron als Baſen enthalten, ſie ſind mit Kohlenſäure, Phosphorſäure und Schwefelſäure verbunden. Die Blutkörperchen enthalten Fibrin und Albumin, ſowie einen rothen Farbſtoff, in welchem Eiſen einen nie fehlenden Beſtandtheil ausmacht. Außer dieſen enthält das Blut noch einige fette Körper in geringer Menge, die ſich von den gewöhnlichen Fetten durch verſchiedene Eigenſchaften unterſcheiden.

Die chemiſche Analyſe hat zu dem merkwürdigen Reſultate geführt, daß Fibrin und Albumin einerlei organiſche Elemente und zwar in dem nämlichen Gewichtsverhältniß enthalten, in der Art alſo, daß, wenn man zwei Analyſen, die eine von Fibrin, die andere von Albumin neben einander ſtellt, wir keinen größeren Unterſchied in der procentiſchen Zuſammenſetzung wahrnehmen, wie in zwei Analyſen von Fibrin, oder in zwei Analyſen von Albumin.

In beiden Blutbeſtandtheilen ſind offenbar, dies zeigt ihr verſchiedener Zuſtand, die Elemente auf verſchiedene Weiſe geordnet, allein ihrer Zuſammenſetzung nach ſind ſie identiſch.

Dieſer Schluß iſt neuerdings aufs Schönſte dadurch beſtätigt worden, daß es einem ausgezeichneten Phyſiologen (P. Denis) gelang, Fibrin in den Zuſtand von Albumin künſtlich überzuführen, ihm alſo die Löslichkeit und Gerinnbarkeit zu geben, die das Eiweiß charakteriſirt.

Neben der gleichen Zuſammenſetzung haben ſie noch die

chemische Eigenschaft mit einander gemein, daß sie sich beide in starker Salzsäure zu einer intensiv indigblauen Flüssigkeit lösen, welche gegen alle Materien, die man damit zusammenbringt, ein ganz gleiches Verhalten zeigt.

Albumin und Fibrin können beide in dem Ernährungsprocesse zu Muskelfaser werden, und Muskelfaser kann rückwärts wieder in Blut übergehen. Dieser Uebergang ist von den Physiologen längst außer allen Zweifel gestellt, und die Chemie hat also nur nachgewiesen, daß die Metamorphose rückwärts und vorwärts erfolgen kann, kraft einer einwirkenden Thätigkeit, ohne Zuhülfenahme eines dritten Körpers oder seiner Bestandtheile, ohne daß also ein fremdes Element aufgenommen zu werden oder ein in Verbindung vorhandenes auszutreten braucht.

Wenn wir nun die Zusammensetzung aller Gebilde mit der des Fibrins und Albumins im Blute vergleichen, so ergeben sich folgende Beziehungen.

Alle Theile des Thierkörpers, die eine bestimmte Form besitzen, welche Bestandtheile von Organen sind, enthalten Stickstoff. Kein Theil oder Bestandtheil eines Organs, welches Bewegung und Leben besitzt, ist frei von Stickstoff, alle enthalten Kohlenstoff und die Elemente des Wassers, wiewohl diese letzteren *nie* in dem Verhältniß, wie im Wasser.

Die Hauptbestandtheile des Blutes enthalten nahe an 17 pCt. Stickstoff, kein Theil eines Organs enthält weniger, wie siebzehn Procent Stickstoff [7]).

Die entscheidendsten Versuche und Beobachtungen haben

bewieſen, daß der thieriſche Organismus durchaus unfähig iſt, ein chemiſches Element, Kohlenſtoff oder Stickſtoff, aus anderen Materien, in denen dieſe Körper fehlen, hervorzubringen, und es iſt hiernach einleuchtend, daß alle Nahrungsmittel, die zur Blutbildung oder zur Bildung von Zellen, Membranen, Haut, Haaren, Muskelfaſer dienen ſollen, eine gewiſſe Portion Stickſtoff enthalten müſſen, eben weil dieſer einen Beſtandtheil der genannten Organe ausmacht, dieſe aus anderen Elementen, die man ihnen darbietet, keinen Stickſtoff erzeugen können und weil kein Stickſtoff aus der Atmoſphäre in dem Lebensproceß verwendet wird.

Der thieriſche Körper enthält in der Nerven- und Gehirnſubſtanz eine große Menge Albumin und außer dieſem zwei eigenthümliche fette Säuren, die ſich von allen anderen Fetten durch einen Gehalt von Phosphor (-ſäure?) unterſcheiden (Fremy). Eins dieſer Fette enthält Stickſtoff.

Waſſer und Fett machen zuletzt die ſtickſtofffreien Beſtandtheile des Thierkörpers aus, beide ſind formlos und nehmen nur in ſofern Antheil an dem Lebensproceß, als durch ſie die Lebensfunktionen vermittelt werden. Die nichtorganiſchen Beſtandtheile des Thierkörpers ſind Eiſen, Kalk, Bittererde, Kochſalz, ſowie die Alkalien.

IX.

Die Ernährung der Fleiſchfreſſer nimmt unter allen Thierklaſſen die einfachſte Form an; ſie leben vom Blut und Fleiſch

der gras- und körnerfressenden Thiere, allein dieses Blut und Fleisch ist identisch in allen seinen Eigenschaften mit ihrem eigenen Blut und Fleisch, weder chemisch, noch physiologisch ist ein Unterschied wahrnehmbar.

Die Nahrung der fleischfressenden Thiere ist aus Blut entstanden, sie wird in ihrem Magen flüssig und überführbar in andere Körpertheile, sie wird in ihrem Leibe wieder zu Blut, und aus diesem Blut erzeugen sich alle Theile ihres Körpers wieder, die eine Veränderung oder Umsetzung erlitten haben.

Bis auf Klauen, Haare, Federn und Knochenerde ist kein Bestandtheil der Nahrung der Carnivoren unassimilirbar.

In chemischem Sinne kann man also sagen, daß das fleischfressende Thier zur Erhaltung seiner Lebensprocesse sich selbst verzehrt.

Dasjenige, was zu seiner Ernährung dient, ist identisch mit den Bestandtheilen seiner Organe, welche erneuert werden sollen.

Ganz anders stellt sich dem Anschein nach der Ernährungsproceß der pflanzenfressenden Thiere dar; ihre Verdauungsorgane sind minder einfach und ihre Nahrung besteht aus Vegetabilien, die ihrer Hauptmasse nach nur sehr wenig Stickstoff enthalten.

Aus welchen Stoffen, kann man fragen, entsteht bei ihnen das Blut, aus dem sich ihre Organe entwickeln?

Diese Frage läßt sich mit genügender Sicherheit beantworten.

Die chemiſchen Unterſuchungen haben dargethan, daß alle Theile von Pflanzen, welche Thieren zur Nahrung dienen, gewiſſe Beſtandtheile enthalten, welche reich ſind an Stickſtoff, und die gewöhnlichſten Erfahrungen beweiſen, daß die Thiere zu ihrer Erhaltung und Ernährung der Quantität nach um ſo weniger von dieſen Pflanzentheilen bedürfen, je reicher ſie an dieſen ſtickſtoffhaltigen Stoffen ſind; ſie können nicht mit Materien ernährt werden, worin ſie fehlen.

In vorzüglicher Menge ſind dieſe Erzeugniſſe der Pflanzen in den Samen der Getreidearten, der Erbſen, Linſen, Bohnen, in Wurzeln und in den Säften der ſogenannten Gemüspflanzen enthalten, ſie fehlen übrigens in keiner einzigen Pflanze, in keinem ihrer Theile.

Dieſe ſtickſtoffhaltigen Nahrungsſtoffe laſſen ſich im Ganzen auf drei Materien zurückführen, die ihrer äußern Beſchaffenheit nach leicht von einander zu unterſcheiden ſind. Zwei davon ſind im Waſſer löslich, der dritte wird davon nicht aufgenommen.

Wenn man friſch ausgepreßte Pflanzenſäfte ſich ſelbſt überläßt, ſo tritt nach wenigen Minuten eine Scheidung ein, es ſondert ſich ein gelatinöſer Niederſchlag ab, gewöhnlich von grüner Farbe, welcher, mit Flüſſigkeiten behandelt, die den Farbeſtoff löſen, eine grauweiße Materie hinterläßt. Dieſe Subſtanz iſt unter dem Namen grünes Satzmehl der Pflanzenſäfte den Pharmaceuten wohl bekannt. Dieß iſt der eine von den ſtickſtoffhaltigen Nahrungsmitteln der Thiere, er hat den Namen Pflanzenfibrin erhalten. Der

Saft der Gräser ist vorzüglich reich an diesem Bestandtheil, er ist in reichlichster Menge in dem Weizensamen, so wie überhaupt in den Samen der Cerealien enthalten, und kann aus dem Weizenmehl durch eine mechanische Operation ziemlich rein erhalten werden. In diesem Zustande heißt er Kleber, allein die klebenden Eigenschaften gehören ihm nicht an, sondern einer geringen Menge eines beigemischten fremden Körpers, der in den Samen der übrigen Getreidearten fehlt.

Wie sich aus der Art seiner Darstellung ergiebt, ist das Pflanzenfibrin im Wasser nicht löslich, obwohl man nicht zweifeln kann, daß es in der lebenden Pflanze im Safte gelöst vorhanden war, aus dem es sich, ähnlich wie das Fibrin aus Blut, erst später abschied.

Der zweite stickstoffhaltige Nahrungsstoff ist in dem Safte der Pflanzen gelöst, er scheidet sich daraus bei gewöhnlicher Temperatur nicht ab, wohl aber, wenn der Pflanzensaft zum Sieden erhitzt wird.

Bringt man den ausgepreßten klaren Saft, am besten von Gemüspflanzen, von Blumenkohl, Spargel, Kohlrüben, weißen Rüben u. s. w. zum Sieden, so entsteht darin ein Coagulum, welches in seiner äußern Beschaffenheit und seinen Eigenschaften schlechterdings nicht zu unterscheiden ist von dem Körper, der sich als Gerinnsel abscheidet, wenn man mit Wasser verdünntes Blutserum oder Eiweiß der Siedhitze aussetzt. Dies ist das Pflanzenalbumin; in vorzüglicher Menge findet sich dieser Körper in gewissen Sa-

men, in Nüſſen, Mandeln und anderen, in denen das Amylon der Getreideſamen ſich vertreten findet durch Oel oder Fett.

Der dritte ſtickſtoffhaltige Nahrungsſtoff, den die Pflanzen produciren, das Pflanzencaſein, findet ſich hauptſächlich in den Samenlappen der Erbſen, Linſen und Bohnen, er iſt wie das Pflanzenalbumin im Waſſer löslich, unterſcheidet ſich aber von ihm dadurch, daß ſeine Auflöſung durch Hitze nicht coagulirt wird; beim Abdampfen und Erhitzen zieht ſie an der Oberfläche eine Haut, und, mit Säuren verſetzt, entſteht darin ein Gerinnſel wie in der Thiermilch.

Dieſe drei Stoffe, Pflanzen-Fibrin, -Albumin und -Caſein, ſind die eigentlichen ſtickſtoffhaltigen Nahrungsſtoffe der pflanzenfreſſenden Thiere, alle anderen in Pflanzen vorkommenden ſtickſtoffhaltigen Materien werden entweder, wie die Stoffe in den Giftpflanzen und Medizinalpflanzen, von den Thieren nicht genoſſen, oder ſie ſind ihrer Nahrung in ſo außerordentlich kleinen Mengen beigemiſcht, daß ſie zur Vermehrung der Maſſe ihres Körpers nicht beizutragen vermögen.

Die chemiſche Unterſuchung der drei genannten Subſtanzen hat zu dem intereſſanten Reſultate geführt, daß ſie einerlei organiſche Elemente in dem nämlichen Gewichts-Verhältniſſe enthalten, und was noch weit merkwürdiger iſt, es hat ſich ergeben, daß ſie identiſch ſind in ihrer Zuſammenſetzung mit den Hauptbeſtandtheilen des Blutes, mit Fibrin

und Albumin. Sie lösen sich alle drei in concentrirter Salzsäure mit der nämlichen indigblauen Farbe auf, und auch in ihren physikalischen Eigenschaften sind Thierfibrin und Thieralbumin von Pflanzenfibrin und Pflanzenalbumin in keiner Weise verschieden. Es verdient ganz besonders hervorgehoben zu werden, daß hier unter einer gleichen Zusammensetzung nicht bloß eine ähnliche gemeint ist, sondern es ist auch in Beziehung auf ihren Gehalt an Phosphor, Schwefel, Knochenerde und Alkalien kein Unterschied wahrnehmbar [8]).

In welcher bewundernswürdigen Einfachheit erscheint nach diesen Entdeckungen der Bildungsproceß im Thiere, die Entstehung seiner Organe, der Hauptträger der Lebensthätigkeit. Die Pflanzenstoffe, welche in den Thieren zur Blutbildung verwendet werden, enthalten die Hauptbestandtheile des Blutes, Fibrin und Albumin, fertig gebildet allen ihren Elementen nach, alle Pflanzen enthalten noch überdies eine gewisse Menge Eisen, was wir im Blutfarbestoff wiederfinden. Pflanzenfibrin und Thierfibrin, Pflanzenalbumin und Thieralbumin sind kaum der Form nach verschieden; wenn diese Stoffe in der Nahrung der Thiere fehlen, so hört die Ernährung der Thiere auf, und wenn sie darin gegeben werden, so empfängt das pflanzenfressende Thier die nämlichen Materien, auf welche die fleischfressenden zu ihrer Erhaltung beschränkt sind.

Die Pflanzen erzeugen in ihrem Organismus das Blut aller Thiere, denn in dem Blut und Fleisch der pflanzenfressenden verzehren die fleischfressenden im eigentlichen Sinne

nur die Pflanzenſtoffe, von denen die erſteren ſich ernährt haben; Pflanzenfibrin und -Albumin nehmen in dem Magen des pflanzenfreſſenden Thiers genau die nämliche Form an, wie Thierfibrin und Thieralbumin in dem Magen der Carnivoren.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt ſich, daß die Entwickelung der Organe eines Thiers, ihre Vergrößerung und Zunahme an Maſſe an die Aufnahme gewiſſer Stoffe geknüpft iſt, die identiſch ſind mit den Hauptbeſtandtheilen ihres Blutes.

In dieſem Sinne kann man ſagen, daß der Thierorganismus ſein Blut nur der Form nach ſchafft, daß ihm die Fähigkeit mangelt, es aus anderen Stoffen zu erzeugen, die nicht identiſch ſind mit ſeinen Hauptbeſtandtheilen. Damit kann freilich nicht behauptet werden, daß ihm die Fähigkeit, andere Verbindungen zu erzeugen, abgehe, wir wiſſen im Gegentheil, daß ſein Organismus eine große Reihe von ſeinen Blutbeſtandtheilen in ihrer Zuſammenſetzung abweichender Verbindungen hervorbringt, aber den Anfangspunkt der Reihe, ſeine Blutbeſtandtheile, dieſe kann er ſich nicht bilden.

Der Thierorganismus iſt eine höhere Pflanze, deren Entwickelung mit denjenigen Materien beginnt, mit deren Erzeugung das Leben der gewöhnlichen Pflanze aufhört; ſobald dieſe Samen getragen hat, ſtirbt ſie ab, oder es hört damit eine Periode ihres Lebens auf.

In der unendlichen Reihe von Verbindungen, welche mit den Nahrungsſtoffen der Pflanzen, mit Kohlenſäure und Am-

moniak und Wasser anfängt, bis zu den zusammengesetzteſten Bestandtheilen des Gehirns im Thierkörper finden wir keine Lücke, keine Unterbrechung. Der erste Nahrungsstoff des Thieres ist das letzte Produkt der schaffenden Thätigkeit der Pflanze.

Die Substanz der Zellen und Membranen, der Nerven und des Gehirns erzeugt die Pflanze nicht.

Das Wunderbare in der schaffenden Thätigkeit der Pflanze verliert sich, wenn man erwägt, daß die Erzeugung der Blutbestandtheile nicht auffallender erscheinen kann, als wenn wir Ochsentalg und Hammelstalg (in den Kakaobohnen), oder Menschenschmalz (im Olivenöl), oder die Hauptbestandtheile der Kuhbutter (Palmbutter) auf Bäumen wachsend finden, daß wir das Pferdefett und den Fischthran in den ölreichen Samen entstehen sehen.

X.

So wenig man nun auch, wie sich aus dem Vorhergehenden ergiebt, über die Art und Weise in Ungewißheit sein kann, wie die Zunahme in der Masse der Organe eines Thieres vor sich geht, so bleibt immer noch eine überaus wichtige Frage zu lösen, die Rolle nämlich auszumitteln, welche die stickstofffreien Substanzen, Zucker, Amylon, Gummi, Pectin u. s. w. in dem thierischen Körper spielen.

Die größte aller Thierklassen kann ohne diese Materien nicht leben, ihre Nahrung muß eine gewisse Menge davon

enthalten, und wir ſehen ihrem Leben ein raſches Ziel geſetzt, wenn ſie in ihr fehlen.

Dieſe wichtige Frage erſtreckt ſich gleichfalls auf die Beſtandtheile der Nahrung des fleiſchfreſſenden Thieres in der frühſten Periode ſeines Lebens, denn auch dieſe Nahrung enthält gewiſſe Beſtandtheile, welche ſein Körper zu ſeiner Erhaltung im erwachſenen Zuſtande nicht bedarf.

In dem jugendlichen Körper der Fleiſchfreſſer geſchieht offenbar die Ernährung in einer ähnlichen Weiſe, wie in dem Körper der pflanzenfreſſenden Thiere; ſeine Entwickelung iſt an die Aufnahme einer Flüſſigkeit gebunden, welche der Leib der Mutter in der Form der Milch abſondert.

Die Milch enthält nur einen ſtickhoffhaltigen Beſtandtheil, den ſogenannten Käſeſtoff, Caſein; außer dieſem ſind ihre Hauptbeſtandtheile Butter (Fett) und Milchzucker.

Aus dem ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheil der Milch muß das Blut des jungen Thieres, ſeine Muskelfaſer, Zellen und Nervenſubſtanz und ſeine Knochen, erzeugt worden ſein, denn Butter und Milchzucker enthalten keinen Stickſtoff.

Die Unterſuchung des Caſeins hat nun zu dem Reſultate geführt, was nach dem Vorhergehenden kaum mehr überraſchen kann, daß auch dieſer Stoff identiſch iſt in ſeiner Zuſammenſetzung mit den Hauptbeſtandtheilen des Blutes, mit Fibrin und Albumin, ja was noch mehr iſt, die Vergleichung ſeiner Eigenſchaften mit denen des Pflanzencaſeins hat gezeigt, daß er mit dieſem auch identiſch iſt in allen ſeinen Eigenſchaften, in der Art alſo, daß gewiſſe Pflanzen

wie die Erbsen, Bohnen, Linsen, den nämlichen Körper zu erzeugen vermögen, welcher aus dem Blute der Mutter entsteht und zur Blutbildung in dem Körper des jungen Thieres verwendet wird [9]).

In dem Caſein, das ſich durch ſeine außerordentliche Löslichkeit und Nichtgerinnbarkeit in der Wärme von dem Fibrin und Albumin unterſcheidet, empfängt demnach das junge Thier, ſeinem Hauptbeſtandtheil nach, das Blut ſeiner Mutter; zu ſeinem Uebergang in Blut gehört kein dritter Stoff, und keiner der Beſtandtheile des Blutes ſeiner Mutter trennt ſich davon bei ihrem Uebergang in Caſein. In chemiſcher Verbindung enthält das Caſein der Milch eine weit größere Quantität von Knochenerde, als wie das Blut, und zwar in höchſt löslichem Zuſtande, überführbar alſo in alle Körpertheile. Auch in der frühſten Periode ihres Lebens iſt die Entwickelung und Ausbildung der Träger der Lebensthätigkeit im jungen Thiere an die Aufnahme einer Materie gebunden, welche in Beziehung auf ſeine organiſchen Beſtandtheile identiſch iſt in ihrer Zuſammenſetzung mit den Hauptbeſtandtheilen ſeines Blutes.

Wozu dient nun aber das Fett der Butter, der Milchzucker? Was iſt der Grund, warum ſie zu dem Leben der jungen Thiere unentbehrlich ſind?

Butter und Milchzucker enthalten keine fixen Baſen, keinen Kalk, kein Natron, kein Kali; der Milchzucker beſitzt eine den gewöhnlichen Zuckerarten, dem Amylon, dem Gummi ähnliche Zuſammenſetzung, ſie beſtehen aus Koh-

lenſtoff und den Elementen des Waſſers, und zwar genau in dem nämlichen Verhältniſſe, wie im Waſſer.

Durch dieſe ſtickſtofffreien Stoffe iſt alſo ihren ſtickſtoffhaltigen eine gewiſſe Menge von Kohlenſtoff, oder, wie in der Butter, von Kohlenſtoff und Waſſerſtoff zugeſetzt, ein Ueberſchuß von Elementen alſo, der zur Blutbildung ſchlechterdings nicht verwendet werden kann, eben weil ihre ſtickſtoffhaltigen Nahrungsmittel genau die Kohlenſtoffmengen ſchon enthalten, welche zur Bildung von Fibrin und Albumin nöthig ſind.

Man kann, wie aus den folgenden Betrachtungen ſich ergeben wird, kaum einen Zweifel hegen, daß dieſer Ueberſchuß an Kohlenſtoff allein, oder an Kohlen- und Waſſerſtoff zur Hervorbringung der animaliſchen Wärme, daß er zum Widerſtand gegen die äußere Einwirkung des Sauerſtoffs verwendet wird.

XI.

Betrachten wir zuförderſt, um zu einer klareren Einſicht in das Weſen des Ernährungsproceſſes in den beiden Thierklaſſen zu gelangen, die Veränderungen, welche die Nahrung des fleiſchfreſſenden Thieres in ſeinem Organismus erfährt.

Wir geben einer erwachſenen Schlange eine Ziege, ein Kaninchen oder einen Vogel zu verzehren und finden, daß die Haare, Klauen, Federn, Knochen dieſer Thiere ſcheinbar unverändert ausgeworfen werden, denn ſie haben ihre Form und natürliche Beſchaffenheit behalten, ſie ſind zerbrechlich,

weil sie von allen nur den der Auflösung fähigen Bestandtheil (Leimsubstanz) verloren haben. Eigentliche Faeces gehen von der Schlange so wenig, wie von den fleischfressenden Vögeln ab.

Das Fleisch, das Fett, das Blut, die Gehirn- und Nervensubstanz des verzehrten Thieres, alles übrige ist, wenn die Schlange ihr ursprüngliches Gewicht wieder erhalten hat, verschwunden.

Als das einzige Excrement finden wir eine Materie, welche durch die Harnwege ausgeleert wird; im trocknen Zustande ist sie blendend weiß wie Kreide, sie ist sehr reich an Stickstoff, und enthält nur kohlensauren und phosphorsauren Kalk beigemischt.

Dieses Excrement ist harnsaures Ammoniak, eine chemische Verbindung, in welcher sich der Stickstoff zum Kohlenstoff in dem nämlichen Verhältniß befindet, wie im sauren kohlensauren Ammoniak, sie enthält auf 1 Aeq. Stickstoff 2 Aeq. Kohlenstoff.

Die Muskelfaser, das Blut, die Membranen und Häute enthielten aber auf die nämliche Quantität Stickstoff viermal so viel Kohlenstoff, nämlich 8 Aequivalente, und wenn man hierzu den Kohlenstoff des genossenen Fettes, der Nerven- und Gehirnsubstanz hinzurechnet, so ist klar, daß die Schlange auf 1 Aeq. Stickstoff weit mehr als 8 Aeq. Kohlenstoff verzehrt hat.

Wenn wir nun annehmen, daß das harnsaure Ammoniak allen Stickstoff des verzehrten Thieres enthält, so sind offen-

bar im geringſten Falle 6 Aeq. Kohlenſtoff, die mit dieſem Stickſtoff verbunden waren, in einer andern Form ausgetreten, wie die übrigen zwei Atome, die wir im harnſauren Ammoniak wiederfinden.

Wir wiſſen nun mit zweifelloſer Gewißheit, daß dieſer Kohlenſtoff aus Haut und Lunge ausgetreten iſt, und zwar konnte dies nur geſchehen in der Form einer Sauerſtoffverbindung.

Die Excremente eines Buſſards, der mit Rindfleiſch gefüttert worden, aus der Kloake genommen, beſtanden der Unterſuchung nach (L. Gmelin u. Tiedemann) aus harnſaurem Ammoniak. Ebenſo ſind die Faeces bei Löwen und Tiegern ſparſam und trocken, ſie enthalten der Hauptſache nach Knochenerde und nur Spuren von kohlenſtoffhaltigen Materien, aber ihr Harn enthält kein harnſaures Ammoniak, ſondern Harnſtoff, eine Verbindung, welche Stickſtoff und Kohlenſtoff im Verhältniß wie im neutralen kohlenſauren Ammoniak enthält.

Angenommen, daß ihre Nahrung (Fleiſch ꝛc.) Stickſtoff und Kohlenſtoff in dem Verhältniß wie 1 : 8 enthielt, ſo finden wir in dem Harn beide nur in dem Verhältniß wie 1 : 1 wieder, ein kleineres Verhältniß von Kohlenſtoff alſo, wie bei den Schlangen, in denen der Reſpirationsakt bei weitem weniger thätig iſt.

Aller Kohlenſtoff und Waſſerſtoff, den die Nahrung dieſer Thiere mehr enthielt, als wir in ihren Excrementen wieder finden, ſie ſind, als Kohlenſäure und Waſſer, durch den Reſpirationsproceß verſchwunden.

Hätten wir das verzehrte Thier in einem Ofen verbrannt, so würde die vorgegangene Veränderung nur der Form der Stickstoffverbindungen nach eine andere gewesen sein.

Den Stickstoff würden wir als kohlensaures Ammoniak, den übrigen Kohlenstoff als Kohlensäure, den übrigen Wasserstoff als Wasser wiederbekommen haben. Es würden die unverbrennlichen Theile als Asche, die unverbrannten als Ruß übrig geblieben sein. Die festen Excremente sind aber nichts anders als die im Thierkörper unverbrennlichen, oder unvollkommen verbrannten Theile der Nahrung.

In dem Vorhergehenden ist angenommen worden, daß die Bestandtheile der von dem Thiere genossenen Nahrungsmittel in seinem Organismus, in Folge des durch Lunge und Haut aufgenommenen Sauerstoffs, ihr Kohlenstoff in Kohlensäure, ihr Wasserstoff und ihr Stickstoff in eine chemische Verbindung, welche die Elemente des kohlensauren Ammoniaks enthält, übergehen.

Diese Voraussetzung ist nur der äußeren Erscheinung nach wahr, in der That erlangt nach einer gewissen Zeit der Thierkörper sein ursprüngliches Gewicht wieder, sein Gehalt an Kohlenstoff und den andern Elementen hat in seinem Körper nicht zugenommen, es ist genau so viel Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff ꝛc. wieder ausgetreten, als ihm davon in der Speise zugeführt wurde. Aber nichts kann gewisser sein, als daß der ausgetretene Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff nicht von der Speise herrührt, wenn sie auch, der Quantität nach, den dadurch zugeführten gleich waren.

Es wäre aller Vernunft entgegen, wenn man annehmen wollte, die Stillung des Hungers, das Bedürfniß nach Speiſe habe keinen andern Zweck, als die Erzeugung von Harnſtoff, Harnſäure, Kohlenſäure und den andern Excrementen, von Materien, die der Körper ausſtößt, in ſeiner Haushaltung alſo zu nichts verwendet.

Die Speiſen dienen in dem erwachſenen Thiere zum Erſatz an verbrauchtem Stoff, gewiſſe Theile der Organe haben ihren Zuſtand des Lebens verloren, ſie ſind aus der Subſtanz der Organe ausgetreten, ſie haben ſich zu neuen und zwar formloſen Verbindungen umgeſetzt.

Die Speiſe des Fleiſchfreſſers wurde zur Blutbildung verwendet und aus dem neuerzeugten Blute haben ſich die umgeſetzten Organe wieder neu gebildet. Der Kohlenſtoff und Stickſtoff der Nahrung ſind zu Beſtandtheilen des Organismus geworden.

Eben ſo viel Kohlenſtoff und Stickſtoff als die Organe abgegeben haben, genau ſo viel iſt ihnen durch das Blut und in letzter Form durch die Speiſe wieder erſetzt worden.

Wo ſind denn aber, kann man fragen, die neuen Verbindungen hingekommen, welche durch die Umſetzung der Beſtandtheile der Organe, der Muskelfaſer, der Subſtanz der Membranen und Zellen, der Nerven- und Gehirnſubſtanz, entſtanden ſind?

Dieſe neuen Verbindungen, ſie konnten keinen Moment, inſofern ſie löslich waren, an dem Platze beharren, wo ſie entſtanden ſind, denn eine ſehr wohlbekannte Thätigkeit, die

Blutcirculation nämlich, widersetzt sich diesem Beharren.

Durch die Erweiterung des Herzens, in dem sich zwei Systeme von Kanälen vereinigen, welche sich in ein unendlich feines Netzwerk von Röhrchen durch alle Theile des Thierkörpers hin verzweigen, entsteht abwechselnd ein luftleerer Raum, in dessen unmittelbarer Folge, durch den äußern atmosphärischen Druck, alle Flüssigkeiten, die in dieses Röhrensystem gelangen können, nach der einen Seite des Herzens hin mit großer Gewalt getrieben werden. Diese Bewegung wird bei der Zusammenziehung des Herzens durch einen von dem Gewichte der Atmosphäre unabhängigen Druck aufs kräftigste unterstützt.

Wir haben mit einem Worte in dem Herzen eine Druckpumpe, durch welche arterielles Blut in alle Theile des Körpers getrieben wird, und eine Saugpumpe, durch welche alle Flüssigkeiten, von welcher Beschaffenheit sie auch sein mögen, sobald sie in das Röhrensystem der Saugadern, die sich mit den Venen vereinigen, gelangen können, nach dem Herzen hin geführt werden. Diese Aufsaugung, in Folge des im Herzen entstandenen luftleeren Raums, ist ein rein mechanischer Act, der sich, wie bemerkt, auf flüssige Stoffe jeder Art, Salzauflösungen, Gifte ꝛc. erstreckt. Es ist nun einleuchtend, daß durch das Einströmen des arteriellen Blutes in die Capillargefäße alle dort vorhandenen Flüssigkeiten, sagen wir die löslichen Verbindungen, die durch die Umsetzung der Gebilde entstanden sind, eine Bewegung nach dem Herzen hin empfangen müssen.

Diese Materien können zur Neubildung der nämlichen

Organe, aus denen ſie entſtanden ſind, nicht verwendet werden; ſie gelangen durch das Saug- und Lymphgefäßſyſtem in die Venen, wo ihre Anhäufung dem Ernährungsproceß eine ſehr raſche Grenze ſetzen würde, wenn ſich dieſer Anſammlung nicht zwei, ganz beſonders zu dieſem Zwecke eingerichtete, Filtrirapparate widerſetzen würden.

Das venöſe Blut nimmt, ehe es zum Herzen gelangt, ſeinen Weg durch die Leber, das arterielle Blut geht durch die Nieren, welche alle für den Ernährungsproceß untauglichen Stoffe davon ſcheiden.

Die neuentſtandenen Verbindungen, welche den Stickſtoff der umgeſetzten Organe enthalten, ſammeln ſich in der Harnblaſe an und treten, indem ſie einer weiteren Verwendung durchaus unfähig ſind, aus dem Körper aus.

Alle anderen, welche den Kohlenſtoff der umgeſetzten Gebilde enthalten, ſammeln ſich in Geſtalt einer löslichen, mit Waſſer in allen Verhältniſſen miſchbaren Natronverbindung in der Gallenblaſe an, aus der ſie ſich im Duodenum mit dem Speiſebrei wieder miſchen. Alle Theile der Galle, die ihre Löslichkeit in dem Verdauungsproceß nicht verlieren, kehren während der Verdauung friſch genoſſener Nahrung im unendlich fein zertheilten Zuſtande wieder in den Körper zurück. Das Natron der Galle, ſo wie alle durch ſchwache Säure nicht fällbaren, kohlenſtoffreichen Beſtandtheile (dieſe betragen $^{99}/_{100}$ aller übrigen), behalten ihre Fähigkeit, durch die Saugadern des Dünndarms und Dickdarms wieder reſorbirt zu werden, unverändert bei. Ja dieſe Fähigkeit iſt direct be-

weisbar durch gallehaltige Klystiere, deren Gallegehalt mit der Flüssigkeit im Mastdarm verschwindet.

Die stickstoffhaltigen Verbindungen, welche in Folge der Umsetzung der Gebilde entstanden, wir wissen genau, daß sie, durch die Nieren von dem ~~venösen~~ Blute geschieden, als einer weiteren Veränderung durchaus unfähig, aus dem Körper treten, aber die kohlenstoffreichen Produkte, sie kehren in den Körper des fleischfressenden Thieres zurück.

Die Nahrung des fleischfressenden Thieres ist identisch mit den Hauptbestandtheilen seines Körpers; die Metamorphosen, welche seine Gebilde erfahren, sie müssen identisch sein mit den Veränderungen, welche in ihren Lebensakten ihre Nahrungsmittel erleiden.

Das verzehrte Fleisch und Blut giebt seinen Kohlenstoff zur Unterhaltung des Respirationsprocesses her, seinen Stickstoff erhalten wir als Harnstoff oder Harnsäure wieder. Ehe aber diese letzte Veränderung erfolgt, wird das todte Fleisch und Blut zu lebendigem Fleisch und Blut, und es ist im eigentlichen Sinne der Kohlenstoff der durch Umsetzung der lebenden Gebilde entstandenen Verbindungen, welcher zur Hervorbringung der thierischen Wärme dient.

Die Speise des Fleischfressers verwandelt sich in Blut, das Blut ist bestimmt zur Reproduktion der Organe, durch die Blutcirculation wird ein Strom von Sauerstoff allen Theilen des Körpers zugeführt. Die Träger dieses Sauerstoffs, die Blutkörperchen, welche nachweisbar keinen Antheil an dem Nutritionsprocesse nehmen, geben ihn beim Durch-

gang durch die Capillargefäße wieder ab. Dieſer Sauerſtoffſtrom begegnet auf dieſem Wege den durch die Umſetzung der Gebilde entſtandenen Verbindungen, er verbindet ſich mit ihrem Kohlenſtoff zu Kohlenſäure, mit ihrem Waſſerſtoff zu Waſſer, und alles, was dieſen Oxydationsproceß nicht erlitten hat, kehrt in der Form von Galle wieder in den Körper zurück, wo ſie nach und nach völlig verſchwindet.

Bei den Fleiſchfreſſern enthält die Galle den Kohlenſtoff der umgeſetzten Gebilde, dieſer Kohlenſtoff verſchwindet in dem thieriſchen Körper, die Galle verſchwindet in dem Lebensproceß, ihr Kohlenſtoff tritt als Kohlenſäure, ihr Waſſerſtoff als Waſſer durch Haut und Lunge aus; es iſt klar, die Beſtandtheile der Galle dienen zur Reſpiration und zur Hervorbringung der animaliſchen Wärme. Alle Theile der Nahrung der Fleiſchfreſſer ſind fähig in Blut überzugehen, ihre Excremente enthalten nur anorganiſche Subſtanz (Knochenerde ꝛc.), und was wir an organiſchen Stoffen dieſen beigemiſcht finden, ſind lediglich Excretionen, welche den Durchgang durch die Eingeweide vermitteln. Bei den fleiſchfreſſenden Thieren enthalten die Excremente keine Galle, kein Natron; keine Spur einer der Galle ähnlichen Subſtanz wird von Waſſer daraus aufgenommen, die Galle iſt aber in allen Verhältniſſen darin löslich und damit miſchbar.

Ueber den Urſprung der Beſtandtheile des Harns und der Galle können die Phyſiologen nicht im Zweifel ſein; wenn der Magen bei Enthaltung aller Speiſe ſich darmartig zuſammenzieht, kann ſich aus der Gallenblaſe, da ſie keine Be-

wegung empfängt, keine Galle ergießen; in dem Körper der Verhungerten finden wir die Gallenblase straff und voll. Wir beobachten Galle- und Harnsekretion bei den Winterschläfern, wir wissen, daß der Harn der Thiere (Hunde), die während 18 bis 20 Tagen keine andere Nahrung als reinen Zucker bekamen, ebensoviel an dem stickstoffreichsten Produkt des Thierkörpers, ebensoviel Harnstoff enthielt, als im gesunden Zustande (Marchand, Erdm. J. XIV. p. 495.). Unterschiede in der Menge des secernirten Harnstoffs erklären sich in diesen und ähnlichen Versuchen durch den Mangel oder die Gestattung der natürlichen Bewegungen. Eine jede Bewegung steigert den Umsatz der Gebilde, nach einem jeden Spaziergang vermehrt sich beim Menschen die Harnsekretion.

Der Harn der Säugethiere, Vögel, der Amphibien enthält Harnsäure oder Harnstoff, der Koth der Weichthiere, der Insecten, der Cantharіden, des Seidenwurm-Schmetterlings enthält harnsaures Ammoniak; die Beständigkeit des Vorkommens einer oder zweier Stickstoff-Verbindungen in den Ausleerungen der Thiere, bei einer so großen Verschiedenheit in der genossenen Nahrung, zeigt mit Bestimmtheit an, daß sie aus einer und derselben Quelle entspringen.

Ebensowenig zweifelhaft kann man über die Rolle sein, welche die Galle in dem Lebensproceß übernimmt. Wenn man sich erinnert, daß essigsaures Kali, in der Form eines Klystiers oder als Fußbad genommen, den Harn im hohen Grade alkalisch macht (Rehberger in Tiedemann's Zeitschrift für Physiologie II. 149.), daß die Umwandlung, welche

hier die Eſſigſäure erfährt, nicht ohne ein Hinzutreten von Sauerſtoff gedacht werden kann, ſo iſt klar, daß die löslichen Beſtandtheile der Galle, veränderlich im hohen Grade, ſo wie wir ſie kennen, welche durch die Eingeweide in den Organismus wieder zurückkehren, da ſie zur Blutbildung nicht verwendet werden können, der Einwirkung des Sauerſtoffs in einer ganz ähnlichen Weiſe unterliegen müſſen. Die Galle iſt eine Natronverbindung, deren Beſtandtheile in dem Körper des fleiſchfreſſenden Thieres bis auf das Natron verſchwinden.

Nach der Anſicht vieler der ausgezeichnetſten Phyſiologen iſt die Galle zur Ausleerung beſtimmt, und nichts kann gewiſſer ſein, als daß eine an Stickſtoff ſo arme Materie in dem Nutritionsproceß keine Rolle übernimmt, allein die quantitative Phyſiologie muß die Anſicht, daß ſie zu keinerlei Zwecken dient, daß ſie unfähig zu weiteren Veränderungen iſt, mit Entſchiedenheit zurückweiſen.

Kein Beſtandtheil eines Organs enthält Natron, nur in dem Blute (Serum), in dem Gehirnfett und in der Galle haben wir Natronverbindungen. Wenn die Natronverbindungen des Bluts in Muskelfaſer, in Membranen und Zellen übergehen, ſo muß ihr Natron in eine neue, in eine andere Verbindung treten; das in Muskelfaſer, in Membranen übergehende Blut giebt ſein Natron an Verbindungen ab, welche durch die Umſetzung der Gebilde entſtanden ſind. Eine dieſer neuen Natronverbindungen erhalten wir in der Galle wieder.

Wäre die Galle zur Ausleerung beſtimmt, ſo müßten

wir sie verändert oder unverändert, wir müßten das Natron in den festen Excrementen wiederfinden. Aber bis auf gewisse Mengen von Kochsalz und schwefelsauren Salzen, welche Bestandtheile aller thierischen Flüssigkeiten sind, finden wir in den festen Excrementen nur Spuren von Natronverbindungen. Das Natron der Galle ist aber jedenfalls aus den Eingeweiden in den Organismus wieder zurückgekehrt, und das nämliche muß von den organischen Stoffen gelten, die mit diesem Natron verbunden bleiben.

Ein Mensch secernirt nach den Beobachtungen der Physiologen 17—24 Unzen Galle, ein großer Hund 36 Unzen, ein Pferd 37 Pfd. Galle (Burdach's Physiologie 5r Band S. 260.) Die festen Excremente eines Menschen wiegen aber durchschnittlich nicht über 5½ Unzen, die eines Pferdes 28½ Pfd. Bousssingault (7½ Pfd. trockne Substanz und 21 Pfd. Wasser). Die letzteren geben mit Alkohol behandelt nur 1/76 ihres Gewichts lösliche Theile ab. Dieser sechsundsiebzigste Theil von dem Gewicht der festen Excremente des Pferdes müßte Galle sein.

Den Wassergehalt der Galle zu 90 pCt. angenommen, secernirt ein Pferd täglich 592 Unzen Galle, welche 59,2 Unzen feste Substanz enthalten, während aus 120 Unzen trockner Excremente (7½ Pfd.) nur 6 Unzen einer Substanz ausziehbar sind, die man für Galle nehmen könnte. Aber das, was der Alkohol aus den Excrementen auflöst, ist keine Galle mehr, von dem Weingeist befreit bleibt ein weicher, ölartiger Rückstand, welcher seine Löslichkeit im Wasser gänz-

lich eingebüßt hat, er hinterläßt nach dem Verbrennen keine alkaliſche Aſche, kein Natron [10]).

Während dem Verdauungsproceß iſt alſo das Natron der Galle und mit ihm alle Beſtandtheile derſelben, die ihre Löslichkeit nicht verloren haben, in den Organismus zurückgekehrt; wir finden dieſes Natron in dem neugebildeten Blute wieder, wir finden es zuletzt in der Form von phosphorſaurem, kohlenſaurem und hippurſaurem Natron im Urin. In 1000 Theilen feſter, friſcher Menſchenexcremente fand Berzelius nur 9 Theile einer der Galle ähnlichen Subſtanz, fünf Unzen würden hiernach nur 21 Gran feſter Galle enthalten, entſprechend mit ihrem Waſſergehalte 200 Gr. Galle im natürlichen Zuſtande; es werden aber beim Menſchen 9640 bis 11520 Gran Galle täglich ſecernirt, alſo 45- bis 56mal mehr als man in den durch den Darmkanal ausgeleerten Stoffen nachzuweiſen vermag.

Welche Vorſtellung man nun auch hegen mag über die Richtigkeit der phyſiologiſchen Verſuche in Beziehung auf die Menge der in verſchiedenen Thierklaſſen ſecernirten Galle, ſo viel iſt vollkommen gewiß, daß auch das Maximum derſelben noch nicht den Kohlenſtoff enthält, den ein Menſch oder ein Pferd in 24 Stunden ausathmet. Mit allen ihren Gemeng- oder Beſtandtheilen an Fett ꝛc. enthalten 100 Theile feſter Galle nicht über 69 pCt. Kohlenſtoff; in 37 Pfd. Galle, die ein Pferd ſecernirt, ſind demnach nur 80 Loth Kohlenſtoff enthalten. Das Pferd athmet aber täglich nahe doppelt ſoviel Kohlenſtoff in der Form von Kohlenſäure aus. Ein

ganz ähnliches Verhältniß findet bei dem Menschen statt.

Mit dem zur Neubildung und Reproduction bestimmten Stoff wird durch die Blutcirculation allen Theilen des Körpers Sauerstoff zugeführt. Welche Verbindung dieser Sauerstoff in dem Blut auch eingegangen sein mag, es muß als gewiß angenommen werden, daß diejenigen Bestandtheile, welche zur Reproduktion verwendet werden, keine wesentliche Veränderung durch ihn erlitten haben, in der Muskelfaser finden wir das Fibrin mit allen seinen Eigenschaften, die es im venösen Blute besitzt, wieder vor, das Albumin im Blut nimmt kein Sauerstoffgas auf; der im Blute aufgenommene Sauerstoff mag dazu gedient haben, um gewisse unbekannte Bestandtheile des Blutes in Gaszustand zu versetzen, aber die zur Ernährung und Reproduktion dienenden bekannten Hauptbestandtheile desselben, sie können von der Natur nicht dazu bestimmt sein, um den Respirationsproceß zu unterhalten, keine ihre Eigenschaften rechtfertigt eine solche Vorstellung.

Ohne die Frage über den Antheil, den die Galle an den Lebensprocessen nimmt, hier einer erschöpfenden Erörterung zu unterwerfen, geht, wie bemerkt, aus der einfachen Vergleichung der assimilirbaren Bestandtheile der Nahrung eines fleischfressenden Thieres mit den letzten Producten, in die sie verwandelt wird, hervor, daß aller Kohlenstoff derselben, der sich nicht im Harne befindet, in der Form von Kohlensäure ausgetreten ist.

Dieser Kohlenstoff stammte aber von der Substanz der

umgeſetzten Gebilde und, dieſes feſtgeſetzt, löſ't ſich die Frage über die Nothwendigkeit des Vorhandenſeins von kohlenſtoffreichen und ſtickſtoffloſen Materien in der Nahrung der jugendlichen Carnivoren und der pflanzenfreſſenden Thiere auf eine höchſt einfache Weiſe.

XII.

Es iſt eine unbeſtreitbare Thatſache, daß in einem erwachſenen fleiſchfreſſenden Thiere, was an Gewicht von Tag zu Tag weder merklich zunimmt, noch abnimmt, Nahrung, Umſetzung der Gebilde und Sauerſtoffverbrauch in einem ganz beſtimmten Verhältniß zu einander ſtehen.

Der Kohlenſtoff der entwichenen Kohlenſäure, der des Harns, der Stickſtoff des Harns und der Waſſerſtoff, welcher als Ammoniak und Waſſer austritt, dieſe Elemente zuſammengenommen müſſen dem Gewicht nach vollkommen gleich ſein dem Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Stickſtoff der umgeſetzten Gebilde, und, inſofern dieſe durch die Nahrung genau erſetzt worden ſind, dem Kohlenſtoff, Stickſtoff und Waſſerſtoff der Nahrung. Wäre dies nicht der Fall, ſo würde das Gewicht des Thieres ſich nicht gleich bleiben können.

Das Gewicht des ſich entwickelnden jungen fleiſchfreſſenden Thieres bleibt ſich aber nicht gleich, es nimmt im Gegentheile von Tag zu Tag um eine beſtimmbare Größe zu.

Dieſe Thatſache ſetzt voraus, daß der Aſſimilationsproceß in dem jugendlichen Thiere ſtärker, intenſiver iſt, als der

Proceß der Umsetzung der vorhandenen Gebilde. Wären beide Thätigkeiten gleich, so könnte ihr Gewicht nicht zunehmen, wäre der Verbrauch größer, so müßte sich ihr Gewicht vermindern.

Der Blutumlauf ist in dem jungen Thiere aber nicht schwächer, er ist im Gegentheil beschleunigter, die Athembewegungen sind rascher, und bei gleichem Körper-Volum muß der Sauerstoffverbrauch eher größer als kleiner sein, wie bei erwachsenen Thieren. Aber da die Umsetzung der Gebilde langsamer vor sich geht, so würde es an denjenigen Materien fehlen, deren Kohlenstoff und Wasserstoff sich zur Verbindung mit dem Sauerstoff eignet, denn es sind ja bei den fleischfressenden Thieren die neuen Verbindungen, die aus der Umsetzung der Organe entstanden, welche die Natur zum Widerstande gegen den einwirkenden Sauerstoff und zur Hervorbringung der animalischen Wärme bestimmt hat. Was also an diesem Widerstande fehlt, setzt eine bewunderungswürdige Weisheit dem jungen Thiere in seiner Nahrung zu.

Der Kohlenstoff und Wasserstoff der Butter, der Kohlenstoff des Milchzuckers, aus welchen kein Bestandtheil zu Blut, zu Fibrin und Albumin werden kann, sie sind zur Unterhaltung des Respirationsprocesses in einem Lebensalter bestimmt, wo ein stärkerer Widerstand sich der Metamorphose der vorhandenen Gebilde entgegensetzt, der Erzeugung von Stoffen also, welche im erwachsenen Zustande in völlig zur Respiration ausreichender Menge produzirt werden.

Das junge Thier empfängt seine Blutbestandtheile in dem

Caſein der Milch, eine Umſetzung der vorhandenen Gebilde geht vor ſich, denn Gallen- und Harnſekretion finden ſtatt, die Subſtanz der umgeſetzten Gebilde tritt in der Form von Harn und von Kohlenſäure und Waſſer aus ihrem Körper, allein die Butter und der Milchzucker der Milch ſind ebenfalls verſchwunden, ſie laſſen ſich in den Faeces nicht nachweiſen.

Butter und Milchzucker ſind in der Form von Waſſer und Kohlenſäure ausgetreten und ihre Verwandlung, in Sauerſtoffverbindungen beweiſt aufs klarſte, daß weit mehr Sauerſtoff aufgenommen wurde, als nöthig war, um mit dem Kohlenſtoff und Waſſerſtoff der umgeſetzten Gebilde Kohlenſäure und Waſſer zu bilden.

Die in dem Lebensproceß des jungen Thieres vor ſich gehende Veränderung und Umſetzung der Gebilde liefert demgemäß, in einer gegebenen Zeit, weit weniger Kohlenſtoff und Waſſerſtoff in der zur Reſpiration geeigneten Form, als dem aufgenommenen Sauerſtoff entſpricht, die Subſtanz ihrer Organe würde einen raſcheren Stoffwechſel erfahren, ſie würde der Einwirkung des Sauerſtoffs unterliegen müſſen, wenn der fehlende Kohlenſtoff und Waſſerſtoff von einer andern Quelle nicht geliefert werden würde.

Die fortſchreitende Zunahme an Maſſe, die freie und ungehinderte Entwickelung der Organe des jungen Thieres, ſie wird alſo durch die Gegenwart fremder Materien bedingt, die in dem Ernährungsproceß keine andere Rolle ſpielen, als daß ſie die neu ſich bildenden Organe vor der Einwirkung des Sauerſtoffs ſchützen, ihre Beſtandtheile ſind es, die ſich mit dem Sauerſtoff

verbinden; ohne zu unterliegen, würden die Organe ſelbſt dieſen Widerſtand nicht übernehmen können, d. h. eine Zunahme an Maſſe, bei gleichem Sauerſtoffverbrauch, würde ſchlechterdings unmöglich ſeyn.

Ueber den Zweck, zu welchem die Natur der Nahrung der jungen Säugthiere ſtickſtofffreie Materien zugeſetzt hat, die ihr Organismus zur eigentlichen Ernährung, zu Blutbildung nicht verwenden kann, Materien, die zur Unterhaltung ihrer Lebensfunktionen in erwachſenem Zuſtande völlig entbehrlich ſind, kann man nach dem Vorhergehenden nicht zweifelhaft ſeyn. Bei den fleiſchfreſſenden Vögeln iſt der Mangel aller Bewegung offenbar ein Grund eines verminderten Stoffwechſels.

Der Ernährungsproceß der fleiſchfreſſenden Thiere ſtellt ſich mithin in zwei Formen dar, von denen wir die eine Form in den gras- und körnerfreſſenden Thieren wiederkehren ſehen.

XIII.

Bei dieſer Thierklaſſe beobachten wir, daß während ihrer ganzen Lebensdauer ihre Exiſtenz an die Aufnahme von Stoffen geknüpft iſt, welche eine dem Milchzucker gleiche oder ähnliche Zuſammenſetzung beſitzen. Allem was ſie genießen, iſt jederzeit eine gewiſſe Quantität von Amylon (Stärke), oder Gummi, oder Zucker beigemiſcht.

Die am meiſten verbreitete Subſtanz dieſer Klaſſe iſt das Amylon; es findet ſich in Wurzeln, Samen, in den Stengeln, in dem Holzkörper, abgelagert in der Form von rundlichen oder

ovalen Körnchen, welche nur in der Größe, aber keineswegs in der chemiſchen Zuſammenſetzung [11]) von einander abweichen. Wir finden in einer und derſelben Pflanze, in den Erbſen z. B., Stärkemehl von ungleicher Größe, in dem ausgepreßten Saft von Erbſenſtengeln haben die ſich abſetzenden Stärkekörnchen einen Durchmeſſer von $^1/_{200}$ bis $^1/_{150}$ Millimeter, während die Stärkekörnchen der Samenlappen drei- bis viermal größer ſind. Vor allen andern ſind die Stärkekörnchen der Pfeilwurzel und der Kartoffel ausgezeichnet durch ihre Größe, die des Reiſes und des Weitzens durch ihre Kleinheit.

Es iſt wohlbekannt, daß durch ſehr verſchiedene Einwirkungen das Stärkemehl übergeführt werden kann in Zucker; dies geſchieht in dem Keimungsproceß (in dem Malzproceß), und namentlich durch die Einwirkung von Säuren. Die Ueberführung des Stärkemehls in Zucker wird, wie ſich durch die Analyſe darthun läßt, durch eine einfache Aufnahme der Beſtandtheile des Waſſers bewirkt [12]).

Allen Kohlenſtoff der Stärke, wir bekommen ihn in dem Zucker wieder, es iſt keiner ihrer Beſtandtheile ausgetreten, und außer den Elementen des Waſſers iſt kein fremdes Element hinzugetreten.

In ſehr vielen, namentlich fleiſchigen Früchten, die im unreifen Zuſtande ſauer und herbe, im reifen hingegen ſüß ſind, wie in den Aepfeln und Birnen, entſteht der Zucker aus dem Amylon, was dieſe Früchte enthalten.

Wenn man unreife Aepfel oder Birnen auf einem Reibeiſen in einen Brei verwandelt und dieſen auf einem feinen Sieb mit

Wasser auswäscht, so setzt sich aus der trüben ablaufenden Flüssigkeit ein höchst feines Stärkmehl ab, von dem man in den sogenannten reifen Früchten keine Spur mehr wahrnimmt. Manche von diesen Obstsorten werden auf dem Baume süß (Sommer-Birnen, -Aepfel), andere hingegen erst einige Zeit nachher, wenn sie, vom Baume genommen, aufbewahrt werden. Dieses sogenannte Nachreifen, wie man dieses Süßwerden nennt, ist ein rein chemischer Proceß, der mit dem Pflanzenleben nichts zu thun hat. Mit dem Aufhören der Vegetation ist die Frucht zur Fortpflanzung geeignet, d. h. der Kern ist völlig reif, allein die fleischige Hülle unterliegt von diesem Zeitpunkte an der Einwirkung der Atmosphäre, sie nimmt wie alle verwesenden Substanzen Sauerstoff auf, und es trennt sich von ihrer Substanz eine gewisse Menge kohlensaures Gas.

Aehnlich nun wie die Stärke in faulendem Kleister oder durch verwesenden Kleber in Zucker übergeführt wird, verwandelt sich das Amylon der genannten verwesenden Früchte in Traubenzucker, sie werden in dem Verhältniß süßer, als sie mehr Stärke enthielten.

Zwischen Amylon und Zucker findet nach dem Vorerwähnten ein ganz bestimmter Zusammenhang statt; durch eine Menge chemischer Actionen, welche auf die Elemente des Amylons keine andere Wirkung äußern, als daß sie die Richtung ihrer gegenseitigen Anziehung ändern, sind wir im Stande, das Amylon in Zucker und zwar in Traubenzucker überzuführen.

Der Milchzucker [13]) verhält sich in vielen Beziehungen ähnlich wie das Amylon, er ist für sich der weingeistigen Gährung nicht fähig, er erlangt aber die Eigenschaft in Alkohol und Koh-

lenſäure zu zerfallen, wenn er mit einer gährenden Materie (dem faulenden Käſe in der Milch) bei Gegenwart von Waſſer einer höheren Temperatur ausgeſetzt wird. In dieſem Fall verwandelt er ſich zuerſt in Traubenzucker; die nämliche Verwandlung erfährt der Milchzucker, wenn er mit Säuren, mit Schwefelſäure z. B., bei gewöhnlicher Temperatur in Berührung gelaſſen wird.

Das Gummi hat eine dem Rohrzucker gleiche procentiſche Zuſammenſetzung [14]), es unterſcheidet ſich von den Zuckerarten und dem Amylon, inſofern ihm die Fähigkeit abgeht, durch den Proceß der Fäulniß in Weingeiſt und Kohlenſäure zu zerfallen; gährenden Subſtanzen zugeſetzt, erleidet es keine merkliche Veränderung, woraus man mit einiger Wahrſcheinlichkeit ſchließen kann, daß ſeine Elemente in der Ordnung, in welcher ſie vereinigt ſind, mit einer ſtärkeren Kraft zuſammengehalten ſind, wie die Elemente der verſchiedenen Zuckerarten.

Einen gewiſſen Zuſammenhang zeigt das Gummi übrigens mit dem Milchzucker, beide geben nämlich bei Behandlung mit Salpeterſäure einerlei Oxydationsproducte, nämlich Schleimſäure, die ſich unter denſelben Bedingungen aus den Zuckerarten nicht darſtellen läßt.

Wenn wir, um die Aehnlichkeit in der Zuſammenſetzung dieſer verſchiedenen Materien, welche in dem Ernährungsproceß der pflanzenfreſſenden Thiere eine ſo wichtige Rolle übernehmen, noch mehr hervortreten zu machen, 1 Aequivalent Kohlenſtoff mit C (= 75,8 Kohlenſtoff) und 1 Aequivalent Waſſer mit aqua (= 112,4) bezeichnen, ſo erhalten wir für die Zuſammenſetzung der genannten Subſtanzen folgende Ausdrücke:

Amylon	= 12 C + 10 aq.
Rohrzucker	= 12 C + 10 aq. + aq.
Gummi	= 12 C + 10 aq. + aq.
Milchzucker	= 12 C + 10 aq. + 2 aq.
Traubenzucker	= 12 C + 10 aq. + 4 aq.

Auf die nämliche Anzahl von Aequivalenten Kohlenſtoff enthält alſo das Amylon 10 Aeq. Waſſer, der Rohrzucker und das Gummi 11 Aequivalente, der Milchzucker 12 und der kryſtalliſirte Traubenzucker 14 Aequivalente Waſſer, oder der Beſtandtheile des Waſſers.

XIV.

In dieſen verſchiedenen Subſtanzen, welche in der Nahrung der pflanzenfreſſenden Thiere niemals fehlen, iſt alſo den ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheilen derſelben, dem Pflanzen-Albumin, -Fibrin, -Caſein, woraus ſich ihr Blut bildet, im ſtrengſten Sinne nur eine gewiſſe Quantität Kohlenſtoff im Ueberſchuſſe zugeſetzt, der in ihrem Organismus zur Erzeugung von Fibrin und Albumin ſchlechterdings nicht verwendet werden kann, weil ihre ſtickſtoffhaltigen Nahrungsſtoffe den zur Blutbildung erforderlichen Kohlenſtoff ſchon enthalten und das Blut in dem Leibe der fleiſchfreſſenden Thiere erzeugt wird, ohne Mitwirkung dieſes Ueberſchuſſes von Kohlenſtoff.

Auf eine klare und überzeugende Weiſe ſtellt ſich der Antheil heraus, den dieſe ſtickſtofffreien Materien an dem Nutri-

tionsproceß der pflanzenfreſſenden Thiere nehmen, wenn wir die verhältnißmäßig ſo geringe Menge Kohlenſtoff in Betrachtung ziehen, die ſie in ihren ſtickſtoffhaltigen Nahrungsmitteln genießen; ſie ſteht durchaus in keinem Verhältniß zu dem durch Lunge und Haut aufgenommenen und verbrauchten Sauerſtoff.

Ein Pferd kann z. B. in vollkommen gutem Zuſtande erhalten werden, wenn ihm täglich 15 Pfd. Heu und 4½ Pfd. Hafer zur Nahrung gegeben werden. Wenn wir uns nun den ganzen Gehalt dieſer Nahrungsſtoffe an Stickſtoff, ſo wie ihn die Elementaranalyſe feſtgeſetzt hat (Heu 1,5 pCt., Hafer 2,2 pCt.) [15]) rückwärts in Blut, nämlich in Fibrin und Albumin, mit dem ganzen Waſſergehalt des Blutes (80 pCt.) verwandelt denken, ſo empfängt das Pferd täglich nur 8⁹/₁₀ Loth Stickſtoff, welche etwas über 8 Pfd. Blut entſprechen. Mit dieſem Stickſtoff hat aber das Thier, von den andern Beſtandtheilen, welche damit verbunden waren, nur 28⁹/₁₀ Loth Kohlenſtoff empfangen. Nur 15⁹/₁₀ Loth von dieſen 28⁹/₁₀ Loth Kohlenſtoff konnten zur Reſpiration verwendet worden ſein, denn mit dem Stickſtoff, der durch den Harn ausgeleert wird, treten in der Form von Harnſtoff 6 Lothe und in der Form von Hippurſäure 7 weitere Lothe wieder aus.

Ohne weitere Rechnung anzuſtellen, wird Jedermann zugeben, daß das Luftvolum, was ein Pferd ein- und ausathmet, daß die Menge des von ihm verzehrten Sauerſtoffgaſes und in deſſen Folge die Menge des ausgetretenen Kohlenſtoffs, weit größer iſt, wie beim Reſpirationsproceß des Menſchen. Nun verbraucht aber ein erwachſener Menſch täglich nahe an 28

Loth Kohlenstoff, und die Bestimmung von Bouſſingault, wonach ein Pferd täglich 158 Loth ausathmet, kann von der Wahrheit nicht sehr entfernt sein.

In den stickstoffhaltigen Bestandtheilen seiner Nahrung erhält das Pferd mithin nur etwas mehr, wie den fünften Theil des Kohlenstoffs, den sein Organismus zur Unterhaltung des Respirationsprocesses bedarf, und wir sehen, daß die Weisheit des Schöpfers allen seinen Nahrungsmitteln ohne Ausnahme die übrigen ⅘ Kohlenstoff, welche in den stickstoffhaltigen Bestandtheilen fehlen, in mannigfaltigen Formen, als Amylon, Zucker u. s. w. zugesetzt hat, welche das Thier, ohne der Einwirkung des Sauerstoffs zu unterliegen, nicht entbehren kann.

Es ist offenbar, daß in dem Organismus des pflanzenfressenden Thieres, dessen Nahrung eine verhältnißmäßig so kleine Menge seiner Blutbestandtheile enthält, der Akt der Umsetzung der vorhandenen Gebilde, daß demzufolge ihre Erneuerung, die Reproduktion derselben, bei weitem minder rasch vor sich geht, wie bei den fleischfressenden Thieren, denn wäre dies der Fall, so würde eine tausendmal reichere Vegetation zu ihrer Ernährung nicht hinreichen; Zucker, Gummi, Amylon würden keine Bedingungen zur Erhaltung ihres Lebens sein, eben weil die kohlenstoffhaltigen Produkte der Umsetzung ihrer Organe für den Respirationsproceß hinreichen würden.

Der fleischessende Mensch bedarf zu seiner Erhaltung und Ernährung eines ungeheuren Gebietes, weiter und ausgedehnter noch, wie der Löwe und Tiger, weil er, wenn die Gelegenheit sich darbietet, tödtet, ohne zu genießen.

Eine Nation von Jägern auf einem begrenzten Flächenraum iſt der Vermehrung durchaus unfähig, der zum Athmen unentbehrliche Kohlenſtoff muß von den Thieren genommen werden, von denen auf der gegebenen Fläche nur eine beſchränkte Anzahl leben kann. Dieſe Thiere ſammeln von den Pflanzen die Beſtandtheile ihrer Organe und ihres Blutes, und liefern ſie den von der Jagd lebenden Indianern, die ſie unbegleitet von den ſtickſtofffreien Subſtanzen genießen, welche während der Lebensdauer des Thieres ſeinen Reſpirationsproceß unterhielten; es iſt bei dem fleiſcheſſenden Menſchen der Kohlenſtoff des Fleiſches, welcher das Amylon, den Zucker erſetzen muß.

In fünfzehn Pfund Fleiſch iſt aber nicht mehr Kohlenſtoff enthalten, wie in 4 Pfund Amylon [16]) und während der Indianer mit einem einzigen Thier und einem ihm gleichen Gewichte Amylon eine gewiſſe Anzahl von Tagen hindurch ſein Leben und ſeine Geſundheit würde erhalten können, muß er, um den für dieſe Zeit, für ſeine Reſpiration unentbehrlichen Kohlenſtoff zu erhalten, 5 Thiere verzehren.

Man ſieht leicht, in welchem engen Verbande die Vermehrung des Menſchengeſchlechtes mit dem Ackerbau ſteht. Der Anbau der Culturpflanzen hat zuletzt keinen andern Zweck, als die Hervorbringung eines Maximums der zur Aſſimilation und Reſpiration dienenden Stoffe, auf dem möglichſt kleinſten Raume. Die Getreide- und Gemüſepflanzen liefern uns in dem Amylon, dem Zucker, Gummi, nicht nur den Kohlenſtoff, der unſere Organe vor der Einwirkung des Sauerſtoffs ſchützt, und in dem Organismus die zum Leben unentbehrliche Wärme erzeugt, ſon-

dern in dem Pflanzenfibrin, -Albumin und -Caſein noch überdies unſer Blut, aus dem ſich die übrigen Beſtandtheile des Körpers entwickeln.

Der fleiſcheſſende Menſch athmet wie das fleiſchfreſſende Thier auf Koſten der Materien, die durch die Umſetzung ſeiner Organe entſtanden ſind, und ähnlich wie der Löwe, der Tiger, die Hyäne in den Kaſten unſerer Menagerien durch unaufhörliche Bewegung den Umſatz ihrer Gebilde beſchleunigen müſſen, um den zur Reſpiration nöthigen Stoff zu erzeugen, muß ſich der Indianer, des nämlichen Zweckes wegen, den größten Anſtrengungen und mühevollſten Beſchwerden unterziehen; er muß Kraft verbrauchen, lediglich um Stoff zum Athmen zu ſchaffen.

Die Cultur iſt die Oekonomie der Kraft; die Wiſſenſchaft lehrt uns die einfachſten Mittel erkennen, um mit dem geringſten Aufwand von Kraft den größten Effect zu erzielen, und mit gegebenen Mitteln ein Maximum von Kraft hervorzubringen. Eine jede unnütze Kraftäußerung, eine jede Kraftverſchwendung in der Agricultur, in der Induſtrie und der Wiſſenſchaft, ſo wie im Staate, characteriſirt die Rohheit oder den Mangel an Cultur.

XV.

Die Vergleichung der Zuſammenſetzung des Urins der fleiſch- und pflanzenfreſſenden Thiere zeigt auf eine evidente Weiſe, daß der Act der Umſetzung der Gebilde in beiden in der Zeit und Form verſchieden iſt.

Der Harn der fleiſchfreſſenden Thiere iſt ſauer, wir haben darin alkaliſche Baſen mit Harnſäure, mit Phosphorſäure und Schwefelſäure vereinigt. Wir wiſſen genau, aus welcher Quelle dieſe beiden Säuren ſtammen. Alle Gebilde, bis auf Zellen und Membranen, enthalten Phosphorſäure und Schwefel, der durch den Sauerſtoff des arteriellen Blutes in Schwefelſäure verwandelt wird. In den verſchiedenen Flüſſigkeiten des Thierkörpers finden wir nur Spuren von phosphorſauren oder ſchwefelſauren Salzen, aber in dem Harn finden wir beide in reichlicher Menge. Es iſt klar, ſie ſtammen beide von dem Phosphor und Schwefel der Gebilde, die ſich umgeſetzt haben; ſie gelangen als lösliche Salze in das Blut und werden bei ihrem Durchgang durch die Nieren davon geſchieden.

Der Harn der grasfreſſenden Thiere iſt alkaliſch; er enthält kohlenſaures Alkali in überwiegender Menge und eine ſo geringe Menge von phosphorſaurem Alkali, daß ſie von den meiſten Beobachtern überſehen worden iſt.

Der Mangel, oder, wenn man will, die Abweſenheit der phosphorſauren Alkalien in dem Harn der grasfreſſenden Thiere zeigt offenbar, daß dieſe löslichen Salze zu beſtimmten Zwecken verwendet werden; denn wenn wir annehmen, ein Pferd verzehre eine dem Gehalte des Stickſtoffs (8⁹/₁₀ Loth) in ſeinen Nahrungsmitteln entſprechende Menge Pflanzenfibrin oder -Albumin, und wenn wir den umgeſetzten Theil der Gebilde gleichſetzen dem neugebildeten, ſo iſt die Quantität der Phosphorſäure, die wir in dem Urin (in

3 Pfund, dem täglichen Abgang nach Bouſſingault) finden müßten, nicht ſo klein, daß ſie nicht mit Leichtigkeit durch die Analyſe nachweisbar wäre (ſie betrüge nach dieſer Vorausſetzung nahe an 0,8 pCt.), allein, wie bemerkt, die meiſten Beobachter haben keine Phosphorſäure darin auffinden können.

Die Phosphorſäure, welche in Folge der Umſetzung der Gebilde in der Form von löslichem phosphorſauren Alkali erzeugt wird, kehrt offenbar bei dieſen Thieren in den Organismus zurück, der ſie zur Bildung der Gehirn- und Nervenſubſtanz nicht entbehren kann.

Bei den pflanzenfreſſenden Thieren, die eine verhältnißmäßig ſo kleine Quantität von Phosphor oder phosphorſauren Salzen genießen, ſammelt der Organismus offenbar alle durch die Umſetzung der Gebilde erzeugten löslichen phosphorſauren Salze, und verwendet ſie zur Ausbildung der Knochen und der phosphorhaltigen Beſtandtheile des Gehirns; die Secretionsorgane ſcheiden ſie von dem Blute nicht ab. Die durch Stoffwechſel in Freiheit geſetzte Phosphorſäure tritt nicht als phosphorſaures Natron aus; wir finden ſie in den feſten Excrementen in der Form von unlöslichen phosphorſauren Erden.

XVI.

Vergleichen wir die Fähigkeit der Zunahme an Maſſe, die Kraft der Aſſimilation in den gras- und fleiſchfreſſenden

Thieren, ſo führen die gewöhnlichſten Beobachtungen auf einen großen Unterſchied.

Eine Spinne, welche mit dem größten Heißhunger das Blut der erſten Fliege ausſaugt, wird durch die zweite und dritte Fliege in ihrer Ruhe nicht geſtört; eine Katze frißt die erſte, vielleicht die zweite Maus, und wenn ſie auch die dritte tödtet, ſie wird von ihr nicht verzehrt. Ganz ähnliche Beobachtungen hat man an Löwen und Tigern gemacht; ſie verzehren ihre Beute erſt dann, wenn ſich in ihnen das Bedürfniß des Hungers regt. Zur bloßen Erhaltung bedürfen die fleiſchfreſſenden Thiere an ſich einer geringeren Menge von Nahrung ſchon deshalb, weil ihre Haut keine Schweißporen hat, weil ſie alſo bei gleichem Volum weit weniger Wärme verlieren, als die Grasfreſſer, welche die verlorne Wärme durch die Nahrung erſetzen müſſen.

Wie ganz anders zeigt ſich die Stärke und Intenſität des vegetativen Lebens bei den pflanzenfreſſenden Thieren! Ein Schaf, eine Kuh auf der Weide, ſie freſſen mit geringer Unterbrechung ſo lange die Sonne am Himmel ſteht. Ihr Organismus beſitzt die Fähigkeit, alle Nahrung, die ſie mehr genießen, als ſie zur Reproduction bedürfen, in Beſtandtheile ihres Körpers zu verwandeln.

Alles Blut, was mehr erzeugt wird, als zum Erſatz an verbrauchtem Stoff erforderlich iſt, wird zur Zelle und Muskelfaſer; das pflanzenfreſſende Thier wird bei geſteigerter Nahrung fleiſchig oder feiſt, während das Fleiſch des fleiſchfreſſenden ungenießbar, zähe und ſehnenartig bleibt.

Denken wir uns nur einen Hirsch, ein Reh oder einen Hasen, welche ähnliche Nahrungsmittel genießen, wie das Rindvieh oder Schaf, so ist es evident, daß bei Ueberfluß an Nahrung ihre Zunahme an Masse (ihr Feistwerden) abhängig ist von der Menge des genossenen Pflanzenalbumins, -Fibrins oder -Caseins. Bei einer freien ungehinderten Bewegung nehmen sie Sauerstoff genug auf, um den Kohlenstoff des genossenen Gummi's, des Amylons, des Zuckers und überhaupt aller löslichen stickstofffreien Nahrungsmittel verschwinden zu machen.

Ganz anders stellt sich dieses Verhältniß bei unseren Hausthieren, wenn wir bei reichlicher Nahrung die Abkühlung und Exhalationsprocesse hindern, wenn wir sie in unseren Ställen füttern, wo die freie Bewegung unterdrückt ist.

Das Thier, welches den Stall nicht verläßt, frißt und ruht bloß, um zu verdauen, es nimmt in der Form von stickstoffhaltigen Stoffen weit mehr Nahrung auf, als es zur Reproduktion bedarf, und in gleicher Zeit mit diesen genießt es weit mehr stickstofffreie Substanzen, als zur Unterhaltung des Reproductionsprocesses und zum Ersatz an verlorner Wärme nöthig sind. Mangel an Bewegung und Abkühlung ist aber gleichbedeutend einem Mangel an Zufuhr von Sauerstoff; es nimmt, da diese vermindert sind, bei weitem weniger Sauerstoff auf, als zur Verwandlung des in der stickstofffreien Nahrung genossenen Kohlenstoffs in Kohlensäure erforderlich ist. Nur ein kleiner Theil dieses Ueberschusses von Kohlenstoff tritt aus dem Körper bei Pferden und dem Rindvieh in der Form von Hippursäure aus, alles übrige wird zur Erzeu-

gung einer Materie verwendet, die ſich nur in kleinen Quantitäten als Beſtandtheil der Nerven und des Gehirns vorfindet.

Im normalen Zuſtand der Bewegung und Arbeit enthält der Urin des Rindviehs und Pferdes Benzoeſäure (mit 14 At. Kohlenſtoff), ſobald es ruhig im Stalle ſteht, hingegen Hippurſäure (mit 18 At. Kohlenſtoff).

Das Fleiſch der wilden Thiere iſt fettlos, die Hausthiere dagegen bedecken ſich bei der Mäſtung mit Fett.

Laſſen wir das fette Thier in freier Luft ſich bewegen oder ſchwere Laſten ziehen, ſo verſchwindet wieder das Fett.

Es iſt offenbar, die Fettbildung im Thierkörper wird bedingt durch ein Mißverhältniß in der Menge der genoſſenen Nahrungsmittel und des durch Lunge und Haut aufgenommenen Sauerſtoffs.

Ein Schwein wird bei Mäſtung mit ſtickſtoffreichen Nahrungsmitteln feiſt; bei Kartoffel- (Amylon-) Fütterung erhält es wenig Fleiſch, aber eine Decke von Speck. Die Milch einer Kuh, welche bei Stall-Fütterung eine reichliche Menge Butter enthält, wird auf freier Weide an Käſeſtoff reicher und an Fett und Milchzucker in dem nämlichen Verhältniß ärmer. Durch Bier und amylonhaltige Nahrung wächſt der Buttergehalt der Frauenmilch; Fleiſchnahrung giebt weniger, aber an Käſeſtoff reichere Milch.

Wenn man erwägt, daß in der ganzen Thierklaſſe der Carnivoren, die außer dem verzehrten Fett kein ſtickſtofffreies Nahrungsmittel genießen, die Fettbildung im Körper höchſt unbedeutend iſt, daß ſie auch bei dieſen zunimmt (wie bei

Katzen und Hunden), wenn sie gemischte Nahrung genießen, daß wir bei den andern Hausthieren die Fettbildung steigern können und zwar nur durch stickstofffreie Nahrungsmittel, so kann man kaum einen Zweifel hegen, daß die letzteren in einer ganz bestimmten Beziehung stehen müssen zur Fettbildung.

Dem natürlichen Gange der Naturforschung gemäß erschließen wir rückwärts aus den genossenen Nahrungsmitteln die entstandenen Gebilde, aus den stickstoffhaltigen Pflanzenstoffen die stickstoffhaltigen Bestandtheile des Blutes, und es ist diesem Gange völlig angemessen, die Beziehungen der stickstofffreien Nahrungsmittel zu den stickstofffreien Bestandtheilen des Thierkörpers festzustellen; ein enger Zusammenhang zwischen beiden kann nicht verkannt werden.

Vergleichen wir die Zusammensetzung des Milchzuckers, des Amylons und der andern Zuckerarten mit denen des Hammeltalges, Ochsentalges, Menschenfettes, so finden wir, daß sie einerlei Verhältniß Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten und lediglich in dem Gehalte an Sauerstoff von einander abweichen.

Hammeltalg, Menschenfett, Schweineschmalz enthalten nach den Analysen Chevreul's 79 pCt. Kohlenstoff auf 11,1 pCt., 11,4 pCt., 11,7 pCt. Wasserstoff [17]).

Das Amylon enthält auf 44,91 Kohlenstoff 6,11 Wasserstoff; der Zucker und das Gummi 42,58 „ 6,37 „ [18])

Nun ist aber aus dem Folgenden einleuchtend, daß diese Zahlen, welche das relative Gewichtsverhältniß des Kohlenstoffs und Wasserstoffs im Amylon, im Zucker und im Gummi ausdrücken, zu einander in dem nämlichen Verhältniß stehen,

wie der Kohlenſtoff und Waſſerſtoff in den verſchiedenen Fetten.

$$44{,}91 : 6{,}11 = 79 : 10{,}99$$
$$42{,}58 : 6{,}37 = 79 : 11{,}8.$$

Es iſt hieraus klar, daß durch ein einfaches Austreten von Sauerſtoff, Amylon, Zucker und Gummi übergehen können in Fett, oder, wenn man will, in einen Körper, welcher genau die Zuſammenſetzung des Fetts beſitzt. Nehmen wir in der That von der Formel des Amylon 9 Atome Sauerſtoff hinweg, ſo haben wir in 100 Theilen:

C_{12}	79,4
H_{20}	10,8
O	9,8.

Die nächſte empiriſche Formel des Fetts iſt C_{11} H_{20} O; ſie giebt in 100 Theilen:

C_{11}	78,9
H_{20}	11,6
O	9,5.

Nach dieſer Formel würden ſich von dem Amylon die Elemente von 1 Atom Kohlenſäure und 7 Atome Sauerſtoff getrennt haben.

Mit dieſen beiden Formeln ſtimmt aber ſehr nahe die von allen verſeifbaren fetten Körpern überein.

Nehmen wir von drei Atomen Milchzucker C_{36} H_{72} O_{36} die Elemente hinweg von 4 Atomen Waſſer und laſſen wir 31 Atome Sauerſtoff austreten, ſo haben wir C_{36} H_{64} O, eine Formel, welche ein genauer Ausdruck iſt für die Zuſammenſetzung des Cholſterins [19]).

Gleichgültig, welche Anſicht man auch über die Entſtehung der fetten Beſtandtheile des Thierkörpers haben mag, ſoviel iſt unläugbar gewiß, daß die Wurzeln und Kräuter, welche die Kuh verzehrt, keine Butter enthalten, daß in dem Heu und der Nahrung des Rindviehs kein Ochſentalg, in der Kartoffelſchlempe, welche die Schweine bekommen, kein Schweineſchmalz und in dem Futter der Gänſe und des Geflügels kein Gänſefett oder Kapaunenfett enthalten iſt. Die großen Maſſen von Fett in dem Körper dieſer Thiere erzeugt ihr Organismus, und aus dieſer Thatſache, ihrem wahren Werthe nach anerkannt, muß geſchloſſen werden, daß von den Beſtandtheilen der genoſſenen Nahrung eine gewiſſe Quantität Sauerſtoff in irgend einer Form austritt, denn ohne eine ſolche Ausſcheidung von Sauerſtoff kann kein Fett aus irgend einem Beſtandtheil der Nahrung gebildet werden.

Die chemiſche Analyſe giebt auf die beſtimmteſte Weiſe zu erkennen, daß in den Nahrungsmitteln, die ein Thier verzehrt, ſich eine gewiſſe Menge Kohlenſtoff und Sauerſtoff befinden, die, in Aequivalenten ausgedrückt, folgende Reihe bilden.

Im Pflanzenfibrin,									
				ſind enthalten auf	120	Aeq.	Kohlenſtoff	36	Aeq. Sauerſtoff
Im Amylon	»	»	»		120	»	»	100	» »
Im Rohrzucker	»	»	»		120	»	»	110	» »
Im Traubenzucker	»	»	»		120	»	»	140	» »
Im Gummi	»	»	»		120	»	»	110	» »
Im Milchzucker	»	»	»		120	»	»	120	» »

Im Albumin,
Im Caſein

Nun ſind aber in allen fetten Subſtanzen im Mittel auf 120 Aeq. Kohlenſtoff nur 10 Aeq. Sauerſtoff enthalten.

Da nun der Kohlenſtoff der fetten Beſtandtheile des Thierkörpers von den Nahrungsmitteln ſtammt, indem es keine andere Quelle giebt, die ihn liefern könnte, ſo iſt klar, in der Vorausſetzung, das Fett entſtehe aus Albumin, Fibrin oder Caſein, daß für je 120 Aeq. Kohlenſtoff, die ſich als Fett abgelagert haben, 26 Aeq. Sauerſtoff von den Beſtandtheilen dieſer Nahrungsmittel austreten müſſen, es iſt ferner klar, daß, wenn wir annehmen, das Fett entſtehe aus Amylon, 90 Aeq., aus Zucker 100 und aus Milchzucker 110 Aeq. Sauerſtoff abgeſchieden werden müſſen.

Es giebt alſo nur einen einzigen Weg, auf welchem die Fettbildung im Thierkörper möglich iſt, und dieſer iſt abſolut der nämliche, auf welchem die Fettbildung in den Pflanzen vor ſich geht, es iſt eine Scheidung und Trennung des Sauerſtoffs von den Beſtandtheilen der Nahrungsmittel.

Der Kohlenſtoff, den wir in den Samen und Früchten der Pflanzen in der Form von Oel und Fett abgelagert finden, er war früher ein Beſtandtheil der Atmoſphäre, er wurde als Kohlenſäure von der Pflanze aufgenommen. Sein Uebergang in Fett wurde unter Mitwirkung des Lichtes durch die vegetative Lebensthätigkeit bewirkt, der größte Theil des Sauerſtoffs dieſer Kohlenſäure kehrte als Sauerſtoffgas in die Luft zurück *) [20].

*) Ueber die Bildung des Wachſes aus Honig bei den Bienen ſiehe Anhang.

Im Gegenſatz zu dieſer Lebensäußerung in der Pflanze wiſſen wir, daß der Thierorganismus Sauerſtoff aus der Luft auffaugt und daß dieſer Sauerſtoff in der Form einer Kohlenſtoff- oder Waſſerſtoffverbindung wieder austritt, wir wiſſen, daß durch den Akt der Bildung von Kohlenſäure und Waſſer die conſtante Temperatur des Körpers hervorgebracht wird, daß ein Oxydationsproceß die einzige und Hauptquelle der animaliſchen Wärme iſt.

Mag das Fett in Folge einer Zerſetzung des Fibrins oder Albumins, der Hauptbeſtandtheile des Blutes gebildet werden, mag es aus Amylon, aus Zucker, aus Gummi oder Milchzucker entſtehen, das Reſultat der Zerſetzung muß begleitet ſeyn, von einer Ausſcheidung des Sauerſtoffs, von den Beſtandtheilen dieſer Nahrungsmittel, aber dieſer Sauerſtoff tritt nicht als Sauerſtoffgas aus dem Thierkörper aus, eben weil er in dem Organismus ſelbſt, Stoffe vorfindet, welche die Fähigkeit haben, eine Verbindung mit ihm einzugehen; er tritt in der nämlichen Form aus, wie der durch Lunge und Haut aus der Luft aufgenommene Sauerſtoff.

Man beobachtet leicht, in welchem merkwürdigen Zuſammenhange die Fettbildung mit dem Reſpirationsproceß ſteht.

XVII.

Der abnorme Zuſtand, durch den Ablagerung von Fett in dem Thierkörper bewirkt wird, beruht, wie früher erwähnt worden, auf einem Mißverhältniß in der Menge des genoſſe-

nen Kohlenſtoffs und dem durch Haut und Lunge aufgenommenen Sauerſtoff. Im normalen Zuſtande wird eben ſo viel Kohlenſtoff ausgeführt wie eingeführt, der Körper erhält kein Uebergewicht an kohlenſtoffreichen und ſtickſtoffloſen Beſtandtheilen.

Steigern wir die Zufuhr der kohlenſtoffreichen Nahrungsmittel, ſo bleibt nur in dem Fall das normale Verhältniß, wenn durch Bewegung und Anſtrengung der Umſatz befördert, wenn in gleichem Grade die Zufuhr an Sauerſtoff vermehrt wird.

Jede Art von Fettbildung iſt ſtets die Folge eines Mangels an Sauerſtoff, der zur Vergaſung des im Ueberſchuſſe zugeführten Kohlenſtoffs unbedingt erforderlich iſt. Dieſer als Fett ſich ablagernde Kohlenſtoff, er zeigt ſich bei dem Beduinen, bei dem Araber der Wüſte nicht, der mit Stolz ſeine muskelſtarken, magern, fettfreien, ſehnenartigen Glieder dem Reiſenden zeigt und in Liedern beſingt, er zeigt ſich aber bei der kärglichen Nahrung in den Kerkern und Gefängniſſen als Aufgedunſenheit, er zeigt ſich in dem Weibe des Orients und in den wohlbekannten Bedingungen des Mäſtens bei unſeren Hausthieren.

Die Erzeugung von Fett beruht auf einem Mangel an Sauerſtoff, allein in ihr, in der Fettbildung ſelbſt, öffnet ſich dem Organismus eine Quelle von Sauerſtoff, eine neue Urſache der Wärmeerzeugung.

Der in Folge der Fettbildung freiwerdende Sauerſtoff, er tritt aus dem Körper als eine Kohlenſtoff- oder Waſſer-

stoffverbindung aus, mag nun dieser Kohlenstoff oder Wasserstoff von der Substanz selbst, die auch den Sauerstoff zuführte, oder mag er von einer andern Verbindung genommen worden sein, es muß durch diese Kohlensäure- oder Wasserbildung ebensoviel Wärme entwickelt werden, wie wenn wir eine gleiche Menge Kohlenstoff oder Wasserstoff in der Luft oder im Sauerstoffgas verbrannt hätten.

Wenn wir uns denken, daß sich von 2 Aeq. Amylon 18 Aeq. Sauerstoff trennen, daß sich diese 18 Aeq. Sauerstoff mit 9 Aeq. Kohlenstoff aus der Galle, z. B. zu Kohlensäure, verbunden hätten, so ist niemand zweifelhaft darüber, daß in diesem Fall gerade so viel Wärme entwickelt werden muß, wie wenn wir diese 9 Atome Kohlenstoff direct verbrannt hätten. In dieser Form wäre also die Wärmeentwickelung in Folge der Fettbildung nicht bestreitbar; sie kann also nur für den Fall hypothetisch sein, wo sich von einer und derselben Substanz Kohlenstoff und Sauerstoff in den Verhältnissen, wie in der Kohlensäure, trennen.

Wenn wir z. B. voraussetzen, daß sich von 2 At. Amylon, $C_{24}\ H_{40}\ O_{20}$ die Elemente von 9 At. Kohlensäure abscheiden, so würden wir eine Verbindung übrig behalten, welche auf 15 At. Kohlenstoff, 40 At. Wasserstoff und 2 At. Sauerstoff enthält:

$$C_{15}\ H_{40}\ O_2 + C_9\ O_{18} = C_{24}\ H_{40}\ O_{20}.$$

Oder wenn wir annehmen, daß Sauerstoff aus Amylon in der Form von Kohlensäure und Wasser austritt, so würden wir bei Abscheidung der Bestandtheile von 6 At. Was-

ſer und 6 At. Kohlenſäure die Verbindung C_{18} H_{23} O_2 übrig behalten.

Dieſe Form der Ausſcheidung des Sauerſtoffs feſtgeſtellt, bleibt zu entſcheiden übrig, ob die austretende Kohlenſäure und das Waſſer in dem Amylon als ſolche enthalten waren oder nicht.

War die Kohlenſäure und das Waſſer fertig gebildet in dem Amylon, ſo konnte die Trennung vor ſich gehen, ohne von einer Wärmeentwickelung begleitet zu ſein, war hingegen der Kohlenſtoff und Waſſerſtoff in einer andern Form in dem Amylon (oder der Verbindung, aus der ſich das Fett gebildet haben mag) zugegen, ſo iſt klar, daß eine Aenderung in der Anordnung der Atome vor ſich gegangen iſt, in deren Folge ſich die Atome des Kohlenſtoffs und Waſſerſtoffs mit den Atomen des Sauerſtoffs zu Kohlenſäure und Waſſer vereinigt haben.

So weit nun chemiſche Forſchungen reichen, kann aus dem bekannten Verhalten des Amylons und der Zuckerarten kein anderer Schluß gezogen werden, als daß ſie keine fertig gebildete Kohlenſäure enthalten.

Wir kennen nun eine große Anzahl von Umſetzungsproceſſen ähnlicher Art, wo ſich die Elemente der Kohlenſäure und des Waſſers von gewiſſen vorhandenen Verbindungen trennen, und wir wiſſen mit Beſtimmtheit, daß alle dieſe Zerſetzungsweiſen begleitet ſind von einer Wärmeentwickelung, gerade ſo, wie wenn ſich Kohlenſtoff und Waſſerſtoff direct mit Sauerſtoff verbinden.

Ein solches Austreten von Kohlensäure haben wir in allen Gährungs- und Fäulnißprocessen, sie sind ohne Ausnahme begleitet von einer Entwickelung von Wärme.

In der Gährung einer zuckerhaltigen Flüssigkeit tritt in Folge einer Umsetzung der Elemente des Zuckers eine gewisse Menge seines Kohlenstoffs und Sauerstoffs zu Kohlensäure zusammen, welche sich gasförmig abscheidet, und als Resultat dieser Zersetzung haben wir eine sauerstoffarme, flüchtige, brennbare Flüssigkeit, nämlich Alkohol.

Wenn wir zu zwei Atomen Zucker die Elemente treten lassen von 12 At. Wasser und von der erhaltenen Summe der Atome 24 Atome Sauerstoff hinwegnehmen, so haben wir 6 At. Alkohol (C_{24} H_{48} O_{24} + H_{24} O_{12}) — O_{24} = C_{24} H_{72} O_{12} = 6 At. Alkohol.

Diese 24 At. Sauerstoff reichen hin, um ein drittes Atom Zucker vollkommen zu verbrennen, seinen Kohlenstoff in Kohlensäure zu verwandeln, und wir erhalten durch diese Verbrennung die 12 At. Wasser wieder, die wir hinzutreten ließen, gerade so, als ob sie keine Rolle hierbei gespielt hätten.

$$C_{12}\ H_{24}\ O_{12} + O_{24} = 12\ CO_2 + 12\ H_2O.$$

Nach der gewöhnlichen Ansicht trennen sich von 3 At. Zucker 12 Atome Kohlenstoff in der Form von Kohlensäure: wir bekommen 6 At. Alkohol, in beiden also dieselben Produkte, wie wenn der eine Theil Zucker an den andern Theil Sauerstoff abgegeben hätte und dessen Bestandtheile auf Kosten dieses Sauerstoffs verbrannt worden wären.

$$C_{36}\ H_{72}\ O_{36} = C_{24}\ H_{72}\ O_{12} + 12\ CO_2\ *).$$

Man beobachtet leicht, daß die Spaltung eines Körpers in Kohlenſäure und eine an Sauerſtoff arme Verbindung völlig gleichbedeutend iſt in ihrem Reſultate einer Ausſcheidung von Sauerſtoff und einer Verbrennung von einem Theile der Subſtanz auf Koſten dieſes Sauerſtoffs.

Es iſt wohlbekannt, daß ſich die Temperatur einer gährenden Flüſſigkeit erhöht, und wenn wir annehmen, daß ein Stückfaß Moſt = 600 Darmſtädter Maaß = 1200 Litres = 2400 Pfund, 16 pCt. Zucker, im Ganzen alſo 384 Pfund Zucker enthalte, ſo muß während der Gährung dieſes Zuckers eine Wärmemenge frei werden, welche derjenigen gleich iſt, die ſich bei der Verbrennung von 51 Pfund Kohlenſtoff entwickelt.

Dies iſt ausdrückbar durch eine Wärmequantität, wodurch jedes Pfund der Flüſſigkeit auf 165½ Grad erhoben werden kann, vorausgeſetzt, daß die Zerſetzung des Zuckers in einem unmeßbaren Zeittheilchen vor ſich ginge. Dies iſt bekanntlich nicht der Fall, die Gährung dauert 5 — 6 Tage und die 165½ Wärmegrade empfängt jedes Pfund Flüſſigkeit während eines Zeitraums von 120 Stunden. In der Stunde wird alſo eine Wärmemenge entwickelt, durch welche jedes Pfund Flüſſigkeit um 1⁹⁄₁₀ Grad an Temperatur zunimmt, eine Erhöhung, welche durch äußere Abkühlung im

*) In Beziehung auf das Verſtändniß der Formeln ſiehe die Einleitung zum Anhang.

Keller, durch Verdunstung von Wasser und Alkohol beträchtlich herabgestimmt wird.

XVIII.

Die Fettbildung, mit bekannten analogen Erscheinungen der Trennung von Sauerstoff verglichen, ist demnach von einer Wärmeentwicklung begleitet; sie ersetzt dem thierischen Körper eine gewisse Menge des zu den vitalen Processen unentbehrlichen, atmosphärischen Sauerstoffs, und zwar in allen denjenigen Fällen, wo der durch Haut und Lunge eingeathmete Sauerstoff nicht hinreicht, um den vorhandenen und dazu geeigneten Kohlenstoff in Kohlensäure zu verwandeln.

Dieser Ueberschuß von Kohlenstoff, welcher in dem Körper zu einem Bestandtheil der Organe nicht verwendet werden kann, lagert sich in der Form von Talg oder Oel in Zellen ab.

In jedem Momente des Lebens eines Thieres tritt Fettbildung ein, wo ein Mißverhältniß zwischen dem durch die Nahrung zugeführten Kohlenstoff und dem eingeathmeten Sauerstoff statt hat; es trennt sich Sauerstoff in Folge einer Umsetzung von vorhandenen Verbindungen, und dieser Sauerstoff tritt als Kohlensäure oder Wasser aus dem Körper aus. Die hierbei entwickelte Wärme trägt dazu bei, um die constante Temperatur des Körpers zu erhalten. Ein jedes Pfund Kohlenstoff, welches seinen Sauerstoff, mit dem es

Kohlenſäure bildet, von Materien erhielt, die in Fett übergingen, muß ſo viel Wärme entwickeln, daß man damit 200 Pfunde Waſſer auf 39 Grade erheben kann.

In der Fettbildung ſchafft die Lebenskraft ſich ſelbſt ein Mittel, um dem Mangel an Sauerſtoff und an der zu den vitalen Proceſſen nöthigen Wärme zu begegnen.

Die Erfahrung zeigt, daß das Anbinden der Füße bei dem Geflügel und eine mittlere Temperatur ein Maximum von Fettbildung nach ſich zieht. Dieſe Thiere ſind in dieſem Zuſtande einer Pflanze vergleichbar, die im eminenten Grade die Fähigkeit beſitzt, alle Nahrungsſtoffe in Theile ihrer ſelbſt zu verwandeln. Die im Ueberſchuß zugeführten Blutbeſtandtheile werden zu Fleiſch, zu Beſtandtheilen der Gebilde, Amylon und die ſtickſtofffreien Materien verwandeln ſich in Fett. Bei dem Fettwerden auf Koſten ſtickſtofffreier Nahrungsſtoffe nehmen nur gewiſſe Theile des Organismus an Volumen zu; ſo iſt die Leber einer gemäſteten Gans 4—5mal größer, wie die einer ungemäſteten, ohne daß man damit ſagen kann, daß die Subſtanz der Leber ſelbſt eine Zunahme erfahren hat. Während die Leber der ungemäſteten Gans feſt und elaſtiſch iſt, zeigt die der gemäſteten eine weiche ſchwammige Beſchaffenheit; der Unterſchied liegt lediglich in einer mehr oder minderen Erweiterung der Zellen, ausgefüllt durch Fett.

In einigen Krankheiten erleiden nachweisbar die amylonreichen Stoffe diejenigen Veränderungen nicht, die ſie befähigen, den Reſpirationsproceß zu unterhalten oder in Fett

überzugehen. In dem diabetes mellitus wird das Amylon nicht weiter als in Zucker verwandelt, der ohne eine Verwendung zu finden aus dem Körper entfernt wird.

Wir finden ferner in andern Krankheiten, bei Leberentzündungen z. B., das Blut reich an Oel und Fett, und mit der Vorſtellung, daß unter gewiſſen Bedingungen gewiſſe Beſtandtheile der Galle in Fett metamorphoſirt werden, ſteht die Zuſammenſetzung der Galle nicht in Widerſpruch.

XIX.

Nach dem Vorgehenden laſſen ſich die Nahrungsmittel der Menſchen eintheilen in zwei Klaſſen: in *ſtickſtoffhaltige* und in *ſtickſtofffreie*. Die erſteren beſitzen die Fähigkeit, in Blut überzugehen, den andern geht dieſe Eigenſchaft ab.

Aus den Nahrungsmitteln, welche ſich zur Blutbildung eignen, entſtehen die Beſtandtheile der Organe, die andern dienen im normalen Zuſtande der Geſundheit zur Unterhaltung des Reſpirationsproceſſes. Die ſtickſtoffhaltigen bezeichnen wir als *plaſtiſche Nahrungsmittel*, die ſtickſtofffreien nennen wir *Reſpirationsmittel*.

Plaſtiſche Nahrungsmittel ſind:	Reſpirationsmittel ſind:
Pflanzenfibrin	Fett
Pflanzenalbumin	Amylon
Pflanzencaſein	Gummi
Fleiſch und Blut der Thiere	die Zuckerarten
	Pectin
	Baſſorin ꝛc.
	Wein
	Bier
	Branntwein.

XX.

Als eine ganz allgemeine Thatſache, welcher bis jetzt keine einzige Erfahrung entgegenſteht, haben die Unterſuchungen ergeben, daß alle ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheile der Pflanzen eine mit den Hauptbeſtandtheilen des Blutes gleiche Zuſammenſetzung beſitzen.

Kein ſtickſtoffhaltiger Körper, deſſen Zuſammenſetzung abweicht von der des Fibrins, Albumins und Caſeins, iſt vermögend, den Lebensproceß im Thiere zu unterhalten.

Der Thierorganismus beſitzt ohnſtreitig die Kraft, aus den Beſtandtheilen ſeines Blutes die Subſtanz ſeiner Membranen und Zellen, der Nerven und des Gehirns, die organiſchen Beſtandtheile der Rippen, Knorpel und Knochen zu erzeugen, allein ſein Blut muß ihm, bis auf die Form, fertig gebildet dargeboten werden, und wenn dies nicht ge-

schieht, so ist damit der Blutbildung und dem Leben eine Grenze gesetzt.

Von diesem Gesichtspunkte aufgefaßt, ist es leicht erklärlich, woher es kommt, daß die leimgebenden Gebilde, die Gallerte der Knochen und Häute, zur Ernährung und zur Unterhaltung des Lebensprocesses sich nicht eignen, denn ihre Zusammensetzung ist ungleich der des Fibrins und Albumins im Blute. Dies will natürlich nichts anders sagen, als daß die Organe in dem Thierkörper, welche die Blutbildung vermitteln, die Kraft nicht besitzen, um eine Metamorphose in der Anordnung der Elemente der Gallerte (leim- und chondringebenden Gebilde) zu bewirken. Die Leimgebilde, die Gallerte der Knochen, Membranen, Zellen und Häute erleiden in dem Thierkörper durch den Einfluß des Sauerstoffs und der Feuchtigkeit eine fortdauernde Veränderung, ein Theil davon tritt aus und muß aus dem Blute wieder erneuert werden, aber diese Verwandlung und Wiederherstellung ist offenbar in sehr enge Grenzen eingeschlossen.

Während in dem Körper des Verhungernden und Kranken das Fett verschwindet und die Muskelsubstanz die Form von Blut wieder annimmt, sehen wir die Sehnen und Membranen ihren Zustand behaupten, alle Glieder des Todten behalten ihren Zusammenhang, den sie diesen Gebilden verdanken.

Auf der andern Seite sehen wir, daß von einem Knochen, den ein Hund verschluckt hat, nur die Knochenerde

5132708

wieder abgeht, daß die Gallerte in ſeinem Körper völlig verſchwunden iſt; die nämliche Beobachtung machen wir an Menſchen, die als Nahrungsmittel verhältnißmäßig mehr Gallerte (in Fleiſchbrühe) als andere Stoffe genießen, daß ſie weder in dem Urin, noch in den Faeces austritt; ſie hat alſo offenbar eine Veränderung erlitten und in dem Körper zu gewiſſen Zwecken gedient.

Es iſt klar, daß ſie in einer andern Form aus dem Körper wieder austritt, als die iſt, in welcher ſie genoſſen worden iſt.

Für den Uebergang des Albumins in Blut, zu einem Beſtandtheil eines fibrinhaltigen Organs, läßt ſich in der gleichen Zuſammenſetzung beider kein Widerſpruch entnehmen. Wir finden im Gegentheile die Verwandlung eines löslichen und gelöſ'ten Stoffes in einen nichtlöslichen Träger der Lebensthätigkeit begreiflich und in chemiſcher Beziehung erklärt, eben weil ſie in ihrer Zuſammenſetzung identiſch ſind. So iſt denn die Meinung einer näheren Begründung nicht unwürdig, daß die in Auflöſung genoſſene Gallerte in dem Organismus wieder zur Zelle und zu Membranen, zu einem Beſtandtheil der Knochen wird; daß ſie dazu dienen kann, um die leimgebenden Gebilde, welche eine Veränderung erlitten haben, zu erneuern und ihre Maſſe zu vermehren.

Und wenn die Kraft zur Reproduction im ganzen Körper ſich mit dem Zuſtand der Geſundheit ändert, ſo muß, wenn auch die Fähigkeit der Blutbildung die nämliche bliebe, die

organische Kraft, durch welche die Bestandtheile des Bluts zu Membranen und Zellen werden, im Zustand der Krankheit nothwendig abgenommen haben; die Intensität der Lebenskraft, ihre Fähigkeit, Metamorphosen überhaupt zu bewirken, sie nimmt im Kranken, in seinem Magen sowohl, wie in allen Theilen seines Körpers ab. In diesem Zustande zeigt die practische Medizin, daß die löslich gemachten leimgebenden Gebilde einen ganz entschiedenen Einfluß auf das Befinden des Körpers äußern; in einer Form dargeboten, in der sie sich zur Assimilation eignen, dienen sie zur Ersparung von Kraft, ähnlich so wie es für den Magen durch zweckmäßig zubereitete Speise geschieht. Die Knochenbrüchigkeit bei den grasfressenden Thieren ist offenbar die Folge einer Schwäche in denjenigen Theilen des Organismus, welche bestimmt sind, die Metamorphosen der Blutbestandtheile in Zellensubstanz zu bewirken, und wenn die Angaben von Aerzten, die sich im Oriente aufgehalten haben, Vertrauen verdienen, so haben die türkischen Weiber in der Reisnahrung und in den häufigen Klystieren von Fleischbrühe die Bedingungen vereinigt zur Zellen- und Fettbildung.

Zweiter Theil.

Die

Metamorphosen der Gebilde.

I.

1. Die absolute Gleichheit in der Zusammensetzung der Hauptbestandtheile des Bluts und der stickstoffhaltigen Nahrungsmittel der Thiere wäre vor wenigen Jahren noch ein Argument gewesen, um das Resultat der chemischen Analyse zu leugnen, zu einer Zeit, wo man noch nicht die Erfahrung gemacht hatte, daß es eine Menge stickstoffhaltiger und stickstofffreier Körper giebt, die bei einer großen Verschiedenheit in ihren physikalischen Eigenschaften eine vollkommen gleiche procentische Zusammensetzung besitzen, von denen manche sogar die nämliche Anzahl von Atomen an Elementen enthalten.

2. Wir kennen z. B. in der Cyanursäure einen stickstoffhaltigen Körper, welcher in schönen klaren Octaedern krystallisirt, die sich in Wasser und Säuren mit Leichtigkeit lösen, in dem Cyamelid haben wir einen zweiten Körper, welcher in Wasser und Säuren absolut unlöslich, weiß, zusammenhängend und undurchsichtig wie Porzellan oder locker wie Bittererde ist, eine dritte Substanz kennen wir in dem Cyansäurehydrat, welche flüchtiger wie starke Essigsäure, auf der Haut Blasen zieht und mit Wasser nicht zusammengebracht werden kann, ohne augenblicklich in neue Produkte zerlegt zu werden.

Dieſe drei Stoffe zeigen nicht allein in der Analyſe ein abſolut gleiches Gewichtsverhältniß an Elementen, ſondern ſie können auch der eine in den andern vorwärts und rückwärts verwandelt werden und zwar in hermetiſch geſchloſſenen Gefäßen, ohne daß alſo an dieſer Verwandlung ein Stoff von Außen Antheil nimmt [21]). Unter den ſtickſtofffreien Subſtanzen kennen wir in dem Aldehyd eine mit Waſſer miſchbare brennbare Flüſſigkeit, welche in der Wärme der Hand ſchon ſiedet, mit großer Begierde Sauerſtoff aus der Luft anzieht und ſich in Eſſigſäure verwandelt. Dieſer Aldehyd läßt ſich ſelbſt in zugeſchmolzenen Gefäßen nicht aufbewahren, ſchon nach Stunden oder Tagen ändert ſich ſeine Beſchaffenheit, ſeine Flüchtigkeit, ſeine Fähigkeit Sauerſtoff anzuziehen; es ſetzen ſich lange farbloſe, harte Nadeln darin ab, welche bei Siedhitze des Waſſers noch nicht flüchtig ſind, und die Flüſſigkeit, in welcher es geſchieht, iſt kein Aldehyd mehr, ſie ſiedet erſt bei 60°, miſcht ſich nicht mehr mit Waſſer und kryſtalliſirt in eisähnlichen Nadeln bei einem geringen Kältegrade. Nichtsdeſtoweniger hat die Analyſe dargethan, daß dieſe drei ſo verſchiedenen Subſtanzen identiſch in ihrer Zuſammenſetzung ſind [22]).

3. Einer ähnlichen Dreiheit begegnen wir in dem Albumin, Fibrin und Caſein. Bis auf ihre phyſikaliſchen Eigenſchaften weichen ſie in ihrem Gehalte an organiſchen Elementen nicht von einander ab.

Wenn man Thieralbumin, -Fibrin und -Caſein in einer mäßig ſtarken Kalilauge löſ't und dieſe Flüſſigkeit eine Zeitlang einer höhern Temperatur ausſetzt, ſo werden dieſe Ma-

terien zerlegt. Durch Zusatz von Essigsäure scheidet sich aus diesen Auflösungen ein gelatinöser, halb durchscheinender Niederschlag ab, welcher einerlei Beschaffenheit und Zusammensetzung zeigt, von welcher der genannten drei Thiersubstanzen derselbe auch dargestellt werden mag.

Mulder, dem wir die Entdeckung dieses Körpers verdanken, fand durch genaue und sorgfältig ausgeführte Analysen, daß diese Substanz die nämlichen organischen Elemente, und zwar in demselben relativen Verhältnisse enthält, wie die Thierstoffe, aus denen sie erhalten worden war, in der Art also, daß, wenn man von Albumin, Fibrin und Casein die Aschenbestandtheile, den Schwefel und Phosphor, den sie enthalten, abzieht, und den Rest der Bestandtheile auf 100 Theile berechnet, man zu den nämlichen Zahlenverhältnissen, zu denen die Analyse des durch Kali erhaltenen Zersetzungsproduktes führt, gelangt [25]).

Von diesem Gesichtspunkte aus lassen sich die Hauptbestandtheile des Blutes und der stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe der Thiermilch als Verbindungen von phosphorsauren und andern Salzen, von Phosphor und Schwefel, mit einem aus Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehenden Körper betrachten, in welchem das relative Verhältniß dieser Elemente nicht wechselt, und dieser Körper läßt sich als Anfangs- und Ausgangspunkt der ganzen Reihe der übrigen Thiergebilde ansehen, eben weil sie alle aus dem Blute erzeugt werden.

Diese Betrachtungsweise veranlaßte Mulder, dem erwähn-

Venen erzeugen; an der Bildung der Gehirn- und Nervenſubſtanz mag das Fett des Ei's einen gewiſſen Antheil genommen haben, allein zur Erzeugung der ſtickſtoffhaltigen Träger der Lebensthätigkeit konnte ſein Kohlenſtoff nicht verwendet werden, eben weil das Albumin des Weißen und Dotters im Ei auf den gegebenen Stickſtoffgehalt die zur Hervorbringung der Gebilde nöthige Kohlenſtoffmenge ſchon enthält.

6. Der eigentliche Ausgangspunkt aller Gebilde im Thierkörper iſt hiernach das Albumin; alle ſtickſtoffhaltigen Nahrungsſtoffe, gleichgültig, ob ſie von Thieren und Pflanzen ſtammen, verwandeln ſich, ehe ſie Theil an dem Nutritionsproceß nehmen, in Albumin.

Alle Nahrungsſtoffe, welche das Thier genießt, werden in ſeinem Magen löslich und überführbar in das Blut. An dieſem Löslichwerden nimmt außer dem Sauerſtoff der Luft nur eine Flüſſigkeit Antheil, welche von den Wänden des Magens abgeſondert wird.

Die entſcheidendſten Verſuche der Phyſiologen haben dargethan, daß der Verdauungsproceß unabhängig iſt von der Lebensthätigkeit, er geht vor ſich in Folge einer rein chemiſchen Aktion, ganz ähnlich den Zerſetzungs- oder Umſetzungsproceſſen, die man mit Fäulniß, Gährung oder Verweſung bezeichnet.

7. In der einfachſten Form ausgedrückt iſt Gährung und Fäulniß der Vorgang der Umſetzung (neuen Lagerung) der Elementartheile (Atome) einer Verbindung, zu einer oder zu mehreren neuen Gruppen (Verbindungen), welche bewirkt

wird durch die Berührung mit andern Körpern, deren Elementartheile sich selbst im Zustand der Umsetzung (Zersetzung) befinden. Es ist eine Uebertragung und Mittheilung eines Zustandes der Bewegung, welche die Atome eines sich in Bewegung befindlichen Körpers in andern Materien hervorzubringen vermögen, deren Elementartheile nur mit einer geringen Kraft zusammengehalten sind.

8. So enthält denn der klare Magensaft eine im Zustand der Umsetzung befindliche Materie, durch deren Berührung mit den an und für sich im Wasser unlöslichen Bestandtheilen der Speise, diese die Fähigkeit sich zu lösen, in Folge einer neuen Gruppirung ihrer Elementartheile, empfangen. Während der Verdauung enthält der abgesonderte Magensaft eine reie Mineralsäure, durch deren Gegenwart eine jede weitere Veränderung aufgehalten wird.

Daß die Löslichwerdung der Speisen unabhängig von der Lebensthätigkeit der Verdauungsorgane ist, haben die Physiologen aufs klarste durch eine Menge der schönsten Versuche dargethan. Speisen, in metallene durchlöcherte Röhren eingeschlossen, so daß sie mit den Wänden des Magens nicht in Berührung kommen konnten, verschwinden ebenso leicht und schnell, sie werden eben so gut verdaut, wie wenn diese Hülle nicht vorhanden gewesen wäre, und frisch aus dem Körper genommener Magensaft, in dem man gekochtes Eiweiß, Muskelfleisch bei der Temperatur des Thierkörpers eine Zeitlang erhält, bewirkt, daß sie ihre feste Beschaffenheit verlieren; sie lösen sich in der Flüssigkeit auf.

9. Die in dem Magenſaft vorhandene, im Zuſtand der Veränderung befindliche Materie iſt, wie man kaum bezweifeln kann, ein Produkt der Umſetzung des Magens ſelbſt. Keine mehr wie die Produkte, welche durch die fortſchreitende Zerſetzung der Leim- (Chondrin-?) gebenden Gebilde erzeugt werden, beſitzen in ſo hohem Grade die Fähigkeit, in andern Stoffen eine Umſetzung ihrer Beſtandtheile hervorzurufen. Wenn man die Membranen des Magens irgend eines Thieres (den Labmagen des Kalbes z. B.) durch anhaltendes Waſchen mit Waſſer reinigt, ſo zeigt er keine Art von Wirkung, wenn er mit Zucker, Milch und andern Subſtanzen zuſammengebracht wird; läßt man dieſelben Membranen eine Zeitlang an der Luft liegen, oder trocknet man ſie und bringt ſie mit Waſſer und den genannten Subſtanzen in Berührung, ſo verwandelt ſich der Zucker, je nach dem Zuſtand der Zerſetzung, in der ſich die Thierſubſtanz befindet, in Milchſäure oder in Schleim und Mannit oder in Alkohol und Kohlenſäure; die Milch wird davon augenblicklich zum Gerinnen gebracht. Eine gewöhnliche Thierblaſe behauptet in trocknem Zuſtande ihren Zuſtand und alle ihre Eigenſchaften unverändert, aber bei Gegenwart von Feuchtigkeit und Luft geht ſie einer Veränderung entgegen, ohne daß man dieſe durch beſondere äußere Zeichen wahrnimmt; wird ſie in dieſem Zuſtande in eine Auflöſung von Milchzucker gelegt, ſo verwandelt ſich dieſer in kurzer Zeit in Milchſäure.

10. Friſcher Labmagen des Kalbes, mit ſchwacher Salzſäure in Berührung, ertheilt dieſer Flüſſigkeit nicht die geringſte

Fähigkeit, gekochtes Fleisch oder Eiweiß aufzulösen; war aber der Labmagen vorher getrocknet worden, oder läßt man ihn eine Zeitlang im Wasser liegen, so lös't mit Salzsäure angesäuertes Wasser eine Materie in höchst geringer Menge daraus auf, deren Zustand der Zersetzung sich in der Auflösung vollendet; durch die Uebertragung des Aktes der Zersetzung auf das coagulirte Eiweiß wird es an den Rändern zuerst durchscheinend, dann schleimig und lös't sich zuletzt bis auf trübende fette Gemengtheile völlig auf. Sauerstoff wird durch das arterielle Blut allen Theilen des Thierkörpers zugeführt, überall befindet sich Feuchtigkeit, in beiden finden wir die Hauptbedingungen aller Veränderungen im Thierkörper vereinigt.

Aehnlich also wie der im Keimungsproceß der Samen in einem Zustande der Umsetzung seiner Bestandtheile befindliche Körper, dem man den Namen Diastase gegeben hat, die Löslichwerdung des Amylons (seine Verwandlung in Zucker) bewirkt, veranlaßt ein Produkt der Metamorphose der Substanz der Verdauungsorgane, indem sich seine Zersetzung im Magen vollendet, die Verflüssigung aller der Lösung fähigen Bestandtheile der Speisen. In gewissen Krankheitszuständen erzeugen sich aus den stickstofffreien Bestandtheilen der Speisen, aus Amylon und Zucker, Milchsäure [25]) und Schleim, die nämlichen Produkte, die wir durch Membranen, welche sich im Zustande der Zersetzung befinden, außerhalb des Magens hervorbringen können; allein im normalen Zustande der Gesundheit wird im Magen keine Milchsäure gebildet.

11. Die Eigenschaft vieler Respirationsmittel, des Amy-

lons und der Zuckerarten, bei Berührung mit Thierſubſtanzen, die ſich im Zuſtande der Zerſetzung befinden, in Milchſäure überzugehen, hat einen Grund bei den Phyſiologen abgegeben, um ihre Entſtehung während der Verdauung ohne weiteres anzunehmen, und ihre Fähigkeit, den phosphorſauren Kalk aufzulöſen, veranlaßte ſie, der Milchſäure die Rolle eines allgemeinen Auflöſungsmittels zuzuſchreiben. Allein es gelang weder Prout noch Braconnot, Milchſäure im Magenſafte nachzuweiſen, und ſelbſt Lehmann (ſ. ſein Lehrbuch der phyſiologiſchen Chemie 1. Bd. S. 285) erhielt aus dem Magenſaft einer Katze nur mikroſkopiſch erkennbare Kryſtalle, die er für milchſaures Zinkoxyd erklärt, obwohl ihr chemiſcher Charakter nicht ausgemittelt werden konnte.

Das Vorhandenſein von freier Salzſäure im Magenſafte, was Prout zuerſt beobachtete, iſt ſpäter von allen Chemikern, die ſich mit ſeiner Unterſuchung beſchäftigt haben, beſtätigt worden. Dieſe Salzſäure ſtammt offenbar von dem Kochſalz her, deſſen Natron bei dem Uebergang des Fibrins und Caſeins in Blut eine ganz beſtimmte Rolle übernimmt.

In ihrem Vermögen, Knochenerde aufzulöſen, wird die Salzſäure von keiner organiſchen Säure übertroffen, und Eſſigſäure ſteht in dieſer Eigenſchaft der Milchſäure gleich. Von einer Nothwendigkeit der Gegenwart der Milchſäure während des Verdauungsproceſſes kann hiernach keine Rede ſein; mit Beſtimmtheit weiß man, daß ſie in dem künſtlichen

Verdauungsproceß nicht erzeugt wird. Berzelius hat zwar milchsaure Salze im Blut und Fleisch der Thiere gefunden, allein damals war die außerordentliche Leichtigkeit und Schnelligkeit noch nicht bekannt, mit welcher diese Säure bei Gegenwart von Thierstoffen aus einer Menge von Materien zu entstehen vermag, welche die Elemente der Milchsäure enthalten.

In dem Magensafte eines Hundes fand Braconnot, neben Salzsäure, nachweisbare Spuren eines Eisensalzes, was er anfänglich für einen zufälligen Bestandtheil ansah, dessen Gegenwart sich aber in dem Magensafte eines zweiten Hundes, den man mit der nöthigen Vorsicht gewonnen hatte, bestätigte (Ann. d. chim. et d. phys. T. 59. S. 349). Dieser Eisengehalt ist für die Blutbildung bedeutungsvoll.

12. An der Wirkung des Magensaftes auf die Speisen nimmt, außer Wasser, kein anderes Element als der Sauerstoff nachweisbaren Antheil. Dieser Sauerstoff wird aus der atmosphärischen Luft dem Magen zugeführt. Während des Kauens der Speisen wird im Munde, durch besonders dazu bestimmte Organe, eine Flüssigkeit abgesondert, welche die ausgezeichnete Fähigkeit, Luft schaumartig einzuschließen, in weit höherem Grade noch wie Seifenwasser besitzt. Diese Luft gelangt durch den Speichel mit den Speisen in den Magen, wo ihr Sauerstoff eine Verbindung eingeht; der Stickstoff dieser Luft wird durch Haut und Lunge ausgeathmet. Je länger die Verdauung dauert, je größeren Widerstand die Speisen der auflösenden Aktion entgegensetzen,

deſto mehr Speichel, und mit ihm deſto mehr Luft gelangt in den Magen. Das Wiederkäuen bei gewiſſen grasfreſſenden Thieren hat offenbar noch den Zweck einer neuen und wiederholten Hinzuführung von Sauerſtoff, denn eine vollkommnere mechaniſche Zertheilung verkürzt nur die Zeit, in welcher die Auflöſung vor ſich geht.

Aus der ungleichen Menge von Luft, welche bei verſchiedenen Thierklaſſen bei dem Kauen der Speiſen mit dem Speichel in den Magen gelangt, erklären ſich die wohlbegründeten Beobachtungen der Phyſiologen, welche die Thatſache außer Zweifel geſtellt haben, daß die Thiere durch Haut und Lunge reines Stickgas ausathmen, eine Erfahrung, die um ſo wichtiger iſt, da ſie in ſich ſelbſt den entſcheidendſten Beweis trägt, daß der Stickſtoff der Luft in der thieriſchen Oekonomie keine Verwendung findet.

Das Austreten von Stickgas aus Haut und Lunge erklärt ſich durch das Vermögen der Thiergewebe Gaſe aller Art durchzulaſſen, was ſich durch die einfachſten Verſuche darthun läßt. Eine Blaſe, die man, mit kohlenſaurem Gas, Stickgas oder Waſſerſtoffgas gefüllt, wohlverſchloſſen in die Luft hängt, verliert in 24 Stunden ihren ganzen Gehalt an dieſen Gaſen; durch eine Art von Austauſch ſind ſie nach Außen hin in die Atmoſphäre entwichen, ihren Platz finden wir von atmoſphäriſcher Luft eingenommen. Ein Darm, ein Magen oder eine Haut, die wir mit dieſen Gaſen füllen, verhält ſich ganz ähnlich wie die Blaſe; dieſes Durchlaſſen der Gaſe iſt eine phyſikaliſche Eigenſchaft, die allen thieriſchen

Geweben angehört; wir beobachten sie in dem lebenden Körper in gleichem Grade wie an den todten Substanzen.

Man weiß, daß bei Lungenverletzungen nicht selten ein eigenthümlicher Zustand entsteht, wo beim Athmen die atmosphärische Luft von den Luftwegen aus in das angränzende Zellgewebe eindringt. Diese Luft wird durch die Respirationsbewegungen von der Wundstelle aus in dem Zellgewebe immer weiter fortgetrieben und bildet so den unter dem Namen Emphysem bekannten Krankheitszustand. Sobald das fernere Eindringen der atmosphärischen Luft in das Zellgewebe frühzeitig genug verhindert wird, verliert sich dieser Zustand allmälig von selbst wieder, der Sauerstoff dieser Luft ist, wie man nicht zweifeln kann, in Verbindung getreten, das Stickstoffgas ist durch Haut und Lunge ausgeathmet worden.

Es ist ferner bekannt, daß bei vielen grasfressenden Thieren, wenn sie sich im Genuße frischer saftiger Pflanzen die Verdauungswerkzeuge überladen haben, diese Stoffe in dem Magen selbst der nämlichen Zersetzung unterliegen, die sie außerhalb des Körpers in gleicher Temperatur erfahren; sie gehen in Gährung und Fäulniß über, wobei sich eine so große Menge kohlensaures und entzündliches Gas entwickelt, daß diese Organe auf eine ungewöhnliche Weise (zuweilen bis zum Zersprengen) aufgetrieben werden. Nach der Einrichtung ihres Magens oder ihrer Mägen, können diese Gase durch den Schlund nicht entweichen, man sieht aber nach einigen Stunden schon den aufgetriebenen Leib kleiner werden, und nach 24 Stunden ist von allem Gase keine Spur mehr vorhanden [26]).

Erinnert man ſich zuletzt an die tödtlichen Zufälle, die in Weinländern ſo häufig durch den Genuß von ſogenanntem federweißen Wein veranlaßt werden, ſo kann man nicht den geringſten Zweifel hegen, daß Gaſe jeder Art, im Waſſer lösliche oder unlösliche, das Vermögen beſitzen, die thieriſchen Gewebe zu durchdringen, ähnlich wie Waſſer von ungeleimtem Papier durchgelaſſen wird. Der federweiße Wein iſt in Gährung begriffener Wein, welche durch die Temperatur des Magens geſteigert wird; das entwickelte kohlenſaure Gas dringt durch die Wände des Magens, des Zwerchfelles, durch alle Häute in die Lungenzellen, und verdrängt aus dieſen die atmoſpäriſche Luft. Der Menſch ſtirbt mit allen Zeichen der Erſtickung in einem irreſpirablen Gaſe, und der ſicherſte Beweis für ihr Vorhandenſein in der Lunge iſt unſtreitig der Umſtand, daß das Einathmen von Ammoniakgas als das beſte Gegenmittel gegen dieſen Krankheitszuſtand anerkannt iſt.

Die Kohlenſäure der mouſſirenden Weine, welche in den Magen gelangt, die Kohlenſäure, die man im Waſſer, was damit geſättigt iſt, in der Form eines Klyſtiers zu ſich nimmt, ſie treten durch Haut und Lunge wieder aus, und in gleichem Grade muß dies von dem Stickgas gelten, was durch den Speichel in den Magen gelangt.

Gewiß mag ein Theil dieſer Gaſe durch das Saug- und Lymphgefäßſyſtem in das venöſe Blut und von da in die Lunge gelangen, wo ſie abdunſten, allein ihrem directen Eindringen in die Bruſthöhle und Lunge ſteht in den Membranen

selbst, nicht das geringste Hinderniß im Wege. Es ist in der That schwer zu glauben, daß die Saug- und Lymphgefäße ein besonderes Bestreben haben, Luft, Stickgas, Wasserstoffgas ꝛc. aufzusaugen und dem Blute zuzuführen, da die Eingeweide, der Magen, alle Räume, die nicht mit festen oder flüssigen Stoffen ausgefüllt sind, Gase enthalten, die nur bei einer gewissen Volumsvergrößerung ihren Platz verlassen, die also nicht aufgesaugt werden. Von dem Stickgas im besondern, mit dem sich das Blut bei seinem Durchgange durch die Lunge, wie eine jede andere Flüssigkeit sättigt, d. h. von dem es so viel aufnimmt, als seinem Auflösungsvermögen entspricht, muß angenommen werden, daß es nicht durch den Kreislauf des Blutes, sondern auf einem directeren Wege wieder aus dem Magen tritt. Durch die Athembewegungen werden alle Gase, welche die leeren Räume ausfüllen, nach der Brusthöhle hingetrieben, indem durch die Bewegung des Zwergfelles und die Erweiterung der Brusthöhle ein luftverdünnter Raum entsteht, in dessen Folge, durch den atmosphärischen Luftdruck, Luft von allen Seiten her in die Lungen eingetrieben wird; es findet freilich das Maximum der Ausgleichung durch die Luftröhre statt, aber auch von Innen her müssen alle Gase eine Bewegung nach der Brusthöhle und Lunge hin empfangen. Bei den Vögeln und Schildkröten ist dieses Verhältniß umgekehrt. Wenn wir annehmen, daß ein Mensch in einer Minute nur $\frac{1}{6}$ Kubikzoll Luft mit dem Speichel seinem Magen zuführt, so macht dies in 18 Stunden 135 Kubikzoll aus, wenn wir den fünften Theil davon

als Sauerstoff abrechnen, so bleiben immer noch 108 Kubikzoll Stickgas, welche den Raum von drei Pfund (hessische) Wasser einnehmen. So wenig oder so viel die verschluckte Stickstoffmenge nun auch betragen mag, gewiß ist, daß dieses Gas durch den Mund, Nase oder Haut wieder austritt, und wenn wir die große Menge Stickgas in Betrachtung ziehen, welche von Magendie in den Eingeweiden Hingerichteter nachgewiesen worden ist, so wie die Abwesenheit von allem Sauerstoffgas in den nämlichen Organen [27]), so muß angenommen werden, daß auch in Folge der Resorbtion durch die Haut Luft, d. h. Stickgas, eintritt, welches durch die Lunge wieder ausgeathmet wird.

Bei dem Athmen der Thiere in Gasen, die keinen Stickstoff enthalten, wird mehr Stickgas ausgeathmet, eben weil sich in diesem Falle das Stickgas im Körper gegen den Raum außerhalb verhält, wie wenn dieser Raum luftleer wäre. (S. Graham über die Diffusion der Gase.)

Die Unterschiede in der Menge des ausgeathmeten Stickgases von verschiedenen Thierklassen erklären sich hiernach leicht; die Herbivoren verschlucken mit dem Speichel mehr Luft wie die Carnivoren; sie athmen mehr Stickgas aus, beim Fasten weniger wie nach frisch genossener Nahrung.

13. Aehnlich wie die aus dem Leibe genommene Muskelfaser den Zustand der Zersetzung und Umsetzung, in welchem sich ihre Bestandtheile befinden, dem Wasserstoffhyperoxyde überträgt, wirkt ein durch den organischen Proceß, in Folge

der Umsetzung der Bestandtheile des Magens und der Verdauungsorgane, entstehendes Product, indem sich seine Metamorphose im Magen vollendet, auf die Bestandtheile der genossenen Speisen. Die unlöslichen erhalten die Fähigkeit sich zu lösen, sie werden verdaut.

Es ist gewiß bemerkenswerth, daß gekochtes Eiweiß oder Fibrin, wenn sie durch gewisse Flüssigkeiten, durch organische Säuren oder schwache alkalische Laugen, löslich gemacht werden, daß alle ihre übrigen Eigenschaften bis auf die Form (den Cohäsionszustand) nicht die geringste Aenderung erfahren, ihre Elementartheile ordnen sich sicher auf eine andere Art, allein sie theilen sich nicht in zwei oder mehre Gruppen, in zwei oder mehre neue Verbindungen, sondern sie bleiben zusammen vereinigt.

Ganz dasselbe findet in dem Verdauungsprocesse statt; im gesunden Zustande erleiden die Speisen nur eine Aufhebung ihres Cohäsionszustandes.

Das größte Hinderniß, was sich der klaren Auffassung des Verdauungsprocesses, der in dem Vorhergehenden zu den chemischen Metamorphosen gerechnet worden ist, die man Gährung und Fäulniß nennt, entgegenstellt, beruht auf der unwillkührlichen Erinnerung und in der Festhaltung der Erscheinungen, welche die Gährung des Zuckers und der Thiersubstanzen (Fäulniß) begleiten, allein es giebt zahllose Fälle, wo eine Umsetzung der Bestandtheile einer Verbindung vor sich geht, ohne die geringste Gasentwickelung, und es sind hauptsächlich diese, welche man ins Auge zu fassen hat, wenn man

den chemiſchen Begriff der Verdauung frei von Irrthum in ſich aufnehmen will.

Alle Materien, welche die Erſcheinungen der Gährung und Fäulniß in Flüſſigkeiten aufzuheben vermögen, ſtören, in den verdauenden Magen gebracht, die Verdauung. Die Wirkung der brenzlichen, empyreumatiſchen Stoffe von Caffee, Tabacksdampf, Kreoſot, Queckſilbermittel u. ſ. w. verdienen in dieſer Beziehung für Dietätik eine beſondere Beachtung.

Durch die Gleichheit in der Zuſammenſetzung der Beſtandtheile des Bluts mit den ſtickſtoffhaltigen, vegetabiliſchen Nahrungsſtoffen haben wir, gewiß auf eine ſehr unerwartete Weiſe, erfahren, warum faulendes Blut, Eiweiß, Fleiſch, Käſe in Zuckerwaſſer die nämliche Veränderung hervorbringen, wie Hefe, warum Zucker damit in Berührung je nach dem Zuſtande der Zerſetzung, in welchem ſich die faulenden Materien befinden, bald in Alkohol und Kohlenſäure, bald in Milchſäure und Schleim ſich zerlegt. Die Urſache liegt einfach darin, daß die Materie, welche man Hefe (Ferment) genannt hat, im Zuſtande der Zerſetzung begriffenes Pflanzenalbumin, -Fibrin oder -Caſein iſt, Subſtanzen, welche identiſch ſind mit den Beſtandtheilen des Fleiſches oder des Blutes. Die Fäulniß der genannten Thierſubſtanzen iſt in ihrem Vorgang identiſch mit dem Proceß der Metamorphoſe der ihnen identiſchen Pflanzenſtoffe, es iſt ein Zerfallen in minder complexe neue Verbindungen. Und wenn man die Umſetzung der Beſtandtheile des Thierkörpers (den Verbrauch an Stoff vom Thiere) als einen chemiſchen Proceß betrach-

tet, welcher unter dem Einflusse der Lebensthätigkeit vor sich geht, so ist die Fäulniß derselben außerhalb des Thierkörpers ein Zerfallen in einfachere Verbindungen, an welchen die Lebenskraft keinen Antheil nimmt. Die Action ist in beiden Fällen die nämliche, nur die Producte sind verschieden. Die practische Medicin hat über die Wirkung empyreumatischer Stoffe (Holzessig und anderer) auf bösartige Wunden und Geschwüre die schönsten und interessantesten Beobachtungen gemacht. In diesen Krankheitserscheinungen gehen zwei Actionen neben einander vor sich, eine Metamorphose, welche unter dem Einfluß der Lebensthätigkeit sich zu vollenden strebt, und eine zweite, welche unabhängig von ihr ist. Die letztere ist ein chemischer Proceß, welcher durch empyreumatische Substanzen gänzlich unterdrückt und aufgehoben wird; es ist der reine Gegensatz von der schädlichen Einwirkung, welche faulendes Blut, auf frische Wunden gelegt, in dem Organismus hervorbringt.

II.

14. Den nächsten Ausdruck für die Zusammensetzung des Proteins oder die relativen Verhältnisse der organischen Bestandtheile des Bluts, so wie sie durch die Analyse festgestellt worden sind, giebt die Formel $C_{48} H_{72} N_{12} O_{14}$ *). Al-

*) Ueber die Verwandlung dieser und der folgenden Formeln in Procente siehe Anhang.

bumin, Fibrin, Caſein enthalten Protein; das Caſein enthält Schwefel, keinen Phosphor; Albumin und Fibrin enthalten beide Subſtanzen in chemiſcher Verbindung, das erſtere mehr Schwefel als wie das Fibrin. In welcher Form der Phosphor in dieſen Materien vorhanden iſt, kann direct nicht entſchieden werden, aber man hat beſtimmte Beweiſe dafür, daß der Schwefel nicht im oxydirten Zuſtande darin enthalten ſein kann. Alle dieſe Materien geben nämlich mit einer mäßig ſtarken Kalilauge erhitzt den Schwefel ab, den man in der Flüſſigkeit als Schwefelkalium wiederfindet; mit einer Säure verſetzt entwickelt er ſich daraus als Schwefelwaſſerſtoff. Löſ't man reines Fibrin oder gewöhnliches Eiweiß in ſchwacher Kalilauge auf, ſetzt eſſigſaures Bleioxyd mit der Vorſicht hinzu, daß alles Bleioxyd in der alkaliſchen Lauge gelöſ't bleibt, und erhitzt nun zum Sieden, ſo wird die Flüſſigkeit ſchwarz wie Dinte und es ſchlägt ſich Schwefelblei als feines Pulver nieder.

Es iſt außerordentlich wahrſcheinlich, daß durch die Einwirkung des Alkali's der Schwefel als Schwefelwaſſerſtoff, der Phosphor als Phosphorſäure hinweggenommen wird. Da nun in dieſem Falle Schwefel und Phosphor auf der einen Seite, Waſſerſtoff und Sauerſtoff auf der andern austreten, ſo ſollte man denken, daß Fibrin und Albumin mit ihrem Schwefel und Phosphor mehr Waſſerſtoff und Sauerſtoff in der Analyſe geben müßten, als das Protein. Allein dies läßt ſich thatſächlich durch die Analyſe nicht darthun. Man hat z. B. in dem Fibrin 0,36 pCt. Schwefel gefun-

den. Angenommen nun, der Schwefel trete mit Wasserstoff aus, so würde das Protein 0,0225 pCt. Wasserstoff weniger enthalten, wie das Fibrin, anstatt den mittleren Gehalt von 7,062 pCt. Wasserstoff würde man im Protein also 7,04 pCt. bekommen müssen. In einer ähnlichen Weise würde durch das Austreten vom Sauerstoff mit dem Phosphor der Sauerstoffgehalt des Fibrins von 22,715 pCt. oder 22,00 auf 22,5 oder 21,8 pCt. in dem Protein zurückgeführt werden. Die Fehlergrenzen unserer Analysen sind aber im Durchschnitt größer als ein Zehntel Procent in der Wasserstoffbestimmung, und über $^{1}/_{10}$ pCt. in der Sauerstoffbestimmung; in den angegebenen Fällen würde der Unterschied in dem Wasserstoffgehalte nur $^{1}/_{48}$ pCt. betragen.

Wenn man zuletzt bedenkt, daß das Austreten von Sauerstoff und Wasserstoff mit dem Phosphor und Schwefel ein Hinzutreten der Bestandtheile des Wassers nicht ausschließt, wenn wir annehmen, daß mit den organischen Bestandtheilen des Albumins und Fibrins eine gewisse Menge Wasser in Verbindung tritt, um Protein zu bilden, so hört alle Wahrscheinlichkeit völlig auf, durch die chemische Analyse darüber zu einer bestimmten Ansicht zu gelangen.

Man hat von der Bildung des Schwefelkaliums rückwärts Schlüsse auf das Vorhandensein von nicht oxydirtem Phosphor in dem Fibrin und Albumin gezogen, indem man annahm, daß der Sauerstoff des Kalis dazu gedient habe, um mit dem Phosphor Phosphorsäure zu bilden; allein das Casein, in welchem kein Phosphor zugegen ist, verhält sich

gegen Kali ganz den anderen gleich; es entſteht nämlich Schwefelkalium, deſſen Bildung ohne ein Austreten von Schwefelwaſſerſtoff nicht erklärbar iſt. Beim bloßen Kochen von Fleiſch, bei der Bereitung von Fleiſchbrühe, entwickelt ſich, wie Chevreul gefunden hat, Schwefelwaſſerſtoff.

Zuletzt ſind die Schwefelmengen im Fibrin und Albumin auf dieſelbe Phosphormenge nicht gleich, woraus man keinen andern Schluß ziehen kann, als daß die Bildung des Schwefelkaliums zu dieſem Phosphorgehalt in keiner Beziehung ſteht; es bildet ſich Schwefelkalium aus Caſein, in welchem man keinen freien (als Säure ungebundenen?) Phosphor vorausſetzt und ebenſo aus Albumin, was nur halb ſo viel Phosphor enthält wie das Fibrin.

Eine jede Bemühung, die wahre Anzahl der Atome des Fibrins und Albumins in einer rationellen Formel feſtzuſetzen, in welcher Schwefel und Phosphor zu ganzen Atomzahlen aufgenommen ſind, wird immer unfruchtbar bleiben, weil uns ſchlechterdings alle Mittel fehlen, um mit abſoluter Genauigkeit die ſo äußerſt geringen Mengen von Schwefel und Phosphor in den Thierſubſtanzen beſtimmen zu können, und eine Abweichung, welche kleiner iſt als die gewöhnlichen Grenzen der Beobachtungsfehler, um 10 und mehr Atome, die Anzahl der Atome des Kohlenſtoffs, Waſſerſtoffs und Sauerſtoffs in der Formel ändert.

Man muß ſich in dieſer Hinſicht über das, was die chemiſche Analyſe zu leiſten vermögend iſt, keiner Täuſchung hingeben, mit Gewißheit wiſſen wir, daß die Zahlenver-

hältnisse der Analysen vom Fibrin und Albumin nicht von einander abweichen, und wir erschließen hieraus die gleiche Zusammensetzung. Dieser Schluß verliert von seiner Wahrheit nichts, obwohl wir die Anzahl der Atome ihrer Elemente nicht kennen, welche zu dem zusammengesetzten Atome sich vereinigt haben.

15. Eine Formel für Protein ist für uns nichts weiter wie der genaueste und nächste Ausdruck der Analyse, einer Erfahrung, über die wir alle Zweifel als beseitigt betrachten. Dies allein hat vorläufig Werth für uns.

Wenn wir uns nun denken, daß aus dem Albumin und Fibrin im Blute alle andern Gebilde entsprungen sind, so ist vollkommen sicher, daß dies nur auf zwei Weisen geschehen kann. Es sind nämlich entweder gewisse Elemente hinzu-, oder es sind von ihren Bestandtheilen gewisse Mengen ausgetreten.

Suchen wir nun z. B. für die Zellen und leimgebenden Gebilde, Sehnen, Haare, Horn und die übrigen, einen analytischen Ausdruck auf, in welchem die Anzahl der Atome des Kohlenstoffs als eine unveränderliche Größe festgesetzt wird, so giebt sich auf den ersten Blick zu erkennen, in welcher Art und Weise sich das Verhältniß der andern Elemente geändert hat; dies umfaßt aber alles, was die Physiologie bedarf, um Einsicht in das Wesen des Bildungs- und Ernährungsprocesses im Thierkörper zu erlangen.

16. Aus den Untersuchungen von Mulder und Scherer [28]) ergeben sich folgende empirische Formeln:

Beſtandtheile der organiſchen Gebilde.

Albumin . . . . . $C_{48}\ N_{12}\ H_{72}\ O_{14} + P + S$ *)
Fibrin . . . . . $C_{48}\ N_{12}\ H_{72}\ O_{14} + P + 2\ S$
Caſein . . . . . $C_{48}\ N_{12}\ H_{72}\ O_{14} + S$
Leimgebilde, Sehnen $C_{48}\ N_{15}\ H_{82}\ O_{18}$
Chondrin ꝛc. . . . . $C_{48}\ N_{12}\ H_{80}\ O_{20}$
Arterienhaut . . . . . $C_{48}\ N_{12}\ H_{76}\ O_{16}$
Haare, Horn . . . . $C_{48}\ N_{14}\ H_{78}\ O_{15}$.

Die Vergleichung dieſer Formeln zeigt, daß bei dem Uebergang des Proteins in Chondrin (Subſtanz der Rippenknorpeln) die Beſtandtheile von Waſſer und Sauerſtoff, bei der Bildung der ſeröſen Membranen, Zellen und Sehnen außer dieſen Elementen noch Stickſtoff hinzugetreten iſt.

Bezeichnen wir die Formel des Proteins $C_{48}\ N_{12}\ H_{72}\ O_{14}$ mit Pr, ſo ſind Stickſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff, in der Form von bekannten Verbindungen geordnet, bei der Bildung der Leimſubſtanzen, Haare, Horn, Arterienhaut hinzugetreten.

	Protein.	Ammoniak.	Waſſer.	Sauerſtoff.
Fibrin, Albumin	Pr			
Arterienhaut	Pr		$+ 2H_2O$	
Chondrin	Pr		$+ 4H_2O$	$+ 2\ O$
Haare, Horn	Pr $+$	$N_2\ H_6$		$+ 3\ O$
Membranen, Zellen	$2\ Pr +$	$3\ N_2\ H_6 +$	$H_2O +$	$7\ O.$

*) Die hier als P und S angeführten Phosphor- und Schwefelmengen

17. Aus dieser Uebersicht geht hervor, daß alle Gebilde des Thierkörpers auf eine gleiche Anzahl von Kohlenstoff atomen mehr Sauerstoff enthalten als die Bestandtheile des Bluts; bei ihrer Entstehung ist ohne Zweifel Sauerstoff aus der Atmosphäre oder durch die Elemente des Wassers zu den Bestandtheilen des Proteins hinzugetreten; wir finden in den Haaren und Membranen mehr Stickstoff und Wasserstoff, und zwar beide im Verhältniß wie im Ammoniak.

Die Chemiker sind bekanntlich heute noch nicht einig über die Art und Weise, wie die Bestandtheile des schwefelsauren Kali's geordnet sind, es wäre deshalb dem Chemismus zu viel eingeräumt, wenn man die Arterienhaut für ein Hydrat, das Chondrin für das Oxyd des Proteinhydrats, wenn wir Haare und Membranen für Oxyde des Proteins in Verbindung mit Ammoniak ansehen wollten.

Diese Formeln drücken mit Bestimmtheit die Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Hauptbestandtheile der Thiere aus, sie zeigen, daß auf einen gleichen Kohlenstoffgehalt das relative Verhältniß ihrer Elemente abweicht, wieviel der eine Stoff mehr Sauerstoff oder Stickstoff enthält wie der andere.

18. Es kann daraus gefolgert werden, wie sie aus den Bestandtheilen des Bluts entstehen; aber die Erklärung ihrer Entstehung nimmt zwei Formen an, von denen zu entscheiden ist, welche der Wahrheit am nächsten kommt.

---

drücken nicht Atomgewichte aus, sondern bezeichnen nur die relativen durch die Analyse gefundenen Verhältnisse.

Auf einen gleichen Kohlenſtoffgehalt enthalten die Membranen und die leimgebenden Gebilde mehr Stickſtoff, Sauerſtoff und Waſſerſtoff wie das Protein; es iſt denkbar, daß ſie aus Albumin entſtanden ſind durch Hinzutreten von Sauerſtoff, der Beſtandtheile des Waſſers und des Ammoniaks und durch Austreten von Phosphor und Schwefel; jedenfalls iſt ihre Zuſammenſetzung von der der Hauptbeſtandtheile des Bluts durchaus verſchieden.

Das Verhalten der Leimgebilde gegen ätzende Alkalien zeigt mit Beſtimmtheit, daß ſie kein Protein mehr enthalten, auf keine Weiſe kann Protein daraus erhalten werden, alle durch die Einwirkung des Alkali's erzeugten Producte weichen von den Producten, welche die Protein-Verbindungen unter den nämlichen Bedingungen liefern, durchaus ab; mag fertig gebildetes Protein in dem Fibrin, Caſein und Albumin enthalten ſein oder nicht, gewiß iſt, daß ſich ihre Elemente durch die Einwirkung des Alkali's zu Protein ordnen; dieſe Fähigkeit geht den Elementen der Leimſubſtanz ab.

Zur zweiten Form der Bildung der Leimſubſtanz und zwar zur wahrſcheinlicheren gelangt man, wenn ſeine Bildung abhängig gedacht wird von einem Austreten von Kohlenſtoff.

Angenommen, der Stickſtoffgehalt des Proteins bleibe in der Leimſubſtanz, ſo würde die Zuſammenſetzung der letztern (auf 12 At. Stickſtoff berechnet) durch die Formel $C_{38} N_{12} H_{64} O_{14}$ ausgedrückt werden müſſen. Dieſe Formel ſtimmt am nächſten mit der Analyſe von Scherer, wiewohl ſie kein ge-

nauer Ausdruck dafür ist. Eine den Analysen entsprechendere Formel ist $C_{32} H_{54} N_{10} O_{12}$ oder, nach Mulder's Analyse berechnet, die Formel $C_{54} H_{84} N_{18} O_{20}$ *).

Nach der ersten Formel wäre Kohlenstoff und Wasserstoff, nach den beiden andern wäre ein gewisses Verhältniß aller Elemente ausgetreten.

19. Als das für uns wichtigste Resultat in der Betrachtung der Zusammensetzung der Leimsubstanz muß als eine unleugbare Wahrheit angenommen werden, daß sie, obwohl aus Protein-Verbindungen entstanden, aus der Reihe der Protein-Verbindungen herausgetreten ist. Ihr chemisches Verhalten und ihre Zusammensetzung rechtfertigt diesen Schluß.

Keine Beobachtung steht dem Erfahrungsgesetz entgegen, wonach die Natur ausschließlich nur Protein-Verbindungen zur Blutbildung bestimmt. In den Vegetabilien existirt kein der Leimsubstanz ähnlicher Körper, sie ist keine Protein-Verbindung, sie enthält keinen Phosphor, keinen Schwefel, sie enthält mehr Stickstoff oder weniger Kohlenstoff wie das Protein. Durch die Lebensthätigkeit der zur Blutbildung bestimmten Organe nehmen die Protein-Verbindungen eine neue Form an, aber in ihrer Zusammensetzung erleiden sie keine Veränderung; diese Organe besitzen, soweit unsere Erfahrungen reichen, das Vermögen nicht, Protein-Verbindungen kraft einer einwirkenden Thätigkeit zu erzeugen

*) Die Formel, welche Mulder angenommen hat, $C_{52} H_{80} N_{16} O_{20}$ giebt in der berechneten procentischen Zusammensetzung zu wenig Stickstoff.

aus Stoffen, die kein Protein enthalten. Thiere mit Leimsubstanz, mit dem stickstoffreichsten Bestandtheil der Nahrung der Carnivoren ausschließlich ernährt, starben den Hungerstod; die Leimsubstanzen sind unfähig zu Blut zu werden.

Aber es unterliegt keinem Zweifel, sie wird aus den Bestandtheilen des Bluts erzeugt und kaum läßt sich die Vorstellung zurückweisen, daß das Fibrin des venösen Bluts, indem es zu arteriösem Fibrin wird, sich auf der ersten Stufe der Umbildung zur Leimsubstanz befindet. Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann man kaum den Membranen und Sehnen die Fähigkeit zuschreiben, sich selbst aus Stoffen zu bilden, die ihnen durch das Blut zugeführt werden; wie könnte in der That ein Stoff zur Zelle werden, kraft einer einwirkenden Thätigkeit, welche noch keinen Träger hat; eine schon bestehende Zelle mag die Fähigkeit besitzen, sich zu erhalten oder zu vervielfältigen, allein zu beidem gehören Stoffe, welche identisch in ihrer Zusammensetzung mit der Substanz der Zellen sind. Diese Stoffe werden in dem Organismus erzeugt, und keiner kann sich mehr zu ihrer Bildung eignen als die Zellen und Membranen selbst, die in dem Magen des Thiers in dem Proceß der Verdauung löslich geworden sind, oder welche der Mensch im löslichen Zustande genießt.

20. Ich gebe in dem Folgenden einen Versuch zur analytischen Entwicklung der in dem thierischen Körper vorgehenden Haupt-Metamorphosen, und zwar, um allen und jeden Mißverständnissen vorzubeugen, mit der ausdrücklichen Verwah-

rung gegen alle Schlüsse und Folgerungen, die man jetzt oder zu irgend einer Zeit gegen die Ansichten daraus ziehen könnte, welche ich in dem Vorhergehenden, mit dem sie in keinerlei Verbindung stehen, entwickelt habe. Die Resultate, zu denen ich gelangt bin, befremden mich nicht minder und flößten mir die nämlichen Zweifel ein, die sie in Andern erwecken werden, allein sie sind keine Schöpfungen der Phantasie, und ich gebe sie, weil ich die Ueberzeugung hege, daß der Weg, der zu ihrer Ermittelung geführt hat, der einzige ist, auf welchem wir hoffen können, Einsicht in die organischen Processe zu erlangen.

Alle die zahllosen qualitativen Untersuchungen thierischer Substanzen sind absolut werthlos für die Physiologie sowohl, wie für die Chemie, so lange ihnen nicht ein ganz bestimmter Zweck, eine deutlich ausgedrückte Frage unterlegt wird.

Wenn wir in einem Satze, den wir entziffern wollen, die Buchstaben auseinander nehmen und in eine Reihe stellen, so sind wir dem Sinne um keinen Schritt näher gekommen. Um ein Räthsel zu lösen, müssen wir völlig klar über die Aufgabe sein. Es giebt freilich viele Wege, um die höchste Kuppe eines Berges zu erklimmen, allein nur diejenigen haben Hoffnung, dem Ziele sich zu nähern, welche die Spitze im Auge behalten. Mit aller Arbeit und Anstrengung in einem Sumpfe erreicht man nichts weiter, als daß man sich immer mehr mit Schlamm und Koth beladet, das Höhersteigen wird durch selbstgeschaffene Schwierigkeiten

immer mühevoller und auch die größte Kraft muß zuletzt unter dieſem Unrath erliegen.

21. Wenn es wahr iſt, daß aus dem Blute oder den Beſtandtheilen des Bluts alle Theile des Thierkörpers entwickelt und gebildet werden, daß die vorhandenen Organe in jedem Zeitmomente des Lebens ſich durch den Einfluß des zugeführten Sauerſtoffs in neue Verbindungen umſetzen, ſo müſſen die Secrete des Thierkörpers nothwendig die Producte der umgeſetzten Gebilde enthalten.

22. Wenn der Schluß ferner wahr iſt, daß der Harn die ſtickſtoffhaltigen und die Galle die kohlenſtoffreichen Producte aller Gebilde enthält, die in dem Lebensproceß ſich in anorganiſche Verbindungen umgeſetzt haben, ſo iſt klar, daß die Beſtandtheile der Galle und des Harns zuſammengenommen gleich ſein müſſen, in ihrem relativen Verhältniſſe, der Zuſammenſetzung des Bluts.

23. Aus dem Blute ſind die Organe entſtanden, die Organe enthalten die Beſtandtheile des Bluts; ſie haben ſich in neue Verbindungen umgeſetzt, zu dieſen neuen Verbindungen iſt außer Sauerſtoff und Waſſer kein anderer Körper hinzugekommen, das relative Verhältniß ihres Kohlenſtoffs und Stickſtoffs muß gleich ſein dem relativen Verhältniß des Kohlenſtoffs und Stickſtoffs im Blute.

Wenn wir alſo von der Zuſammenſetzung des Bluts die Beſtandtheile des Harns abziehen, ſo müſſen wir, den hinzugekommenen Sauerſtoff und das Waſſer abgerechnet, die Zuſammenſetzung der Galle bekommen.

Oder wenn wir von den Beſtandtheilen des Bluts abziehen die Beſtandtheile der Galle, ſo müſſen wir harnſaures Ammoniak oder Harnſtoff und Kohlenſäure übrig behalten.

Man wird es vielleicht bemerkenswerth finden, daß dieſe Betrachtungsweiſe auf die wahre Formel der Galle, oder richtiger, auf den empiriſchen Ausdruck für ihre Zuſammenſetzung geführt hat, auf den Schlüſſel zur Erklärung ihrer Metamorphoſen durch Säuren und Alkalien, den man bis jetzt ohne Erfolg zu ſuchen bemüht war.

24. Wenn man friſches Blut über eine 60° heiße Silberplatte fließen läßt, ſo trocknet es zu einem rothen firnißartigen Ueberzug ein, der ſich leicht pulveriſiren läßt; anfänglich in gelinder Wärme, zuletzt bei 100°, trocknet friſches fettfreies Muskelfleiſch zu einer braunen pulveriſirbaren Maſſe ein.

Die Analyſen von Playfair und Boeckmann [29]) führen als den nächſten Ausdruck der erhaltenen Gewichtsverhältniſſe ihrer Elemente für das Muskelfleiſch (Fibrin, Albumin, Zellen und Nerven) und für das Blut zu einer und derſelben empiriſchen Formel, ſie iſt:

$C_{43}\ N_{12}\ H_{78}\ O_{15}$ (empiriſche Formel des Bluts).

25. Der Hauptbeſtandtheil der Galle iſt nach den Unterſuchungen von Demarçay eine den Seifen ähnliche Verbindung von Natron mit einer eigenthümlichen Materie, welche den Namen Choleinſäure erhalten hat; ſie wird in Verbindung mit Bleioxyd gefällt, wenn man eine durch Alkohol von allen darin unlöslichen Stoffen befreite Galle, mit eſſigſaurem Bleioxyd vermiſcht.

Diese Choleinsäure wird durch Salzsäure zerlegt in Taurin, Salmiak und in eine neue stickstofffreie Säure, in Choloidinsäure.

Durch Kochen mit ätzendem Kali zerfällt sie in Kohlensäure, Ammoniak und in Cholinsäure (verschieden von Gmelin's Cholsäure).

Es ist nun klar, daß die wahre Formel der Choleinsäure den analytischen Ausdruck für diese Zersetzungsweisen in sich schließen, daß sie erlauben muß, die Zusammensetzung der entstandenen Producte in eine ganz bestimmte und einfache Beziehung zu der Zusammensetzung der Choleinsäure zu bringen. Dieser Ausdruck verliert an seiner Wahrheit nichts, wenn sich auch ergeben sollte, daß die Choleinsäure und Choloidinsäure, wie aus den Untersuchungen von Berzelius hervorzugehen scheint, Gemenge von mehreren verschiedenartigen Verbindungen sind, die relative Anzahl der Atome kann hierdurch in keiner Weise geändert werden.

26. Zur Entwickelung der Metamorphosen, welche die Choleinsäure durch Säuren und Alkalien erleidet, kann als empirischer Ausdruck ihrer Zusammensetzung nur die folgende Formel angenommen werden:

Formel der Choleinsäure: $C_{76} H_{132} N_4 O_{30}$).

Ich wiederhole es, diese Formel kann der Ausdruck sein für die Zusammensetzung von zwei oder mehreren Verbindungen, gleichgültig, wie viel es auch sein mögen, sie enthält die relative Anzahl aller ihrer Elemente zusammengenommen.

Nehmen wir von den Elementen der Choleinsäure die

durch Einwirkung der Salzsäure entstehenden Producte, Ammoniak und Taurin, hinweg, so gelangen wir zur empirischen Formel der Choloidinsäure.

Formel der Choleinsäure				C_{76}	H_{152} N_4 O_{22}
ab					
1 At. Taurin	C_4	H_{14}	N_2 O_{10}	—	C_4 H_{20} N_4 O_{10}
1 Aeq. Ammoniak	H_6	N_2			
Bleibt die Formel der Choloidinsäure				C_{72}	H_{112} O_{12} [31]).

27. Werden ferner von den Elementen der Choleinsäure die Bestandtheile von Harnstoff und 2 At. Wasser (2 At. Kohlensäure und 2 Aeq. Ammoniak) hinweggenommen, so haben wir die Formel und Zusammensetzung der Cholinsäure.

Formel der Choleinsäure				C_{76}	H_{152} N_4 O_{22}
ab					
2 At. Kohlensäure	C_2		O_4	—	C_2 H_{12} N_4 O_4
2 Aeq. Ammoniak	N_4	H_{12}			
Formel der Cholinsäure				C_{74}	H_{120} O_{18} [32]).

Wenn man die so große Uebereinstimmung der Zahlenresultate der Analysen [30]) [31]) [32]) mit den obigen Formeln ins Auge faßt, so wird man kaum zweifeln können, daß die aufgefundene Formel der Choleinsäure so nahe, wie man bei Analysen dieser Art Substanzen nur erwarten kann, die relative Anzahl der Atome ihrer Elemente ausdrückt, gleichgültig, in wieviel verschiedenen Formen sie auch darin vereinigt sein mögen.

28. Addiren wir nun die Hälfte der Zahlen, welche die relativen Verhältnisse der Elemente der Choleinsäure ausdrücken, zu den Bestandtheilen des Harns der Schlangen, zu den Elementen des neutralen harnsauren Ammoniaks, so erhalten wir:

Formel der Choleinsäure . . . . . $C_{38}\ H_{66}\ N_2\ O_{11}$

hierzu

$$\left.\begin{array}{ll} 1 \text{ Aeq. Harnsäure} & C_{10}\ H_8\ N_8\ O_6 \\ 1 \text{ » Ammoniak} & H_6\ N_2 \end{array}\right\} = C_{10}\ H_{14}\ N_{10}\ O_5$$

in Summa $C_{48}\ H_{80}\ N_{12}\ O_{17}$.

29. Diese Formel drückt aber aus die Zusammensetzung des Bluts, zu welchem die Elemente von 1 At. Wasser und 1 At. Sauerstoff getreten sind.

Formel des Bluts . . . . . $C_{48}\ H_{78}\ N_{12}\ O_{15}$.

hierzu

$$\left.\begin{array}{ll} 1 \text{ At. Wasser} & H_2\ O \\ 1 \text{ » Sauerstoff} & O \end{array}\right\} \quad H_2 \quad O_2$$

in Summa $C_{48}\ H_{80}\ N_{12}\ O_{17}$.

30. Wenn wir ferner zu den Elementen des Proteins die Elemente treten lassen von 3 At. Wasser, so haben wir, bis auf 2 At. Wasserstoff, genau die Elemente der Choleinsäure und des harnsauren Ammoniaks.

$$\begin{array}{lll} 1 \text{ At. Protein} & C_{48}\ H_{72}\ N_{12}\ O_{14} \\ 3 \text{ » Wasser} & H_6 \quad O_3 \\ \hline & C_{48}\ H_{78}\ N_{12}\ O_{17}. \end{array}$$

31. Betrachten wir also die Choleinsäure und das harnsaure Ammoniak als die Producte der Umsetzung der Muskelfaser, indem es keine andern Gebilde im Thierkörper giebt, welche Protein enthalten (Albumin geht in Gebilde über, ohne daß man sagen kann, daß es im Lebensproceß direct eine Umsetzung in Harnsäure und Choleinsäure erfährt), so haben wir darin mit Zuziehung der Bestandtheile des Wassers alle zu der Metamorphose nöthigen Elemente; bis auf den Schwefel und Phosphor, die sich beide oxydirt haben mögen, ist kein anderes Element ausgetreten.

Diese Art der Metamorphose bezieht sich auf die Umsetzung in den niedrigen Thierklassen der Amphibien und vielleicht der Würmer und Insecten. In den höhern Thierklassen verschwindet in dem Harn die Harnsäure, an ihrer Stelle finden wir Harnstoff.

Das Verschwinden der Harnsäure und die Erzeugung von Harnstoff steht offenbar in sehr enger Beziehung zu dem durch den Respirationsproceß aufgenommenen Sauerstoff und zu der Menge von Wasser, welche verschiedene Thiere in einer gegebenen Zeit genießen.

Wenn wir der Harnsäure Sauerstoff zuführen, so zerlegt sie sich, wie man weiß, zuerst in Alloxan [53]) und Harnstoff, eine neue Quantität Sauerstoff dem Alloxan zugeführt, macht, daß es entweder in Oxalsäure und Harnstoff, Oxalursäure und Parabansäure [54]) oder in Kohlensäure und Harnstoff zerfällt.

32. Wir finden in den sogenannten Maulbeersteinen oxal-

ſauren Kalk, in den andern Harnſteinen harnſaures Ammoniak und zwar ſtets bei Perſonen, in denen durch Mangel an Bewegung und Anſtrengung, oder durch andere Urſachen die Sauerſtoffzuführung gemindert iſt. Nie finden ſich Harnſteine, welche Harnſäure oder Oxalſäure enthalten, bei Schwindſüchtigen (ſiehe S. 24); und es iſt eine gewöhnliche Erfahrung in Frankreich bei Perſonen, welche an Steinbeſchwerden leiden, ſobald ſie ſich auf das Land begeben, wo ſie ſich mehr Bewegung machen, daß die in der Blaſe während ihres Aufenthaltes in der Stadt ſich abſetzenden harnſauren Verbindungen (durch die vergrößerte Sauerſtoffaufnahme) in oxalſaure Salze (in Maulbeerſteine) übergehen; bei noch mehr Sauerſtoff würde ſich wie bei geſunden Menſchen nur das letzte Oxydationsprodukt des Kohlenſtoffs, nämlich nur Kohlenſäure, haben bilden können.

Die falſche Interpretation der unleugbaren Beobachtungen, daß durch die Nieren alle von dem Organismus nicht verwendbaren Subſtanzen verändert oder unverändert abgeſchieden und in dem Harn ausgeleert werden, hat die praktiſche Medizin zu der Anſicht geführt, daß die Nahrung und namentlich ſtickſtoffhaltige Nahrungsſtoffe einen directen Einfluß haben können auf die Erzeugung der Harnſteine. Es giebt keine Gründe, dieſe Meinung zu ſtützen, es giebt unzählige, die ſie widerlegen. Möglich iſt es, daß in den Speiſen eine Menge durch die Kochkunſt umgewandelter Stoffe genoſſen werden, welche, als für Blutbildung nicht mehr tauglich, durch den Reſpirationsproceß mehr oder weniger verändert, aus dem

Harn ausgestoßen werden, allein Braten und Kochen ändern in keiner Weise die Zusammensetzung der Fleischspeisen [85]).

Das gekochte und gebratene Fleisch wird zu Blut, die Harnsäure und der Harnstoff stammen von den umgesetzten Gebilden. Die Menge dieser Produkte steigt mit der Schnelligkeit der Umsetzung in der gegebenen Zeit, sie steht in keiner Beziehung zu der in dem nämlichen Zeitraume genossenen Nahrung. Bei einem Hungernden, welcher sich einer starken und anhaltenden Bewegung hingeben muß, wird mehr Harnstoff secernirt, als bei dem wohlgenährtesten Menschen im Zustande der Ruhe; in Fiebern bei rascher Abmagerung ist der Harn harnstoffreicher als im Zustande der Gesundheit (Prout).

33. Aehnlich also wie die in dem Urin des ruhenden Pferdes vorhandene Hippursäure in benzoesaures Ammoniak und Kohlensäure verwandelt wird, sobald es sich in Arbeit und Bewegung befindet, verschwindet die Harnsäure in dem Harn des Menschen, der durch Haut und Lunge eine zur Oxydation der Produkte der umgesetzten Gebilde hinreichende Menge Sauerstoff in sich aufnimmt; der Genuß von Wein und Fett, die in dem Organismus nur insofern sich weiter verändern als sie Sauerstoff aufnehmen, hat einen entschiedenen Einfluß auf die Bildung von Harnsäure. Nach dem Genuß von fetten Speisen ist der Harn trübe und setzt beim Erkalten kleine Krystalle von Harnsäure ab (Prout). Dasselbe beobachtet man nach dem Genuß von Weinen (nie bei

Rheinweinen), in denen das zur Löslicherhaltung der Harnsäure nothwendige Alkali fehlt.

Bei Thieren, welche größere Mengen Wasser genießen, wodurch die schwerlösliche Harnsäure in Auflösung erhalten wird, so daß der eingeathmete Sauerstoff darauf wirken kann, finden wir im Harn keine Harnsäure, sondern Harnstoff. Bei Vögeln ist als Secretionsproduct die Harnsäure vorherrschend.

Wenn wir zu 1 Atom Harnsäure 6 Atome Sauerstoff und 4 Atome Wasser hinzutreten lassen, so zerlegt sie sich in Harnstoff und Kohlensäure

1 At. Harnsäure	$C_{10} N_8 H_8 O_6$	2 At. Harnstoff	$C_4 N_8 H_{16} O_4$
4 » Wasser	$H_8 O_{10}$	6 » Kohlensäure	$C_6 O_{12}$
6 » Sauerstoff			
	$C_{10} N_8 H_{16} O_{16}$		$C_{10} N_8 H_{16} O_{16}$

34. Der Harn der Gras fressenden Thiere enthält keine Harnsäure, wohl aber Ammoniak, Harnstoff und Hippursäure, oder Benzoesäure. Bei einem Hinzutreten von 9 Atomen Sauerstoff zu der empirischen Formel ihres Blutes, fünf mal genommen, haben wir darin die Elemente von 6 Atomen Hippursäure, 9 At. Harnstoff, 3 At. Choleinsäure, 3 At. Wasser und 3 At. Ammoniak; oder wenn wir uns denken, daß während der Metamorphose dieses Blutes 45 Atome Sauerstoff hinzutreten, so haben wir 6 At. Benzoesäure, 13½ At. Harnstoff, 3 At. Choleinsäure, 15 At. Kohlensäure und 12 At. Wasser.

$$5\,(C_{48}\,N_{12}\,H_{78}\,O_{15}) + 9\,O = C_{240}\,N_{60}\,H_{390}\,O_{84} =$$

$$=\begin{cases} 6 \text{ At. Hippursäure } 6\,(C_{18}\,N_2\,H_{16}\,O_5) = C_{108}\,N_{12}\,H_{96}\,O_{30} \\ 9 \text{ » Harnstoff } 9\,(C_2\,N_4\,H_8\,O_2) = C_{18}\,N_{36}\,H_{72}\,O_{18} \\ 3 \text{ » Choleinsäure } 3\,(C_{38}\,N_2\,H_{66}\,O_{11}) = C_{114}\,N_6\,H_{198}\,O_{33} \\ 3 \text{ » Ammoniak } 3\,(N_2\,H_6) = N_6\,H_{18} \\ 3 \text{ » Wasser } 3\,(H_2\,O) = H_6\,O_3 \end{cases}$$

$$C_{240}\,N_{60}\,H_{390}\,O_{84}$$

oder

$$5\,(C_{48}\,N_{12}\,H_{78}\,O_{15}) + O_{45} = C_{240}\,N_{60}\,H_{390}\,O_{120} =$$

$$=\begin{cases} 6 \text{ At. Benzoesäure } 6\,(C_{14}\,H_{10}\,O_3) = C_{84}\,H_{60}\,O_{18} \\ 27/2 \text{ » Harnstoff } 27\,(C\,N_2\,H_4\,O) = C_{27}\,N_{54}\,H_{108}\,O_{27} \\ 3 \text{ » Choleinsäure } 3\,(C_{38}\,N_2\,H_{66}\,O_{11}) = C_{114}\,N_6\,H_{198}\,O_{33} \\ 15 \text{ » Kohlensäure } 15\,(C\,O_2) = C_{15}\,O_{30} \\ 12 \text{ » Wasser } 12\,(H_2\,O) = H_{24}\,O_{12} \end{cases}$$

Summa $C_{240}\,N_{60}\,H_{390}\,O_{120}$

35. Verfolgen wir zuletzt die Metamorphose der Gebilde in dem Foetus der Kuh und betrachten wir das im Blute der Mutter zugeführte Protein als den Stoff, welcher eine Umsetzung erleidet oder erlitten hat, so ergiebt sich, daß 2 At. Protein ohne Hinzutreten von Sauerstoff oder einer fremden Substanz die Elemente enthalten von 3 At. Allantoin, 4 At. Wasser und 1 At Choloidinsäure, (Kindspech, Meconium??).

$$2 \text{ At. Protein} = 2\,(C_{48}\,N_{12}\,H_{72}\,O_{14}) + 2 \text{ At. Wasser} = C_{96}\,N_{24}\,H_{148}\,O_{30} =$$

$$=\begin{cases} 3 \text{ At. Allantoin } 3\,(C_8\,N_8\,H_{12}\,O_6) = C_{24}\,N_{24}\,H_{36}\,O_{18} \\ 1 \text{ » Choloidinsäure } C_{72}\,H_{112}\,O_{12} \end{cases}$$

$$C_{96}\,N_{24}\,H_{148}\,O_{30}$$

36. Die Elemente von drei Atomen Allantoin, die in obiger Formel aufgeführt ſind, entſprechen aber genau der Anzahl der Elemente von 2 At. Harnſäure, 2 At. Harnſtoff und 2 Atomen Waſſer.

$$3 \text{ At. Allantoin} = C_{24}N_{24}H_{36}O_{18} = \begin{cases} 2 \text{ At. Harnſäure } C_{20}N_{16}H_{16}O_{12} \\ 2 \text{ » Harnſtoff } C_4 N_8 H_{16} O_4 \\ 2 \text{ » Waſſer } H_4 O_2 \end{cases}$$

$$C_{24}N_{24}H_{36}O_{18}$$

Die Beziehungen des Allantoins, in dem Harn des Foetus der Kuh, zu den ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheilen des Harns bei athmenden Thieren ſind, wie aus der Nebeneinanderſtellung beider Formeln hervorgeht, unverkennbar. In dem Allantoin befinden ſich die Elemente der Harnſäure und des Harnſtoffs, das heißt der ſtickſtoffhaltigen Umſetzungsproducte der Proteinverbindungen.

37. Wenn wir ferner zu der Formel des Proteins, dreimal genommen, hinzutreten laſſen die Elemente von 4 Atomen Waſſer und von der ganzen Anzahl aller Beſtandtheile die Hälfte der Elemente der Cholvidinſäure hinwegnehmen, ſo bleibt eine Formel, welche außerordentlich nahe die Zuſammenſetzung des Leims ausdrückt.

$$3\,(C_{48}\,N_{12}\,H_{72}\,O_{14}) + 4\,H_2O = C_{144}\,N_{36}\,H_{224}\,O_{46} =$$

ab ½ At. Cholvidinſäure $= C_{36}\quad H_{56}\quad O_6$

bleibt $= C_{108}\,N_{36}\,H_{168}\,O_{40}$

oder $4\,(C_{27}\,N_9\,H_{42}\,O_{10})$ [56]).

38. Nehmen wir von dieser Formel des Leims die Bestandtheile von 2 At. Protein hinweg, so bleiben uns die Elemente des Harnstoffs, der Harnsäure und des Wassers, oder 3 At. Allantoin und 3 At. Wasser.

Formel des Leims nach Mulder					C_{108}	H_{168}	N_{36}	O_{40}	
ab 2 Protein					C_{96}	H_{144}	N_{24}	O_{28}	
bleiben					C_{12}	H_{24}	N_{12}	O_{12}	=
1 At. Harnsäure	C_{10}	H_8	N_8	O_6					
1 » Harnstoff	C_2	H_8	N_4	O_2	=	3 At. Allantoin	C_{12}	H_{18}	N_{12}	O_9
4 » Wasser		H_8		O_4		3 » Wasser		H_3		O_3
	C_{12}	H_{24}	N_{12}	O_{12}			C_{12}	H_{24}	N_{12}	O_{12}

39. Abgesehen von dem größeren Stickstoffgehalt, in welchem diese Zahlenverhältnisse von Mulder's und Scherer's Analysen abweichen, geht aus der gegebenen Auseinandersetzung hervor, daß, wenn wir zu den Elementen von 2 At. Protein hinzutreten lassen die Bestandtheile der stickstoffhaltigen Umsetzungsproducte von einem dritten Atom Protein, von Harnstoff, Harnsäure und Wasser, oder wenn wir von drei Atomen Protein hinwegnehmen die Bestandtheile eines stickstofffreien Körpers, den wir als Zersetzungsproduct der Choleinsäure ebenfalls erhalten können, daß wir in beiden Fällen eine der Zusammensetzung der Leimsubstanz nahe kommende Formel erhalten. Man darf diesen Formeln, wie ich wiederholt in Erinnerung bringe, keinen höheren Werth beilegen als sie verdienen; sie sollen zu weiter nichts als

41. Aus dem Verhalten des Chylus und der Lymphe geht mit Zuverläſſigkeit hervor, daß die löslichen Beſtandtheile der Speiſen oder des Chymus die Form von Albumin erhalten. Das gekochte Eiweiß, der gekochte oder geronnene Faſerſtoff, welche in dem Magen wieder löslich geworden, ihre Gerinnbarkeit an der Luft oder durch die Hitze aber verloren hatten, erhalten dieſe Eigenſchaften nach und nach wieder. In den Chylusgefäßen iſt die ſaure Reaction des Chymus bereits in die ſchwach alkaliſche des Blutes übergegangen, nach ſeinem Durchgange durch die Drüſen des Meſenteriums, in dem Ductus thoracicus angelangt, enthält er in der Hitze gerinnendes Albumin und ſcheidet, ſich ſelbſt überlaſſen, Fibrin ab. Alle Proteinverbindungen, welche beim Durchgange des Chymus durch die Eingeweide aufgeſaugt wurden, werden zu Albumin, welches, wie die Erfahrung beim Bebrüten des Hühnerei's ergiebt, bis auf den Eiſengehalt, der von andern Seiten her geliefert wird, die Grundbeſtandtheile aller übrigen Organe enthält.

Die Frage, was beim Menſchen aus den im Ueberſchuß zugeführten Proteinverbindungen wird, welche Verwandlung die überreichliche ſtickſtoffhaltige Speiſe erfährt, hat die practiſche Medicin längſt entſchieden. Die Blutgefäße zeigen ſich mit Blut, die übrigen mit Säften überfüllt, und wenn die Zufuhr an Speiſen fortdauert und das Blut oder die Säfte, die ſich zur Blutbildung eignen, keine Verwendung finden, wenn die löslichen Materien von den dazu beſtimmten Organen nicht aufgenommen werden, ſo entwickeln

sich in den Eingeweiden, wie bei Fäulnißprocessen, Gase mannigfaltiger Art, die festen Ausleerungen nehmen in Farbe, Geruch u. s. w. eine veränderte Beschaffenheit an, und wenn die Säfte in dem Saug- und Lymphgefäßsystem eine ähnliche Umsetzung erfahren, so ist dies sogleich in der Blutmischung sichtbar, und durch dieses nimmt alsdann der Ernährungsproceß andere Formen an.

42. Keine von allen diesen Erscheinungen dürfte sich zeigen, wenn Nieren und Leber fähig wären, eine Zersetzung der löslich gewordenen, im Ueberschuß zugeführten, Proteinverbindungen in Harnstoff, Harnsäure und Galle zu bewirken. Durch alle Beobachtungen, die man hinsichtlich des Einflusses der stickstoffhaltigen Nahrung auf die Bestandtheile des Harns gemacht hat, ist diese Voraussetzung nicht im entferntesten bewiesen, denn dieser Einfluß ist einer andern und weit einfacheren Interpretation fähig, wenn man mit der Nahrung die Lebensweise und Gewohnheiten der Personen in Betracht zieht, welche zu Gegenständen der Beobachtung gedient haben. Harngries und Harnsteine finden sich bei Personen, welche sehr wenig animalische Kost genießen. Nie sind bis jetzt Harnsäure-haltige Concretionen bei Fleisch-fressenden Säugethieren, welche im freien, wilden Zustande leben, beobachtet worden*), und bei Nationen, welche keine andere Nahrung als Fleischspeisen genießen, sind Ablagerun-

*) Das Vorkommen des harnsauren Ammoniaks in dem Harnstein von einem Hunde, der von Lassaigne untersucht wurde, muß bezweifelt werden, wenn er ihn nicht eigenhändig aus der Blase des Hundes genommen hat.

gen von Harnsäure-haltigen Concretionen an den Gliedern oder in der Harnblase völlig unbekannt.

43. Was in Beziehung auf den Ursprung der Galle, oder richtiger vielleicht, der Choleinsäure bei den Fleisch-fressenden Thieren als eine unleugbare Wahrheit angesehen werden muß, kann in keiner Weise für alle Bestandtheile der Galle gelten, welche von der Leber der Gras- und Körner-fressenden Thiere secernirt werden, denn es ist bei der so großen Menge Galle, die von der Leber eines Ochsen secernirt wird, schlechterdings unmöglich anzunehmen, daß aller Kohlenstoff derselben von der Substanz der umgesetzten Gebilde stammt.

Nehmen wir an, daß die 59 Unzen trockner Galle (von 37 Pfunden secernirter Galle) den nämlichen Stickstoffgehalt enthielten, wie die Choleinsäure (3,86 p. c.), so würden wir darin nahe an 4½ Loth Stickstoff haben, und wenn dieser Stickstoff von der Substanz der umgesetzten Gebilde stammt, so könnte sich im höchsten Fall, wenn aller Kohlenstoff derselben in die Galle übergehen würde, nur eine dem Gewicht von 14⁵⁄₁₀ Loth Kohlenstoff entsprechende Menge Galle bilden, dies ist aber weit unter derjenigen Quantität, welche den Beobachtungen nach, secernirt wird.

44. Es müssen nothwendiger Weise, außer den Protein-Verbindungen, noch Materien anderer Art, an der Bildung der Galle in dem Organismus des Gras- und Körner-fressenden Thieres Antheil nehmen, und diese können nur die stickstofffreien Nahrungsmittel sein.

45. Der Gallenzucker Gmelin's (Picromel, Bilin nach Berzelius), welchen Berzelius als den Hauptbestandtheil der Galle betrachtet, während ihn Demarçay im Wesentlichen für Choleinsäure hält, brennt an der Luft erhitzt wie Harz, liefert ammoniakalische Produkte und giebt, mit Säuren behandelt, Taurin und die Zersetzungsproducte der Choleinsäure, mit Alkalien liefert er Ammoniak und Cholinsäure. Jedenfalls enthält diese Substanz Stickstoff als Bestandtheil, ein weit kleineres Verhältniß von Sauerstoff wie Amylon oder Zucker und eine größere Menge wie die fetten Säuren. Wenn wir in der Metamorphose des Gallenzuckers oder der Choleinsäure durch ätzende Alkalien den Stickstoff austreten machen, so erhalten wir eine krystallisirte, den fetten Säuren außerordentlich ähnliche Säure (Cholinsäure), fähig mit den Basen Salze zu bilden, welche die Haupteigenschaften mit den Seifen gemein haben. Ja wir können sogar diese Hauptbestandtheile der Galle als Verbindungen von fetten Säuren mit organischen Oxyden betrachten, ähnlich den gewöhnlichen Fetten, und nur in sofern von ihnen verschieden, als sich kein Glyceryloxyd darin befindet. Die Choleinsäure z. B. läßt sich betrachten als eine Verbindung von Choloidinsäure mit den Elementen des Allantoins und des Wassers.

Choloidinsäure. Allantoin. Wasser. Choleinsäure.

$$C_{72}\,H_{112}\,O_{12} + C_4\,N_4\,H_3\,O_3 + H_{14}\,O_7 = C_{76}\,N_4\,H_{132}\,O_{22}$$

oder von Cholinsäure, Harnstoff und Wasser:

Cholinſäure. Harnſtoff. Waſſer

$C_{74}\ H_{120}\ O_{18} + C_2\ N_4\ H_8\ O_2 + H_4\ O_2 =$ Choleinſäure.

46. Wenn nun in der That, woran man kaum zweifeln kann, die Beſtandtheile der ſtickſtofffreien Nahrungsmittel an der Bildung der Galle in dem Körper der Gras-freſſenden Thiere Antheil nehmen, ſo ſteht dieſer Anſicht, in der Zuſammenſetzung der Hauptbeſtandtheile der Galle, nach dem gegenwärtigen Zuſtande unſerer Kenntniſſe, kein Hinderniß entgegen.

Wenn das Amylon hierbei die Hauptrolle übernimmt, ſo kann dies in keiner andern Weiſe geſchehen, als daß ſich, ganz ähnlich wie bei ſeinem Uebergang in Fett, von ſeinen Elementen eine gewiſſe Quantität Sauerſtoff trennt, denn es enthält auf die gleiche Anzahl an Kohlenſtoffatomen (auf 72 At.) fünfmal ſo viel Sauerſtoff wie die Choloidinſäure.

Ohne ein Austreten von Sauerſtoff, von den Elementen des Amylon's, iſt hiernach ſein Uebergang in Galle nicht denkbar und, dies vorausgeſetzt, iſt die chemiſche Entwickelung ſeiner Verwandlung in eine zwiſchen ſeiner eignen und der Zuſammenſetzung der fetten Säuren ſtehenden Verbindung keinerlei Schwierigkeit unterworfen.

47. Um dieſe Auseinanderſetzung nicht zu einem müſſigen Spiele mit Formeln zu machen und um den Hauptzweck nicht aus den Augen zu verlieren, führt alſo die Betrachtung des quantitativen Verhältniſſes der in dem Körper der Grasfreſſenden Thiere abgeſonderten Galle zu folgenden Schlüſſen:

Die Hauptbeſtandtheile der Galle der Gras-freſſenden

Thiere enthalten Stickstoff; dieser Stickstoff stammt von Protein-Verbindungen.

Sie enthält eine größere Menge Kohlenstoff als der genossenen stickstoffhaltigen Nahrung, oder der Substanz ihrer Gebilde entspricht, die in ihrem Lebensprocesse eine Veränderung erlitten haben.

Ein Theil dieses Kohlenstoffs muß demnach von den stickstofffreien Nahrungsmitteln geliefert werden und, um in einen stickstoffhaltigen Bestandtheil der Galle überzugehen, müssen sich nothwendig eine gewisse Anzahl ihrer Elemente verbunden haben mit einem stickstoffhaltigen Körper, der aus einer Proteinverbindung entstanden ist.

Für diesen Schluß ist es ganz gleichgültig, ob man annimmt, daß die Protein-Verbindung von der Nahrung oder den Gebilden stammt.

48. Es ist neuerlichst von Ure angegeben worden, daß Benzoesäure innerlich gegeben, in dem Harn als Hippursäure wieder erscheint.

Wenn sich diese Beobachtung bestätigen sollte *), so erlangt sie eine große physiologische Bedeutung, weil sie offenbar beweisen würde, daß der Akt der Umsetzung der Gebilde im Thierkörper, durch gewisse, in den Speisen genossene Mate-

*) Die Analyse der aus dem Harn beim Zusatz von Salzsäure sich abscheidenden Krystalle ist nicht gemacht worden. Ure's Angabe, daß in Salpetersäure aufgelöst'te Hippursäure beim Zusatz von Ammoniak sich röthet, ist übrigens falsch, sie beweis't, daß die von ihm erhaltenen Krystalle Harnsäure enthielten.

rien, eine andere Form in Beziehung auf die neugebildeten Verbindungen annimmt, denn die Hippurſäure enthält die Elemente des milchſauren Harnſtoffs, in deſſen Zuſammenſetzung die Elemente der Benzoeſäure eingetreten ſind.

1 At. Harnſtoff	C_2	N_4	H_8	O_2			
1 » Milchſäure	C_6		H_8	O_4		= 2 At. kryſt. Hippurſäure.	
2 » Benzoeſäure	C_{28}		H_{20}	O_6		= 2 (C_{18} N_2 H_{18} O_6)	
	C_{36}	N_4	H_{36}	O_{12}.			

49. Wenn wir uns den Akt der Umſetzung der Gebilde in dem Körper der Gras-freſſenden Thiere, auf eine ähnliche Weiſe denken, wie bei den Fleiſch-freſſenden, ſo wird ihr Blut, in den letzten Produkten der Umſetzung, von allen Organen zuſammengenommen, Choleinſäure, Harnſäure und Ammoniak (S. 138) liefern müſſen, und wenn wir der Harnſäure eine ähnliche Wirkung zuſchreiben wie der Benzoeſäure in Ure's Beobachtung, daß nämlich durch ihre Gegenwart die weitere Umſetzung eine andere Form annimmt, inſofern ihre Elemente in die neuentſtehenden Produkte mit aufgenommen werden, ſo ergiebt ſich z. B., daß 2 At. Protein, zu welchen die Elemente von 3 At. Harnſäure und zwei Atome Sauerſtoff treten, zur Bildung von Hippurſäure und Harnſtoff Veranlaſſung geben können.

2 At. Protein	2 (C_{48}	N_{12}	H_{72}	O_{14})	=	C_{96}	N_{24}	H_{144}	O_{28}
3 » Harnſäure	3 (C_{10}	N_8	H_8	O_6)	=	C_{30}	N_{24}	H_{24}	O_{18}
2 » Sauerſtoff									O_2
in Summa					=	C_{126}	N_{48}	H_{168}	O_{48} =

$$= \begin{cases} 6 \text{ At. Hippursäure } 6\,(C_{18}\,N_2\,H_{16}\,O_5) = C_{103}\,N_{12}\,H_{96}\,O_{30} \\ 9 \text{ » Harnstoff } \quad 9\,(C_2\,N_4\,H_8\,O_2) = C_{18}\,N_{36}\,H_{72}\,O_{18} \end{cases}$$

$$C_{126}\,N_{48}\,H_{168}\,O_{48}.$$

50. Wenn wir zuletzt festhalten, daß bei den Gras-fressenden Thieren, die stickstofffreien Nahrungsmittel (Amylon u. s. w.) eine bestimmte Rolle in der Bildung der Galle spielen müssen, daß zu ihren Elementen ein stickstoffhaltiger Körper nothwendig treten muß, um die stickstoffhaltigen Bestandtheile der Galle hervorzubringen, so ergiebt sich als das bemerkenswertheste Resultat dieser Combinationen, daß die Elemente des Amylons und die der Hippursäure, gleich sind, den Elementen der Choleinsäure, plus einer gewissen Menge Kohlensäure.

2 At. Hippursäure $2\,(C_{18}\,N_2\,H_{16}\,O_5) = C_{36}\,N_4\,H_{32}\,O_{10}$
5 » Amylon $5\,(C_{12}\,H_{20}\,O_{10}) = C_{60}\,H_{100}\,O_{50}$
2 » Sauerstoff O_2

$$C_{96}\,N_4\,H_{132}\,O_{62}$$

$$= \begin{cases} 2 \text{ At. Choleinsäure } C_{76}\,N_4\,H_{132}\,O_{22} \\ 20 \text{ » Kohlensäure } C_{20}\,O_{40} \end{cases}$$

$$C_{96}\,N_4\,H_{132}\,O_{62}$$

51. Da nun die Hippursäure neben Harnstoff aus den Proteinverbindungen entstehen kann, wenn in die Zusammensetzung derselben die Elemente der Harnsäure aufgenommen werden (S. 154), da ferner Harnsäure, Ammoniak und Choleinsäure (S. 138) die Elemente des Proteins in einer nahe gleichen Anzahl von Elementen enthalten, so ist klar, daß, wenn

beim Hinzutritt von Sauerſtoff und den Elementen des Waſſers, von 5 At. Protein die Beſtandtheile der Choleinſäure und Ammoniak austreten, wir die Elemente der Hippurſäure und des Harnſtoffs übrig behalten, und wenn ferner bei dieſem Austreten und der weiter vorgehenden Umſetzung die Elemente von Amylon ſich gegenwärtig befinden und in die neu entſtehenden Verbindungen eintreten, ſo erhalten wir eine neue Menge Choleinſäure, ſowie eine gewiſſe Quantität gasförmige Kohlenſäure.

Dies will alſo ſagen, daß, wenn die Elemente von Protein und Amylon ſich bei Gegenwart von Sauerſtoff und Waſſer neben und mit einander umſetzen, wir als Produkte dieſer Umſetzung Harnſtoff, Choleinſäure, Ammoniak und Kohlenſäure und außer dieſen kein anderes Produkt erhalten.

Die Elemente von

5 At. Protein
15 » Amylon
12 » Waſſer
5 » Sauerſtoff

=

9 At. Choleinſäure.
9 » Harnſtoff.
60 » Kohlenſäure.
6 » Ammoniak.

Es ſind nemlich:

5 At. Protein	=	5 (	C_{48}	N_{12}	H_{72}	O_{14})	=	C_{240}	N_{60}	H_{360} O_{70}
15 » Amylon	=	15 (	C_{12}		H_{20}	O_{10})	=	C_{180}		H_{300} O_{150}
12 » Waſſer	=	12 (			H_2	O)	=			H_{24} O_{12}
5 » Sauerſtoff	=	5 (				O)	=			O_5
							in Summa	C_{420}	N_{60}	H_{684} O_{237}.

$$
= \begin{cases}
9 \text{ At. Choleinsäure} = 9\,(C_{38}\,N_2\,H_{65}\,O_{11}) = C_{342}\,N_{18}\,H_{594}\,O_{99} \\
9 \text{ » Harnstoff} = 9\,(C_2\,N_4\,H_8\,O_2) = C_{13}\,N_{35}\,H_{72}\,O_{13} \\
60 \text{ » Kohlensäure} = 60\,(C\;\;\;\;\;\;O_2) = C_{50}\;\;\;\;\;\;O_{120} \\
6 \text{ » Ammoniak} = 6\,(\;\;N\;H_3\;\;\;) = \;\;\;\;N_5\;H_{18}
\end{cases}
$$

in Summa $= C_{420}\,N_{30}\,H_{384}\,O_{237}$

Die Umsetzung der in dem Thierkörper vorhandenen Protein-Verbindungen wird bewirkt durch den im arteriellen Blut zugeführten Sauerstoff, und wenn die Bestandtheile des in dem Magen des Thieres löslich gewordenen und in allen Theilen des Körpers verbreiteten Amylons in die neu entstandenen Verbindungen mit aufgenommen werden, so erhalten wir die Hauptbestandtheile der Se- und Excretionen des Thierkörpers; Kohlensäure als Excretion der Lunge, Harnstoff und kohlensaures Ammoniak als Excretion der Nieren, Choleinsäure als Secret der Leber.

Der Ansicht, daß ein Theil des Kohlenstoffs der stickstoffreien Nahrungsmittel in die Galle übergehen kann, steht mithin in der chemischen Zusammensetzung der Stoffe, welche denkbarer Weise an dem Stoffwechsel im Thier Antheil nehmen können, kein Hinderniß entgegen.

52. Das Fett verschwindet in dem Thierkörper bei gehöriger Zufuhr von Sauerstoff, beim Mangel an Sauerstoff kann die Choleinsäure übergehen in Hippursäure, Lithofellinsäure und Wasser. Die Lithofellinsäure [57]) ist bekanntlich der Hauptbestandtheil der in gewissen Gras-fressenden Thieren vorkommenden Bezoare.

2 At. Choleinſäure	$C_{76} N_4 H_{132} O_{22}$	2 At. Hippurſäure	$C_{36} N_4 H_{52} O_{10}$
10 » Sauerſtoff	O_{10}	1 » Lithofellinſäure	$C_{40} H_{72} O_8$
		14 » Waſſer	$H_{28} O_{14}$
	$C_{76} N_4 H_{132} O_{32}$		$C_{76} N_4 H_{132} O_{32}$

53. Zur Erzeugung von Galle im Thierkörper gehört unter allen Umſtänden eine gewiſſe Quantität Natron, ohne die Gegenwart einer Natronverbindung kann ſich keine Galle bilden. Bei Abweſenheit von Natron kann ſich durch Umſetzung der Proteingebilde nur Fett und Harnſtoff bilden. Denken wir uns das Fett nach der empiriſchen Formel $C_{11} H_{20} O$ zuſammengeſetzt, ſo haben wir beim Hinzutreten von Waſſer und Sauerſtoff zu den Elementen des Proteins die Beſtandtheile des Fettes, der Kohlenſäure und des Harnſtoffs.

Protein. Waſſer. Sauerſtoff.

$$2\,(C_{48} N_{12} H_{72} O_{14}) + 12\,H_2 O + 14\,O = C_{96} N_{24} H_{168} O_{54} =$$

$$=\begin{cases} 6 \text{ At. Harnſtoff} \ldots = C_{12} N_{24} H_{48} O_{12} \\ \text{Fett} \ldots\ldots\ldots = C_{66} \quad H_{120} O_6 \\ 18 \text{ Kohlenſäure} \ldots = C_{18} \quad O_{36} \end{cases}$$

$$C_{96} N_{24} H_{168} O_{54}.$$

Die Zuſammenſetzung aller Fette liegt zwiſchen den empiriſchen Formeln $C_{11} H_{20} O$ oder $C_{12} H_{20} O$. Gehen wir von der letzteren aus, ſo geben die Elemente von Protein (2 Pr.) beim Hinzutreten von 2 At. Sauerſtoff und 12 At. Waſſer, 6 At. Harnſtoff, Fett ($C_{72} H_{120} O_6$) und 12 At. Kohlenſäure.

Bemerkenswerth in Beziehung auf die Bildung des Fettes bleibt es immer, daß die Abwesenheit des Kochsalzes (eine Natrium-Verbindung, welche dem Organismus das Natron liefert) die Fettbildung begünstigt, daß das Mästen eines Thieres unmöglich gemacht wird, wenn wir seiner Nahrung einen Ueberfluß von Kochsalz, wiewohl weniger als nöthig wäre, um Purgiren zu bewirken, zusetzen.

54. Als eine Art von Ueberblick über die Metamorphosen der stickstoffhaltigen Secrete des Thierkörpers, ist es hier ganz an seinem Orte, die Aufmerksamkeit darauf hinzulenken, daß die stickstoffhaltigen Producte der Metamorphose der Galle, identisch sind mit den Bestandtheilen des Harns, mit welchen die Elemente des Wassers in Verbindung getreten sind.

1 At. Harnsäure	C_{10}	N_8	H_8	O_6					
1 » Harnstoff	C_2	N_4	H_8	O_2	=	3 At. Taurin	C_{12}	N_6	H_{42}	O_{30}
22 » Wasser			H_{44}	O_{22}		3 » Ammoniak		N_6	H_{18}	
	C_{12}	N_{12}	H_{60}	O_{30}			C_{12}	N_{12}	H_{60}	O_{30}.

1 At. Allantoin	C_4	N_4	H_6	O_5	=	1 At. Taurin	C_4	N_2	H_{14}	O_{10}
7 » Wasser			H_{14}	O_7		1 Aeq. Ammoniak		N_2	H_6	
	C_4	N_4	H_{20}	O_{10}			C_4	N_4	H_{20}	O_{10}.

55. Für die Metamorphosen der Harnsäure und der stickstoffhaltigen Umsetzungsproducte der Galle, ist es nicht minder bedeutungsvoll, daß beim Hinzutreten von Sauerstoff und Wasser zu den Bestandtheilen der Harnsäure, Taurin und Harnstoff, oder Taurin, Kohlensäure und Ammoniak entstehen kann.

$$\left.\begin{array}{ll} 1 \text{ At. Harnſäure} & C_{10}N_8H_8O_6 \\ 14 \text{ » Waſſer} & H_{28}O_{14} \\ 2 \text{ » Sauerſtoff} & O_2 \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{ll} 2 \text{ At. Taurin} & C_8N_4H_{28}O_{20} \\ 1 \text{ » Harnſtoff} & C_2N_4H_8O_2 \end{array}\right.$$

$$C_{10}N_8H_{36}O_{22}$$

$$\text{Hierzu } 2 \text{ At. Waſſer } H_4O_2 = \left\{\begin{array}{ll} 2 \text{ At. Taurin} & C_8N_4H_{28}O_{20} \\ 2 \text{ » Kohlenſäure} & C_2O_4 \\ 2 \text{ » Ammoniak} & N_4H_{12} \end{array}\right.$$

$$C_{10}N_8H_{40}O_{24}$$

56. Alloxan plus einer gewiſſen Menge Waſſer, iſt in ſeiner Zuſammenſetzung gleich der des Taurin, das letztere enthält zuletzt die Elemente des ſauren oxalſauren Ammoniaks.

Taurin.

$$\left.\begin{array}{ll} 1 \text{ At. Alloxan*)} & C_8N_4H_8O_{10} \\ 10 \text{ » Waſſer} & H_{20}O_{10} \end{array}\right\} = 2(C_4N_2H_{14}O_{10})$$

$$1 \text{ At. Taurin } C_4N_2H_{14}O_{10} = \left\{\begin{array}{ll} 2 \text{ At. Oxalſäure} & C_4O_6 \\ 1 \text{ » Ammoniak} & N_2H_6 \\ 4 \text{ » Waſſer} & H_8O_4 \end{array}\right.$$

$$C_4N_2H_{14}O_{10}$$

57. Die Vergleichung des Kohlenſtoffgehaltes der in dem Körper eines Gras-freſſenden Thieres ſecernirten Galle, mit der Kohlenſtoffmenge ſeiner Gebilde oder ſeiner ſtickſtoffhaltigen Nahrungsmittel, welche in Folge des Stoffwechſels in Galle übergehen können, führt, wie ſich aus dem Vorhergehenden ergiebt, auf einen großen Unterſchied.

*) Es wäre von großem Intereſſe, die Wirkung des Alloxans auf den menſchlichen Körper zu unterſuchen; zwei bis drei Drachmen im kryſtalliſirten Zuſtande Kaninchen gegeben, gaben keine ſchädlichen Wirkungen zu erkennen. Beim Menſchen ſchien eine ſtarke Doſis nur auf die Urinſecretion von Einfluß zu ſein. Bei gewiſſen Krankheiten der Leber dürfte das Alloxan eins der wichtigſten Arzneimittel abgeben.

Die Kohlenstoffmenge der secernirten Galle beträgt im geringsten Falle mehr wie das 5fache, von dem was durch den Stoffwechsel ihrer Gebilde oder die stickstoffhaltigen Bestandtheile ihrer Nahrung der Leber zugeführt werden kann, und der Schluß, daß an der Bildung der Galle bei diesen Thieren, die stickstofffreien Bestandtheile ihrer Nahrung einen ganz bestimmten Antheil nehmen, darf als wohlbegründet angesehen werden, denn es giebt keine Erfahrung oder Beobachtung, die seiner Richtigkeit entgegenstände.

58. Es ist in dem Obigen der analytische Beweis niedergelegt, daß aus allen Bestandtheilen des Harns, aus Hippursäure, Harnsäure und Allantoin, die stickstoffhaltigen Producte der Umsetzung der Galle, nämlich Ammoniak und Taurin entstehen können, und wenn wir uns daran erinnern, daß durch ein bloßes Austreten von Sauerstoff und Wasser, aus den Bestandtheilen des Amylon, Choloidinsäure gebildet werden kann,

6 At. Amylon	$= 6\ (C_{12}H_{20}O_{10}) =$	$C_{72}H_{120}O_{60}$
hiervon ab		
44 At. Sauerstoff 4 » Wasser		$H_8\ O_{48}$
bleibt Choloidinsäure	$=$	$C_{72}H_{112}O_{12}$

daß zuletzt die Choloidinsäure, das Ammoniak und Taurin die Elemente der Choleinsäure in sich schließen,

1 At. Choloidinſäure C_{72} $H_{112}O_{12}$
1 » Taurin C_4 $N_2H_{14}O_{10}$
2 » Ammoniak N_2H_6

Choleinſäure = $C_{76}N_4H_{132}O_{22}$

ſo wird durch die Kenntniß dieſer Thatſachen, ein jeder Widerſpruch gegen die Möglichkeit dieſer Vorgänge entfernt.

59. Die chemiſche Analyſe ſowohl wie die Beobachtung des lebenden Thierkörpers unterſtützen ſich alle gegenſeitig; ſie führen beide zu dem Schluſſe, daß eine gewiſſe Quantität des Kohlenſtoffs der ſtickſtofffreien Nahrungsſtoffe (Reſpirationsſtoffe) von der Leber in der Form von Galle ſecernirt wird, daß ferner die ſtickſtoffhaltigen Producte der Umſetzung der Gebilde der Gras-freſſenden Thiere nicht direct und unmittelbar wie bei den Fleiſchfreſſern zu den Nieren gelangen, ſondern daß ſie vor ihrem Austreten durch die Harnblaſe, in gewiſſen anderen Proceſſen, und namentlich in der Bildung der Galle eine Rolle übernehmen.

Mit den Elementen der ſtickſtofffreien Nahrungsſtoffe werden ſie der Leber zugeführt, ſie kehren in der Form von Galle wieder in den Körper zurück und werden erſt zuletzt, wenn ſie zur Bildung des allgemeinſten Reſpirationsmittels gedient haben, durch die Nieren aus dem Körper entfernt.

60. Wenn wir den Harn ſich ſelbſt überlaſſen, ſo verwandelt ſich der darin enthaltene Harnſtoff in kohlenſaures Ammoniak; ſeine Elemente ſind genau in dem Verhältniß zugegen, daß mit dem Hinzutreten der Elemente des Waſſers

aller Kohlenstoff in Kohlensäure, aller Wasserstoff in Ammoniak übergehen kann.

$$\left.\begin{array}{ll} 1 \text{ At. Harnstoff} & C_2N_4H_8O_2 \\ 2 \text{ » Wasser} & H_4O_2 \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{ll} 2 \text{ At. Kohlensäure} & C_2 \quad O_4 \\ 2 \text{ Aeq. Ammoniak} & N_4H_{12} \end{array}\right.$$

61. Wären wir im Stande, aus Harnsäure oder Allantoin geradezu Taurin und Ammoniak darzustellen, so möchte dies wohl als ein weiterer Beweis für den Antheil angesehen werden dürfen, welcher diesen Materien an der Bildung der Galle zugeschrieben worden ist, allein es darf nicht als Einwurf betrachtet werden, wenn diese Verwandlung mit den Mitteln, die uns zu Gebote stehen, nicht bewirkt werden kann. Ein solcher Einwurf verliert seine Bedeutung, wenn man berücksichtigt, daß das Vorhandensein von Taurin und Ammoniak in der Galle schlechterdings nicht vorausgesetzt werden kann, ja daß es sogar nicht einmal wahrscheinlich ist, daß sie in der Form, wie wir sie als Zersetzungsproducte der Galle bekommen, wirkliche Bestandtheile davon ausmachen.

Durch die Einwirkung der Salzsäure auf Galle zwingen wir gewissermaßen ihre Elemente in solchen Formen zusammenzutreten, welche durch den nämlichen einwirkenden Körper keiner weiteren Veränderung mehr fähig sind, und wenn wir uns anstatt der Salzsäure des Kali's bedienen, so erhalten wir die nämlichen Elemente, wiewohl in einer andern und ganz verschiedenen Weise geordnet. Wäre Taurin als solches in der Galle vorhanden, so müßte man durch

Alkalien die nämlichen Producte erhalten, wie durch Säuren. Alles dies iſt gegen die Erfahrung.

Wenn wir alſo auch im Stande wären, das Allantoin oder Harnſäure und Harnſtoff, in Taurin und Ammoniak überzuführen, ſo würden wir an Einſicht in den wahren Vorgang nicht reicher ſein, eben weil die Präexiſtenz von Ammoniak und Taurin in der Galle bezweifelt werden muß, und weil wir keinen Grund haben zu glauben, daß Harnſtoff als Harnſtoff, Allantoin als Allantoin zur Bildung der Galle vom Organismus verwendet wird; wir können darthun, daß ihre Elemente zu dieſem Zwecke dienen, allein es iſt uns gänzlich unbekannt, in welcher Weiſe dieſe Elemente eingetreten ſind, welchen chemiſchen Charakter die ſtickſtoffhaltige Verbindung beſitzt, die ſich mit den Elementen des Amylons zu Galle oder vielmehr zu Choleinſäure vereinigt.

62. Choleinſäure kann entſtehen aus den Elementen des Amylons, der Harnſäure und des Harnſtoffs, oder des Allantoins, oder der Harnſäure, oder des Alloxan's, oder der Oxalſäure und des Ammoniaks, oder der Hippurſäure; dieſe verſchiedenen Formen von Stickſtoffverbindungen zeigen an und für ſich ſchon, daß ſich alle ſtickſtoffhaltigen Producte des Stoffwechſels im Thierkörper zur Bildung von Galle eignen, ohne daß wir damit wiſſen, in welcher Weiſe ſie dazu verwendet werden.

Wir können durch Behandlung mit kauſtiſchen Alkalien das Allantoin zerlegen in Oxalſäure und Ammoniak; die

nämlichen Producte erhalten wir aus dem Oxamid, ohne daß wir aus der Gleichheit derselben einen Schluß rückwärts auf ihre Identität, auf eine gleiche Constitution dieser Verbindungen machen können. So gestatten uns denn die Producte, die wir aus Choleinsäure durch die Einwirkung von Säuren erhalten, in keiner Weise einen Schluß über die Art und Weise, wie ihre Elemente sich darin geordnet befinden.

63. Wenn die Aufgabe der organischen Chemie in der Untersuchung der Veränderungen besteht, welche die Nahrungsmittel im Thierkörper erfahren, so hat sie darzuthun, welche Elemente hinzu-, welche ausgetreten sind, um die Verwandlung einer gegebenen Verbindung in eine zweite und dritte zu bewirken oder überhaupt möglich zu machen, allein synthetische Beweise können von ihr nicht erwartet werden, weil alle Vorgänge im Organismus unter dem Einfluß einer immateriellen Thätigkeit stehen, über welche der Chemiker nicht nach Willkühr verfügen kann.

Die Beobachtung der Erscheinungen, welche die Metamorphosen der Nahrungsmittel im Organismus begleiten, die Ermittelung des Antheils, den die Atmosphäre oder die Bestandtheile des Wassers an diesen Veränderungen nehmen, führen von selbst auf die Bedingungen, welche sich zur Entstehung eines Secretes oder eines Theiles oder Bestandtheiles eines Organs vereinigen müssen.

64. Das Vorhandensein von freier Salzsäure im Magen, sowie der Natrongehalt des Blutes setzen die Nothwendig-

keit des Kochſalzes für den organiſchen Proceß außer allen Zweifel, allein die Quantität von Natron, welche verſchiedene Thierklaſſen zur Unterhaltung der vitalen Proceſſe bedürfen, iſt außerordentlich ungleich.

Wenn wir uns denken, daß eine gegebene Menge Blut als Natronverbindung betrachtet, in dem Körper eines Fleiſchfreſſenden Thieres in Folge des Stoffwechſels in eine neue Natronverbindung, in Galle nämlich, übergeht, ſo muß vorausgeſetzt werden, daß im normalen Zuſtande der Geſundheit der Natrongehalt des Blutes vollkommen hinreicht, um mit den entſtandenen Producten der Umſetzung Galle zu bilden. Das zu den vitalen Proceſſen verbrauchte oder überflüſſige Natron wird, durch die Nieren von dem Blute geſchieden, in der Form eines Salzes austreten müſſen.

Wenn es nun wahr iſt, daß in dem Körper eines Grasfreſſenden Thieres eine weit größere Menge Galle gebildet wird, als der Quantität des erzeugten oder umgeſetzten Blutes entſpricht, daß der größte Theil ihrer Galle von gewiſſen Beſtandtheilen ihrer Nahrung ſtammt, ſo kann das Natron des zu Gebilden gewordenen (aſſimilirten, umgeſetzten) Blutes bei weitem nicht hinreichen, um den zur Bildung von Galle täglich nöthigen Bedarf an Natron zu liefern. Das Natron der Galle der Gras-freſſenden Thiere muß demzufolge direct von den Nahrungsmitteln geliefert werden; ihr Organismus muß die Fähigkeit haben, alle in den Speiſen vorhandenen und von dem Organismus zerlegbaren Natronverbindungen unmittelbar zur Bildung von Galle zu verwen-

den. Alles Natron im Thierkörper stammt, wie sich von selbst versteht, von den Speisen, allein die Speise des Fleisch-fressenden Thieres enthält im Maximo nur die zur Blutbildung erforderliche Menge Natron; in den meisten Fällen kann man bei dieser Thierklasse voraussetzen, daß nur eine der Menge des zur Blutbildung verwendeten Natrons entsprechende Quantität durch ihren Harn wieder austritt.

Wenn sie eine zur Blutbildung hinreichende Quantität Natron zu sich nehmen, so wird eine dieser gleiche Menge durch den Harn ausgeleert, genießen sie weniger, so behält ihr Organismus einen Theil des zur Ausleerung bestimmten Natronsalzes zurück.

Ueber alle diese Verhältnisse giebt die Zusammensetzung des Harns der verschiedenen Thierklassen die unzweideutigsten Belege.

65. Als letztes Product der Veränderung aller Natronverbindungen im Thierkörper erhalten wir im Harn, das Natron in der Form eines Salzes, den Stickstoff als Ammoniak oder Harnstoff.

Das Natron in dem Harn der Fleisch-fressenden Thiere finden wir an Schwefelsäure und Phosphorsäure gebunden, nie fehlt neben diesen Natronsalzen eine gewisse Menge eines Ammoniaksalzes, Salmiak oder phosphorsaures Ammoniak. Es kann keinen entscheidenderen Beweis für die Meinung abgeben, daß das Natron ihrer Galle oder ihrer umgesetzten Blutbestandtheile bei weitem nicht hinreicht, um die austretenden Säuren zu neutralisiren, als wie die Ge-

genwart dieſer Ammoniakſalze im Harn; dieſer Harn reagirt ſauer.

Im graden Gegenſatz hierzu finden wir in dem Harn der Gras-freſſenden Thiere eine überwiegende Menge von Natron und zwar nicht an Schwefelſäure oder Phosphorſäure gebunden, ſondern an Kohlenſäure, Benzoeſäure oder Hippurſäure.

66. Dieſe wohlbegründeten Erfahrungen beweiſen, daß die Gras-freſſenden Thiere eine weit größere Menge Natron genießen als zur Neubildung ihres täglichen Bedarfes an Blut erforderlich iſt. In ihrer Nahrung finden wir alle Bedingungen vereinigt zur Erzeugung einer zweiten Natronverbindung, welche zum Reſpirationsmittel beſtimmt iſt, und nur eine geringe Erfahrung in dem Weſen der mit ſo großer Weisheit geordneten Natureinrichtungen dürfte den Natrongehalt der Speiſe und des Harns der Gras-freſſenden Thiere für zufällig erklären.

Es kann kein Zufall ſein, daß das Leben, die Entwickelung einer Pflanze abhängig iſt von der Gegenwart der Alkalien, die ſie dem Boden entzieht; dieſe Pflanze dient zur Nahrung einer großen Thierklaſſe, deren vitale Proceſſe aufs engſte an die Gegenwart dieſer Alkalien geknüpft iſt. Wir finden dieſe Alkalien in der Galle, ihre Gegenwart im Thierkörper iſt die unerläßliche Bedingung zur Erzeugung des erſten Nahrungsſtoffs des jungen Thieres, ohne eine reichliche Menge Kali kann die Bildung der Milch nicht gedacht werden.

67. Alle Beobachtungen führen, wie sich aus dem Vorhergehenden ergiebt, zu der Ansicht, daß gewisse stickstofffreie Bestandtheile der Nahrung der Gras-fressenden Thiere (Amylon, Zucker, Gummi ꝛc.) die Form einer Natronverbindung erhalten, welche in ihrem Körper zu den nämlichen Zwecken dient, wozu, wie wir mit Bestimmtheit wissen, die Galle (das kohlenstoffreichste Product der Umsetzung ihrer Gebilde) im dem Körper des Fleisch-fressenden Thieres verwendet wird. Sie dienen zur Unterhaltung gewisser vitalen Processe, und werden zuletzt zur Hervorbringung der animalischen Wärme, zum Widerstand gegen die Einwirkung der Atmosphäre verbraucht; bei den Fleischfressern ist der rasche Umsatz ihrer Gebilde eine Bedingung ihres Bestehens, eben weil erst in Folge des Stoffwechsels die Materien gebildet werden müssen, welche zur Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft bestimmt sind; in diesem Sinne kann man sagen, daß die stickstofffreien Nahrungsmittel den Stoffwechsel hindern, daß sie ihn verlangsamen und eine ebenso rasche Beschleunigung wie bei den Fleischfressern jedenfalls unnöthig machen.

68. Mit dieser Fähigkeit der stickstofffreien Nahrungsstoffe, als Respirationsmaterie zu dienen, steht die verhältnißmäßig so geringe Menge von stickstoffhaltiger Nahrung, die sie zur Unterhaltung ihrer Lebensfunctionen bedürfen, in dem engsten Zusammenhang, und es dürfte vielleicht sich herausstellen, daß die Nothwendigkeit zusammengesetzterer Verdauungsorgane in dem Körper der Pflanzen-fressenden Thiere weit

mehr durch die Schwierigkeit bedingt iſt, gewiſſe ſtickſtoffreie Nahrungsmittel (Gummi? ſtärkemehlartige Faſer?) löslich und geſchickt zu machen, an den vitalen Proceſſen Antheil zu nehmen, als die Ueberführung und Verwandlung des Pflanzen-Fibrins, -Albumins und -Caſeins in Blut zu bewirken, denn für dieſen Zweck finden wir die minder zuſammengeſetzten Apparate der Carnivoren vollkommen ausreichend.

69. Wenn in dem Körper des Menſchen, der an gemiſchte Nahrung gewöhnt iſt, das Amylon eine ähnliche Rolle übernimmt, wie in dem Körper der Gras- und Körner-freſſenden Thiere, wenn alſo vorausgeſetzt wird, daß ihre Elemente an der Bildung ihrer Galle einen ebenſo beſtimmten Antheil nehmen, ſo folgt hieraus von ſelbſt, daß ein Theil der ſtickſtoffhaltigen Producte der Umſetzung ihrer Organe, ehe ſie durch die Harnblaſe austreten, von der Leber aus, in der Form von Galle, in den Kreislauf zurückkehren und erſt als letztes Product des Reſpirationsproceſſes durch die Nieren von dem Blute geſchieden werden.

70. Beim Mangel an ſtickſtofffreien Subſtanzen in der Nahrung des Menſchen wird dieſe Form der Gallenbildung nicht ſtattfinden können, die Secrete müſſen in dieſem Fall eine andere Beſchaffenheit beſitzen, und das Erſcheinen von Harnſäure im Harn in gewiſſen Krankheiten, die Ablagerung von Harnſäure in den Gliedern und in der Harnblaſe, ſowie der Einfluß, den ein Ueberfluß von Fleiſchnahrung, der als gleichbedeutend angeſehen werden muß einem Mangel an

Amylon, auf die Absonderung der Harnsäure bei gewissen Individuen ausübt, dürfte hierin seine Erklärung finden. Fehlt es an Amylon, an Zucker ꝛc., so wird ein Theil der durch den Stoffwechsel gebildeten oder sich bildenden Stickstoffverbindungen entweder an dem Orte beharren, wo sie erzeugt worden sind, sie werden nicht von der Leber aus als Respirationsmittel in den Organismus zurückkehren, und durch die Einwirkung des Sauerstoffs die letzten Veränderungen erfahren, die sie überhaupt zu erleiden fähig sind, sondern von den Nieren in irgend einer andern Form abgeschieden werden müssen.

71. In dem Vorhergehenden ist der Beweis zu führen versucht worden, daß die stickstofffreien Nahrungsmittel einen ganz bestimmten Einfluß auf die Natur und Beschaffenheit der Secrete des Thierkörpers ausüben; ob dies direct geschieht, ob ihre Elemente nämlich unmittelbar an dem Acte der Umsetzung der Gebilde Antheil nehmen, oder indirect, möchte durch sorgfältige und umsichtige Versuche und Beobachtungen entschieden werden können. Möglich ist es, daß die stickstofffreien Nahrungsmittel, in irgend einer Weise verändert, von den Eingeweiden aus gradezu der Leber zugeführt werden, daß sie in diesem Organ, wo sie mit den Producten der umgesetzten Gebilde zusammentreten, die Verwandlung in Galle erfahren und dann erst ihren Kreislauf im Körper vollenden.

Diese Meinung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man in Betracht zieht, daß in dem arteriellen Blute bis

jetzt noch niemals weder eine Spur Amylon noch Zucker aufgefunden worden iſt, ſelbſt nicht bei Thieren, die man ausſchließlich mit dieſen Materien zu ernähren verſuchte. Dieſen Materien kann man demnach, da ſie in dem arteriellen Blute fehlen, keinen Antheil an dem Ernährungsproceſſe zuſchreiben, und das Erſcheinen von Zucker im Harne Diabetiſcher, von Zucker, welcher, nach allen Beobachtungen, von der Nahrung ſtammt, ſowie die völlige Abweſenheit dieſes Zuckers in dem Blute der an dieſer Krankheit Leidenden, beweiſ't offenbar, daß Amylon und Zucker als ſolche in die Blutcirculation nicht aufgenommen werden.

72. Ueber die Anweſenheit gewiſſer Beſtandtheile der Galle im Blute des geſunden Menſchen findet man in den Schriften der Phyſiologen viele Belege, wiewohl ſie quantitativ ſchwerlich beſtimmbar darin iſt; denken wir uns in der That, daß in einer Minute zehn Pfund Blut (120 Unzen) durch die Leber gehen und von dieſem Blute 2 Tropfen Galle (zu drei Gran den Tropfen) abgeſondert würden, ſo macht dies $^1/_{9600}$ von dem Gewichte der Blutmaſſe aus, ein Gehalt, der durch die Analyſe nicht mehr feſtgeſtellt werden kann.

73. Der größte Theil der Galle entſteht nach dem Vorhergehenden in dem Körper der Gras- und Körner-freſſenden Thiere, ſowie in dem des Menſchen, der an gemiſchte Nahrung gewöhnt iſt, aus den Beſtandtheilen ſeiner ſtickſtofffreien Nahrungsmittel; ihre Bildung kann aber nicht gedacht werden, ohne ein Hinzutreten eines ſtickſtoffhaltigen Körpers, denn die Galle iſt eine Stickſtoffverbindung. Alle bis

jetzt unterſuchten Gallen geben bei der trocknen Deſtillation Ammoniak und ſtickſtoffhaltige Producte; aus der Ochſengalle hat man Taurin und Ammoniak dargeſtellt; der Beweis, daß dieſe beiden Producte aus allen anderen Gallen darſtellbar ſind, iſt nur deshalb nicht geführt worden, weil es ſchwer hält, ſich von anderen Thieren hinlängliche Mengen von Galle zu verſchaffen.

Mag nun die ſtickſtoffhaltige Verbindung, die ſich mit den Beſtandtheilen des Amylons zu Galle vereinigt, von den Speiſen oder von der Subſtanz der umgeſetzten Gebilde ſtammen, der Schluß, daß die Gegenwart derſelben als eine Bedingung der Gallenſecretion anzuſehen iſt, kann nicht in Zweifel gezogen werden.

Da nun die Gras- und Körner-freſſenden Thiere in ihren Nahrungsmitteln nur ſolche ſtickſtoffhaltige Materien genießen, welche identiſch ſind mit ihren Blutbeſtandtheilen, ſo ſtammt der ſtickſtoffhaltige Beſtandtheil, den wir in der Galle finden, jedenfalls von einer Proteinverbindung ab, er iſt entweder durch eine Veränderung entſtanden, welche die Proteinverbindungen der Speiſe erlitten haben, oder er iſt aus dem Blute oder aus der Subſtanz der Gebilde in Folge des Stoffwechſels erzeugt worden.

74. Wenn nun der Schluß wahr iſt, daß ſtickſtoffhaltige Verbindungen, gleichgültig, ob ſie von der Subſtanz des Blutes oder den ſtickſtoffhaltigen Nahrungsmitteln ſtammen, an der Bildung der Secrete und namentlich an der Bildung der Galle einen beſtimmten Antheil zu nehmen vermögen, ſo iſt

klar, daß der Organismus die Fähigkeit beſitzen muß, fremde Materien, welche weder Theile, noch Beſtandtheile der Träger der Lebensthätigkeit ausmachen, zu gewiſſen vitalen Zwecken dienen zu machen; alle ſtickſtoffhaltigen, der Auflöſung fähigen Subſtanzen ohne Unterſchied dem Blute oder den Verdauungsorganen zugeführt, wenn ſie ſich durch ihre Zuſammenſetzung zu dieſen Zwecken eignen, werden von dem Organismus in ähnlicher Weiſe dazu verwendet werden müſſen, wie die ſtickſtoffhaltigen Producte, die ſich durch den Stoffwechſel gebildet haben.

Wir kennen eine Menge Materien, welche auf den Akt der Umſetzung der Gebilde, ſowie auf den Ernährungsproceß einen ganz beſtimmten Einfluß ausüben, ohne daß ihre Elemente an den vor ſich gehenden Veränderungen Antheil nehmen, es ſind dies lauter ſolche Subſtanzen, deren Theile ſich in einem gewiſſen Zuſtand der Zerſetzung befinden, der ſich allen Theilen des Organismus überträgt, welche fähig ſind, eine ähnliche Umſetzung zu erfahren.

75. Die Arzneiſtoffe und Gifte umfaſſen eine zweite außerordentlich zahlreiche Klaſſe von Verbindungen, welche die Fähigkeit haben, durch ihre Elemente direct oder indirect Antheil an den Secretionsproceſſen oder dem Stoffwechſel zu nehmen. Sie laſſen ſich in drei große Klaſſen eintheilen, von denen die eine (wozu die metalliſchen Gifte gerechnet werden müſſen) eine chemiſche Verbindung mit gewiſſen Theilen oder Beſtandtheilen des animaliſchen Körpers eingeht, welche durch die Lebensthätigkeit nicht aufgehoben

wird. Die zweite Klasse (ätherische Oele, Camphor, empyreumatische Materien, Antiseptica ꝛc.) besitzt die Eigenschaft, den Zustand der Umsetzung ihrer Elementartheile, welchen gewisse sehr zusammengesetzte, organische Atome zu erleiden vermögen (Umsetzungsprocesse, die man, wenn sie außerhalb des Thierkörpers vor sich gehen, gewöhnlich mit Gährung und Fäulniß bezeichnet) zu hindern oder zu verlangsamen.

Die dritte Klasse von Arzneistoffen nimmt durch ihre Elemente an den im Thierkörper vor sich gehenden Veränderungen einen directen Antheil; dem Organismus zugeführt, steigern und erhöhen sie die vitale Thätigkeit einzelner oder mehrerer Organe, sie bringen im gesunden Körper Krankheitserscheinungen hervor; alle üben schon in verhältnißmäßig sehr kleinen Gaben eine bemerkbare Wirkung aus, viele wirken in größeren Massen als Gifte. Von keinem dieser Körper läßt sich behaupten, daß er in dem Ernährungsprocesse eine entschiedene Rolle spiele, daß er von dem Organismus zur Blutbildung verwendet werden könne, theils, weil ihre Zusammensetzung von der der Blutbestandtheile abweicht, theils, weil die Masse, in der sie die Wirkung äußern, gegen die Blutmasse verschwindend klein ist.

In die Blutcirculation aufgenommen, ändern sie, wie man gewöhnlich sagt, die Qualität des Bluts, und um durch den Magen in die Blutgefäße mit ihrer ganzen Wirksamkeit überzugehen, muß vorausgesetzt werden, daß sie durch die organische Thätigkeit, welche dieses Organ besitzt, keine Veränderung in ihrer Zusammensetzung erfahren, sie werden im

unlöslichen Zuſtande darin löslich gemacht (verdaut), aber nicht zerſtört, denn in letzterem Fall würden ſie keine Wirkung ausüben können.

76. Das Blut beſitzt im normalen Zuſtande der Geſundheit zwei Qualitäten, welche mit einander in engem Zuſammenhange ſtehen, obwohl eine von der andern als ganz unabhängig gedacht werden kann.

In den Blutkörperchen enthält das Blut die Träger des zur Neubildung gewiſſer Theile des Thierkörpers, ſowie zur Hervorbringung der animaliſchen Wärme dienenden Sauerſtoffs; durch die Fähigkeit dieſer Blutkörperchen, den in der Lunge aufgenommenen Sauerſtoff wieder abzugeben, ohne daß ſie damit ihren Character verlieren, bedingen ſie im Allgemeinen den Stoffwechſel.

Die zweite Qualität des Blutes, ſeine Fähigkeit, zu Beſtandtheilen von Organen zu werden, ſich für die Zunahme an Maſſe und Neubildung der Organe, ſowie zum Erſatz von verbrauchtem Stoff zu eignen, verdankt es vorzugsweiſe dem in Auflöſung vorhandenen Fibrin und Albumin. Dieſe beiden Hauptbeſtandtheile, welche zur Nutrition und Reproduction dienen, ſättigen ſich bei ihrem Durchgang durch die Lunge mit Sauerſtoff, ſie nehmen jedenfalls ſoviel davon aus der Atmoſphäre auf, daß ſie die Fähigkeit völlig verlieren, den anderen Materien, die ſich im Blute befinden, Sauerſtoff zu entziehen.

Mit Beſtimmtheit wiſſen wir, daß die Blutkörperchen des venöſen Blutes in der Lunge, bei ihrer Berührung mit

der Atmosphäre, ihre Farbe ändern, daß dieser Farbenwechsel begleitet ist von einer Absorbtion von Sauerstoff; alle Bestandtheile des Blutes, welche die Fähigkeit überhaupt besitzen, sich mit Sauerstoff zu verbinden, nehmen in der Lunge Sauerstoff auf und sättigen sich damit. Neben diesen anderen Materien behalten die Blutkörperchen ihre hochrothe Farbe bis in die feinsten Verzweigungen der Arterien, erst bei ihrem Durchgange durch die Capillargefäße beobachten wir, daß sie dieselbe wechseln und die dunkelrothe Farbe annehmen, welche die Blutkörperchen des venösen Blutes characterisirt. Aus diesen Thatsachen muß gefolgert werden, daß den Bestandtheilen des arteriellen Blutes die Fähigkeit völlig abgeht, den Sauerstoff der im arteriellen Blute circulirenden Blutkörperchen, welchen sie aus der Luft aufgenommen haben, zu entziehen, und aus der in den Capillargefäßen stattfindenden Farbenveränderung läßt sich kein anderer Schluß ziehen, als daß sie (die Blutkörperchen des arteriellen Blutes) während diesem Durchgang, in den Zustand zurückkehren, den sie im venösen Blut besitzen, daß sie also den in der Lunge aufgenommenen Sauerstoff abgegeben und damit das Vermögen wieder erlangt haben, sich mit Sauerstoff aufs Neue zu verbinden.

78. Wir finden demnach in dem arteriellen Blut Albumin, was sich, wie alle anderen Bestandtheile, bei seinem Durchgange durch die Lunge mit Sauerstoff gesättigt hat, und Sauerstoffgas, was jedem Körpertheilchen durch die Blutkörperchen in chemischer Verbindung zugeführt wird. So weit unsere Beobachtungen (bei der Bebrütung des Ei's) reichen,

vereinigen ſich darin die Bedingungen zur Erzeugung aller Gebilde; der zur Neubildung oder in dem Proceß der Reproduction nicht verbrauchte Sauerſtoff vereinigt ſich mit der Subſtanz der belebten Körpertheilchen, er bedingt, indem er in ihre Elemente aufgenommen wird, den Act der Umſetzung, den wir mit Stoffwechſel bezeichnet haben.

79. Es iſt klar, daß alle in den Capillargefäßen vorhandenen oder abgeſchiedenen oder durch Endosmoſe oder Imbibition zugeführten Stoffe, welcher Art ſie auch ſein mögen, wenn ihnen die Fähigkeit nicht völlig abgeht, ſich mit Sauerſtoff zu vereinigen, daß ſie, bei Berührung mit den Trägern des Sauerſtoffs, ſich ähnlich verhalten müſſen, wie die lebendigen Körpertheilchen ſelbſt, ſie werden, oder ihre Elemente werden mit dieſem Sauerſtoff in Verbindung treten, es wird in dieſem Fall entweder kein Stoffwechſel ſtattfinden, oder er wird ſich in einer andern Form, in der Bildung von Producten anderer Art, zu erkennen geben.

80. Der Begriff einer Aenderung der beiden in dem Vorhergehenden berührten Qualitäten des Blutes durch einen in dem Blute enthaltenen oder aufgenommenen fremden Stoff (Arzneiſtoff) ſetzt demnach zweierlei Wirkungsweiſen voraus.

Angenommen, daß der Arzneiſtoff keine, der Lebensthätigkeit eine Grenze ſetzende, chemiſche Verbindung mit den Beſtandtheilen des Blutes einzugehen vermag, daß er ferner ſich nicht im Zuſtande einer Umſetzung befindet, die ſich auf die Beſtandtheile des Blutes oder der Organe fortpflanzen und übertragen kann, daß ihm die Fähigkeit abgeht, durch

seinen Contact mit den lebenden Körpertheilchen ihren Stoffwechsel, die Umsetzung ihrer Elemente, zu hindern, so bleibt für diese Art von Stoffen, um ihre Wirkungsweise erklärlich zu finden, nichts anders übrig, als anzunehmen, daß ihre Elemente an der Erzeugung gewisser Bestandtheile des lebenden Thierkörpers oder an der Bildung gewisser Secrete Antheil nehmen.

81. Insoweit der vitale Act der Secretion mit dem Chemismus in Beziehung steht, ist er in dem Vorhergehenden einer Untersuchung unterworfen worden; bei den Fleisch-fressenden Thieren haben wir Grund zu glauben, daß ohne Hinzutreten eines fremden Stoffes von Außen, die Galle und die Bestandtheile des Harns an dem Orte gebildet werden, wo der Stoffwechsel vor sich geht; bei den anderen Thierclassen hingegen kann angenommen werden, daß in dem Secretionsorgan selbst, aus gewissen zugeführten Stoffen (bei den Grasfressenden Thieren aus den Bestandtheilen des Amylons und einem stickstoffhaltigen Product der umgesetzten Organe) die Erzeugung der Secrete vermittelt wird. Diese Vorstellung schließt die Meinung übrigens nicht aus, daß bei den Fleischfressenden Thieren die Producte der umgesetzten Organe, eine Spaltung in Galle, Harnsäure oder Harnstoff, erst in den Secretionsorganen erleiden, oder daß die Bestandtheile der stickstofffreien Nahrungsstoffe, direct den Körpertheilen zugeführt, wo Stoffwechsel stattfindet, mit den Elementen der umgesetzten Gebilde zu den Bestandtheilen des Harns und der Galle zusammentreten.

82. Wenn nun vorausgeſetzt wird, daß gewiſſe Arzneimittel zu Beſtandtheilen von Secreten werden können, ſo kann dies nur auf zweierlei Weiſe geſchehen; entweder gelangen ſie in die Blutcirculation und nehmen an dem Stoffwechſel directen Antheil, inſofern ihre Elemente in die Zuſammenſetzung der neuen Producte eintreten, oder ſie werden den Secretionsorganen zugeführt, wo ſie auf die Bildung oder auf die Beſchaffenheit des Secretes einen Einfluß durch Hinzutreten ihrer Elemente äußern.

In beiden Fällen müſſen ſie in dem Organismus ihren chemiſchen Character verlieren, und wir wiſſen mit genügender Sicherheit, daß dieſe Claſſe von Arzneiſtoffen ſpurlos im Körper verſchwindet. Schreibt man ihnen in der That eine Wirkung zu, ſo können ſie durch den Magen ihre Eigenthümlichkeit nicht verlieren, ſie können durch den Verdauungsproceß nicht zerſtört worden ſein; ihr Verſchwinden ſetzt alſo voraus, daß ſie zu gewiſſen Zwecken verwendet worden ſind, was ohne Aenderung ihrer Zuſammenſetzung nicht denkbar iſt.

83. So wenig man nun auch, bis auf die Galle, mit der Zuſammenſetzung der übrigen Secrete bekannt ſein mag, mit Beſtimmtheit weiß man, daß alle Secrete Stickſtoff in chemiſcher Verbindung enthalten; ſie gehen in ſtinkende Fäulniß über und liefern entweder in dieſem Zerſetzungsproceß oder bei der trocknen Deſtillation ammoniakhaltige Producte; ſelbſt der Speichel, mit Kalihydrat zuſammengebracht, entwickelt reichlich Ammoniak.

84. Durch ihre Zuſammenſetzung theilen ſich die Arznei-

mittel in zwei Klassen, in stickstoffhaltige und in stickstofffreie. Vor allen ausgezeichnet durch ihre medizinischen Wirkungen auf den Organismus sind die stickstoffhaltigen Pflanzenstoffe, deren Zusammensetzung von den eigentlichen, stickstoffhaltigen Nahrungsstoffen, welche der Organismus der Pflanze ebenfalls erzeugt, abweicht.

Die Arzneiwirkungen dieser Materien sind außerordentlich verschieden; von der mildesten Form der Wirkung der Aloe bis zum furchtbarsten Gifte, dem Strychnin, beobachten wir Unterschiede der mannigfaltigsten Art.

Bis auf drei Verbindungen, bringen alle diese Materien im gesunden Organismus Krankheitszustände hervor und wirken in gewissen Gaben giftig, die meisten besitzen den chemischen Character der Basen.

Kein stickstofffreies Arzneimittel übt in gleichen Gaben eine giftige Wirkung aus *).

85. Die arzneiliche oder giftige Wirkung der stickstoffhaltigen Pflanzenstoffe steht mit ihrer Zusammensetzung in einer bestimmten Beziehung, sie kann nicht unabhängig von ihrem Stickstoffgehalte gedacht werden, allein sie steht keineswegs in directem Zusammenhang mit diesem Stickstoffgehalte.

Das Solanin [38]), das Picrotoxin [39]), welche die geringste Stickstoffmenge enthalten, sind starke Gifte, Chinin [40]) enthält

*) Diese Betrachtung oder Vergleichung hat zu einer neuen und genaueren Untersuchung des Picrotoxins geführt und Herr Francis hat einen bis jetzt übersehenen Stickstoffgehalt darin unzweifelhaft dargethan und seine Menge bestimmt.

mehr Stickſtoff wie Morphin[41]); Caffein[42]) und Theobromin[43]), die ſtickſtoffreichſten Pflanzenſtoffe, die man kennt, ſind nicht giftig.

86. Ein ſtickſtoffhaltiger Körper, der durch ſeine Elemente auf die Bildung oder die Qualität eines Secretes eine Wirkung äußert, muß in Beziehung auf ſeinen chemiſchen Character die Rolle übernehmen können, welche die ſtickſtoffhaltigen Producte des Thierkörpers in der Bildung der Galle ſpielen, die Rolle alſo eines Productes des Lebensproceſſes. Ein ſtickſtofffreies Arzneimittel, inſofern ſeine Wirkung ſich in den Secreten äußert, muß in dem Thierkörper dieſelbe Rolle ſpielen können, die wir den ſtickſtofffreien Nahrungsſtoffen zugeſchrieben haben.

Wenn wir uns alſo denken, daß die Elemente der Hippur- oder Harnſäure von den Trägern der Lebensthätigkeit ſtammen, daß ſie als Producte ihrer Umſetzung den Character des Lebens, aber keineswegs die Fähigkeit verlieren, Veränderungen durch den eingeathmeten Sauerſtoff oder durch die Einwirkung der Secretionsapparate zu erleiden, ſo läßt ſich kaum ein Zweifel hegen, daß Stickſtoffverbindungen ähnlicher Art, Producte des Lebensproceſſes der Pflanzen, in den Thierkörper gebracht, wenn ſie ſich zu gleichen Zwecken eignen, ganz auf die nämliche Weiſe von dem Thierorganismus verwendet werden können, wie die ſtickſtoffhaltigen Producte der Metamorphoſen der Thiergebilde ſelbſt; und wenn Hippur- oder Harnſäure oder eins ihrer Elemente Antheil z. B. zu nehmen vermögen an der Bildung und Erzeugung

von Galle, so muß anderen stickstoffhaltigen Substanzen ein ähnliches Vermögen zugeschrieben werden.

Unerforschlich wird es immer bleiben, wie die Menschen auf den Genuß eines heißen Aufgusses von Blättern gewisser Stauden oder der Abkochung gerösteter Samen gekommen sind; es muß eine Ursache geben, welche erklärt, wie er ganzen Nationen zu einem Lebensbedürfniß geworden ist. Noch weit merkwürdiger ist es gewiß, daß die wohlthätigen Wirkungen auf die Gesundheit, in beiden Pflanzenstoffen, einer und derselben Materie zugeschrieben werden müssen, deren Vorhandensein in zwei Pflanzen, welche verschiedenen Pflanzenfamilien und Welttheilen angehören, die kühnste Phantasie nicht voraussetzen konnte.

Nicht minder bemerkenswerth ist es gewiß, daß der Fleisch-essende Indianer in dem Tabacksrauchen ein Mittel entdeckte, welches den Umsatz seiner Gebilde verlangsamt und damit den Hunger erträglicher macht, daß er dem Genusse des Branntweins nicht zu widerstehen vermag, der in seinem Körper als Respirationsmittel dient und die Function seiner umgesetzten Gebilde übernimmt. Thee und Caffee treffen wir ursprünglich bei Nationen an, welche vorzugsweise vegetabilische Nahrung genießen.

87. Ohne auf die medicinischen Wirkungen des Caffeins und Theins einzugehen, wird man es jedenfalls, selbst wenn man sich darin gefallen sollte, ihren Einfluß auf den Secretionsproceß zu leugnen, höchst auffallend finden, daß Caffein und Thein, durch ein Hinzutreten von Wasser und

Sauerstoff in Taurin, in den der Galle eigenthümlichen stickstoffhaltigen Bestandtheil übergehen können.

1 At.	Caffein, Thein	$C_8N_4H_{10}O_2$
9 »	Wasser	$H_{18}O_9$
9 »	Sauerstoff	O_9
2 »	Taurin	$2\,(C_4N_2H_{14}O_{10})$

Eine ganz ähnliche Beziehung beobachten wir in dem Hauptbestandtheil der Spargeln, dem Althäin oder Asparagin; beim Hinzutreten von Sauerstoff und Wasser bekommen wir ebenfalls die Elemente des Taurin's.

1 At.	Asparagin	$C_8N_4H_{16}O_6$
6 »	Wasser	$H_{12}O_6$
8 »	Sauerstoff	O_8
2 »	Taurin	$2\,(C_4N_2H_{14}O_{10})$

Beim Hinzutreten der Elemente des Wassers und einer gewissen Menge Sauerstoff zu den Elementen des Theobromins, des Hauptbestandtheils der Cacaobohnen, haben wir Harnstoff und Taurin oder Harnsäure, Taurin und Wasser.

1 At.	Theobromin	$C_{18}N_{12}H_{20}O_4$	=	4 At. Taurin	$C_{16}N_8H_{56}O_{40}$
22 »	Wasser	$H_{44}O_{22}$	=	1 » Harnstoff	$C_2N_4H_8O_2$
16 »	Sauerstoff	O_{16}	=		
		$C_{18}N_{12}H_{64}O_{42}$			$C_{18}N_{12}H_{64}O_{42}$

oder:

1 At.	Theobromin	$C_{18}N_{12}H_{20}O_4$	=	4 At. Taurin	$C_{16}N_8H_{56}O_{40}$
24 »	Wasser	$H_{48}O_{24}$	=	2 » Kohlensäure	C_2O_4
16 «	Sauerstoff	O_{16}	=	2 » Ammoniak	N_4H_{12}
		$C_{18}N_{12}H_{68}O_{44}$			$C_{18}N_{12}H_{68}O_{44}$

oder:

1 At.	Theobromin	$C_{18}N_{12}H_{20}O_4$	=	2 At.	Taurin	$C_8N_4H_{28}O_{20}$
8 »	Wasser	$H_{16}O_8$		1 »	Harnsäure	$C_{10}N_8H_8O_6$
14 »	Sauerstoff	O_{14}				
		$C_{18}N_{12}H_{36}O_{26}$				$C_{18}N_{12}H_{36}O_{26}$

88. Um die Wirkung des Caffeins, Asparagins ꝛc. auf den Organismus erklärlich zu finden, muß man sich erinnern, daß der Hauptbestandtheil der Galle nur 3,8 pCt. Stickstoff enthält, von dem nur die Hälfte dem Taurin angehört (1,9 pCt.).

Die Galle enthält im natürlichen Zustande 80 Theile Wasser und 10 Theile feste Substanz. Nehmen wir nun an, diese 10 Theile seien Choleinsäure mit 3,87 pCt. Stickstoff, so enthalten 100 Gewichtstheile Galle im natürlichen Zustande in der Form von Taurin 0,171 Gewichtstheile Stickstoff. Diese Quantität Stickstoff ist aber in 0,6 Caffein enthalten oder $2^{7}/_{10}$ Gran Caffein können in der Form von Taurin, einer Unze Galle den Stickstoff liefern, und wenn ein Theeaufguß auch nur den zehnten Theil eines Grans Thein enthält, so kann, wenn es überhaupt zur Gallenbildung beiträgt, seine Wirkung nicht gleich Null gesetzt werden. Man wird eben so wenig leugnen können, daß bei einem Ueberfluß von stickstofffreien Nahrungsmitteln und bei Mangel an Bewegung, welche den Umsatz der Gebilde bedingt und die zur Gallenbildung nöthige Stickstoffverbindung liefert, daß in diesem Zustande der Genuß von Stoffen der Gesundheit zuträglich sein mag, welche die Rolle der zur Respira-

tionsmaterie unentbehrlichen Stickſtoffverbindung, die der Körper erzeugt, zu übernehmen vermögen. In chemiſcher Beziehung und dies allein ſoll mit Obigem dargethan werden, eignen ſich Thein, Caffein, Theobromin, Asparagin mehr, wie alle anderen ſtickſtoffhaltigen Pflanzenſtoffe, ihrer Zuſammenſetzung nach, zu dieſer Verwendungsweiſe. Ihre Wirkungen ſind für die gewöhnlichen Zuſtände nicht in die Augen fallend, wiewohl unleugbar vorhanden.

89. Was die Wirkung der andern ſtickſtoffhaltigen Pflanzenſtoffe betrifft, des Chinins, der Beſtandtheile des Opiums ꝛc. ꝛc., die ſich nicht in den Secretionsproceſſen, ſondern in anderen Erſcheinungen äußert, ſo ſind die Phyſiologen und Pathologen nicht zweifelhaft, daß ſie vorzugsweiſe auf die Nerven und das Gehirn gerichtet iſt; ſie iſt, wie man gewöhnlich ſagt, dynamiſcher Art, was ausdrücken will, daß ſie die Bewegungserſcheinungen des Thierlebens entweder beſchleunigt oder verlangſamt, oder in irgend einer Form ändert. Beachtet man nun, daß die Wirkung materiellen, mit der Hand greifbaren und wägbaren Stoffen angehört, daß ſie in dem Organismus verſchwinden, daß eine doppelte Portion ſtärker wirkt, wie eine einfache, daß nach einiger Zeit eine neue Doſis gegeben werden muß, wenn man die Wirkung zum zweitenmal hervorbringen will, ſo läßt dies Verhalten, in chemiſcher Beziehung, nur eine einzige Form von Erklärung, die Vorſtellung nämlich zu, daß ſie durch ihre Elemente Theil an der Bildung oder Umſetzung der Gehirn- und Nervenſubſtanz nehmen.

So sonderbar nun auch der Gedanke auf den ersten Blick zu sein scheint, daß die Bestandtheile des Opiums, oder der Chinarinde, die Elemente des Codeins, Morphins, Chinins ꝛc. in Bestandtheile der Gehirn- und Nervensubstanz, zu Trägern der Thätigkeit übergehen, von denen aus die Bewegungen der Organe im Thierkörper vermittelt werden, daß sie zu einem Bestandtheil der Substanz werden, mit deren Hinwegnahme der Sitz des geistigen Lebens, des Gefühls und des Bewußtseins vernichtet wird, so bleibt nicht minder gewiß, daß alle diese Fähigkeiten und Thätigkeiten auf's engste mit der Existenz und einer gewissen Beschaffenheit der Gehirn-, Rückenmark- und Nervensubstanz im Zusammenhange stehen, in der Art, daß alle Aeußerungen des Lebens dieser Stoffe, die in der Erscheinung sich als Bewegung, Empfindung, Gefühl zu erkennen geben, eine andere Form annehmen, so wie ihre Zusammensetzung sich ändert. Die Gehirn- und Nervensubstanz erzeugte der Organismus des Thieres aus Materien, die ihm von den Pflanzen geliefert wurden; es sind die Bestandtheile ihrer Nahrung, welche in Folge einer Reihe von Veränderungen die Eigenschaften und die Beschaffenheit annehmen, die wir an ihnen kennen.

90. Wenn nun als eine unbestreitbare Wahrheit angesehen werden muß, daß aus den Bestandtheilen des Pflanzen-Fibrins, -Caseins, -Albumins allein, oder mit Zuhülfenahme der Bestandtheile der stickstofffreien Nahrungsmittel, oder des daraus gebildeten Fettes die Gehirn- und Nervensubstanz er-

zeugt wird, so hat die Meinung nichts Absurdes, daß andere Bestandtheile der Vegetabilien, die in ihrer Zusammensetzung zwischen beiden (den Fetten nämlich und den Proteinverbindungen) stehen, daß diese in dem Organismus zu gleichem Zwecke verwendet werden können.

91. Nach Fremy's Untersuchung ist der Hauptbestandtheil des Gehirnfettes die Natronverbindung von einer eigenthümlichen Säure, der Cerebrinsäure, welche in 100 Th. enthält:

Kohlenstoff	66,7
Wasserstoff	10,6
Stickstoff	2,3
Phosphor	0,9
Sauerstoff	19,5

Wie man leicht bemerkt, weicht die Zusammensetzung der Cerebrinsäure von der der fetten Körper und der stickstoffhaltigen Bestandtheile des Blutes gänzlich ab; die Fette sind frei von Stickstoff, die Proteinverbindungen enthalten nahe an 17 pCt. Stickstoff. Bis auf den Phosphor(säure?)gehalt kann die Zusammensetzung der Gehirnsubstanz am nächsten nur mit der Zusammensetzung der Choleinsäure verglichen werden, obwohl beide mit einander nicht verwechselt werden können.

92. Die Gehirn- und Nervensubstanz sind jedenfalls auf eine ähnliche Weise entstanden wie die Galle, entweder durch Austreten einer stickstoffreichen Materie aus den Bestandtheilen des Blutes, oder durch Zusammentreten eines stick-

stoffhaltigen Productes des Lebensprocesses mit einem stickstofffreien (einem fetten!) Körper. Alles was in dem Vorhergehenden über die verschiedene Art und Weise der Entstehung der Galle gesagt worden ist, alle Schlüsse, zu denen wir über die Mitwirkung stickstoffhaltiger oder stickstofffreier Nahrungsstoffe gelangt sind, lassen sich mit gleichem Rechte oder mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf die Bildung und Erzeugung der Gehirn- und Nervensubstanz anwenden.

Man darf nicht aus den Augen verlieren, daß, wie man auch die vitalen Vorgänge betrachten mag, die Entstehung der Gehirnsubstanz aus Blut eine Aenderung in der Zusammensetzung und den Qualitäten der Blutbestandtheile voraussetzt; diese Aenderung findet eben so gewiß statt, als die Existenz der Gehirnsubstanz nicht geleugnet werden kann. In diesem Sinne muß angenommen werden, daß aus einer Proteinverbindung ein erstes, zweites, drittes ꝛc. Product hervorgeht, ehe eine gewisse Anzahl ihrer Elemente zu Bestandtheilen der Gehirnsubstanz werden können, und es muß als vollkommen gewiß angesehen werden, daß ein Product des Lebensprocesses einer Pflanze, dem Blute zugeführt, die Rolle der ersten, zweiten, dritten Producte der Veränderung der Proteinverbindung übernehmen wird, wenn ihre Zusammensetzung sich zu diesem Zwecke eignet. Es kann in der That nicht als zufällig angesehen werden, daß die Zusammensetzung der wirksamsten Arzneistoffe, der organischen Basen, mit keinem Bestandtheil des Thierkörpers außer mit der Gehirnsubstanz in Beziehung gebracht werden kann; alle ent-

halten eine gewiſſe Menge Stickſtoff; ſie ſtehen, in Beziehung auf ihre Elemente, in der Mitte zwiſchen den Proteinverbindungen und den Fetten.

93. Im Gegenſatz zu ihrem chemiſchen Charakter finden wir in der Gehirnſubſtanz die Eigenſchaft einer Säure; ſie enthält eine weit größere Menge von Sauerſtoff wie die organiſchen Baſen. Wir beobachten, daß Chinin und Cinchonin, Morphin und Codein, Strychnin und Brucin, die ſich in ihrer Zuſammenſetzung ſo nahe ſtehen, wenn nicht eine gleiche Wirkung äußern, doch darin ſich näher ſtehen, als den anderen, welche größere Unterſchiede in ihrer Zuſammenſetzung zeigen. Wir finden, daß mit ihrem Sauerſtoffgehalte (wie beim Narcotin) ihre energiſche Wirkung abnimmt, daß im ſtrengſten Sinne keine durch die andere vollkommen erſetzt werden kann. Es giebt aber keinen entſcheidenderen Beweis für die Art und Weiſe ihrer Wirkung, als das letztere Verhalten, ſie muß in der engſten Beziehung zu ihrer Zuſammenſetzung ſtehen. Wenn dieſe Stoffe in der That eine Rolle in Beziehung auf die Bildung oder Aenderung der Qualitäten der Gehirn- und Nervenſubſtanz ausüben, ſo erklären ſich ihre Wirkungen auf den geſunden ſo wie auf den kranken Organismus auf eine überraſchend einfache Weiſe, und wenn man nicht verſucht iſt zu leugnen, daß der Hauptbeſtandtheil der Fleiſchbrühe in dem Körper des Menſchen oder der organiſche Beſtandtheil der Knochen in dem Leibe eines Hundes, obwohl ſie zur Blutbildung ſchlechterdings nicht geeignet ſind, daß alſo Stickſtoffverbindungen,

welche den Proteinverbindungen durchaus unähnlich sind, eine ihrer Zusammensetzung entsprechende Verwendung finden, so werden wir daraus schließen dürfen, daß ein anderes, dem Protein ebenfalls unähnliches, aber einem Bestandtheil des Thierkörpers ähnliches Product des Pflanzenlebens in dem Organismus des Thieres eine ähnliche Verwendung findet, wie das Product, welches durch die vitale Thätigkeit seiner Organe ursprünglich ebenfalls aus einer Pflanzensubstanz erzeugt worden ist.

Die Zeit ist noch nicht lange vorübergegangen, wo man über die Ursache der verschiedenartigen Wirkungen des Opiums nicht die allergeringste Vorstellung hatte, wo die Wirkung der Chinarinde in ein unbegreifliches Dunkel gehüllt schien. Jetzt, wo man weiß, daß sie krystallisirbaren, chemischen Verbindungen angehört, welche in ihrer Zusammensetzung ebenso verschieden sind, wie sie in ihrer Wirkung auf den Organismus von einander abweichen, jetzt also, wo man die Stoffe kennt, denen die arzneiliche oder giftige Wirkung zukommt, kann nur der Unverstand ihren Antheil an dem Lebensproceß für unerforschbar halten; sie deshalb, wie Manche gethan haben, für unerforschbar erklären, weil sie in kleinen Gaben wirken, ist eben so ungereimt, wie wenn man die Schärfe eines Rasirmessers beurtheilen wollte nach seinem Gewichte.

94. Es wäre völlig zwecklos, diesen Schlüssen eine größere Ausdehnung zu geben, sie verdienen, so hypothetisch sie sich auch darstellen mögen, nur in so fern Beachtung,

als ſie den Weg andeuten, den die Chemie verfolgt, oder den ſie nicht verlaſſen darf, wenn ſie in der That der Phyſiologie und Pathologie Dienſte leiſten ſoll. Die Combinationen des Chemikers beziehen ſich ſtets auf den Stoffwechſel vorwärts und rückwärts, auf den Uebergang der Nahrung in die mannigfaltigen Gebilde und Secrete und ihrer Umſetzung in lebloſe Verbindungen; ſeine Unterſuchungen ſollen zeigen, was im Körper vor ſich gegangen iſt, und was vor ſich gehen kann. Sonderbarer Weiſe ſehen wir die Arzneiwirkungen alle abhängig von gewiſſen Stoffen, die ſich in ihrer Zuſammenſetzung nicht ähnlich ſind, und wenn durch die Hinzuführung eines Stoffes gewiſſe abnormale Zuſtände zu normalen werden, ſo wird man die Anſicht nicht zurückweiſen können, daß dieſe Erſcheinung in einer Aenderung der Zuſammenſetzung der Beſtandtheile des kranken Organismus beruht, an welcher die Elemente des Arzneimittels einen beſtimmten Antheil haben, einen ähnlichen Antheil, wie der iſt, den die Beſtandtheile der Pflanzen an der Bildung des Fettes und der Membranen, des Speichels, der ſpermatiſchen Materie ꝛc. genommen haben; ihr Kohlenſtoff, ihr Waſſerſtoff, Stickſtoff, oder was ſonſt zu ihrer Zuſammenſetzung gehört, ſie ſtammen ja von dem Organismus der Pflanze ab; die Wirkungen des Chinins, des Morphins, der vegetabiliſchen Gifte ſind zuletzt keine Hypotheſen.

95. Aehnlich alſo wie man in gewiſſem Sinne von Caffein, Thein, Asparagin, ſo wie von den ſtickſtofffreien Nahrungsſtoffen ſagen kann, daß ſie Nahrungsſtoffe für die Leber ſind,

indem sie die Elemente enthalten, durch deren Gegenwart dieses Organ befähigt wird, seinen Functionen vorzustehen, lassen sich die stickstoffhaltigen, durch ihre Wirkung auf das Gehirn und die Substanz der Bewegungsapparate so merkwürdigen Arzneistoffe als Nahrungsstoffe für die unbekannten Organe betrachten, welche zur Metamorphose der Blutbestandtheile in Gehirn- und Nervensubstanz bestimmt sind, Organe, die in dem Thierkörper nicht fehlen können, und wenn im Zustande der Krankheit ein abnormaler Proceß der Bildung oder Umsetzung der Bestandtheile der Nerven- und Gehirnsubstanz sich eingestellt hat, wenn in den dazu bestimmten Organen die Fähigkeit vermindert ist, aus den Blutbestandtheilen Nerven- und Gehirnsubstanz zu erzeugen, oder einer abnormalen Umsetzung Widerstand zu leisten, so steht der Ansicht in chemischer Beziehung kein Hinderniß entgegen, daß Materien von einer der Gehirn- und Nervensubstanz ähnlichen Zusammensetzung, die sich für die Bildung derselben eignen, statt der aus dem Blute erzeugten zum Widerstand oder zur Herstellung des normalen Zustandes verwendet werden können. Beide sind Producte des Lebensprocesses; die Blutbestandtheile sowohl, wie die Körper, welche wir Arzneimittel nennen, stammen von den Pflanzen, nur in ihrer Form zeigen sie Verschiedenheiten.

96. Einige Physiologen und Chemiker haben die Eigenthümlichkeit der Cerebrinsäure, welche ihrem Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalte und ihren physikalischen Eigenschaften nach einer stickstoffhaltigen fetten Säure gleicht, in Zweifel ge-

zogen; ein stickstoffhaltiges Fett, was einen sauren Charakter besitzt, ist aber in der That keine Anomalie. Die Hippursäure ist in manchen ihrer Eigenschaften den fetten Säuren sehr ähnlich, sie ist aber durch ihren Stickstoffgehalt wesentlich davon unterschieden; die organischen Bestandtheile der Galle, sie gleichen in ihren physikalischen Eigenschaften den sauren Harzen und sind ebenfalls stickstoffhaltig; die organischen Basen stehen in ihren physikalischen Eigenschaften zwischen den fetten Körpern und den Harzen, alle sind stickstoffhaltig; eine stickstoffhaltige fette Säure ist eben so wenig unwahrscheinlich, wie die Existenz eines stickstoffhaltigen Harzes, was die Eigenschaften einer Salzbase besitzt.

97. Ein genaues Studium möchte wahrscheinlich in der Substanz des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven Verschiedenheiten darthun. Nach den Beobachtungen von Valentin ändert sich die Beschaffenheit der Gehirn- und Nervensubstanz von dem Tode an, mit großer Schnelligkeit, und ganz besondere Sorgfalt müßte auf die Sonderung fremder, der Mark- und Gehirnsubstanz nicht angehörender Materien zu verwenden sein. So groß nun auch die Schwierigkeiten sich darstellen mögen, so scheint die Untersuchung dennoch ausführbar. Vorläufig wissen wir, daß gegen einen großen Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt in der Gehirnsubstanz alle Erfahrungen sprechen; die Abwesenheit von Stickstoff als Bestandtheil der Nerven- und Gehirnsubstanz erscheint jedenfalls unwahrscheinlich. Sie darf ferner nicht zu den Fetten gerechnet werden, denn wir finden sie mit Natron vereinigt;

alle Fette ſind aber Glycerylverbindungen. Was den Phosphorgehalt der Gehirnſubſtanz betrifft, ſo haben wir über den Zuſtand, in welchem der Phosphor darin enthalten iſt, nur Vermuthungen. Walchner beobachtete vor Kurzem, daß ſich aus einem Brunnentroge in Carlsruhe, auf deſſen Boden Fiſche faulten, ſelbſtentzündliches Phosphorwaſſerſtoffgas in Blaſen entwickelte, und auch in der Fäulniß der Gehirnſubſtanz ſind phosphorreiche Gaſe beobachtet worden *).

*) Das Muſeum zu Genf übergab eine große Portion Weingeiſt, der zur Aufbewahrung von Thieren (Fiſchen) gedient hatte, an Herrn Leroyer, Apotheker, der ſeine Reinigung übernahm. Er deſtillirte denſelben über ein Gemenge von Chlorcalcium mit gebranntem Kalk und dampfte den Rückſtand an der Luft über Feuer ab. Sobald die Maſſe eine gewiſſe Conſiſtenz und eine höhere Temperatur angenommen hatte, entwickelte ſich eine außerordentliche Menge entzündliches Phosphorwaſſerſtoffgas (Dumas V. 267.)

Dritter Theil.

Die

Bewegungserſcheinungen

im

Thierorganismus.

I.

Die zahlloſen Bilder, welche ſich der menſchliche Geiſt über die Natur und das Weſen der eigenthümlichen Urſache geſchaffen hat, welche als der letzte Grund der Erſcheinungen angeſehen werden muß, die das Thier- und Pflanzenleben characteriſiren, mit einem neuen zu vermehren, dürfte nicht der Beachtung werth gehalten werden, wenn ſich nicht aus den Vorſtellungen über dieſe Urſache, welche im Eingang zum erſten Theil dieſer Schrift entwickelt worden ſind, gewiſſe Begriffe als nothwendige Folgerungen ergäben, deren nähere Erörterung in dem Folgenden verſucht werden ſoll.

Von vorne herein muß zugegeben werden, daß alle dieſe Folgerungen ihre Bedeutung verlieren, wenn der Beweis geführt werden kann, daß die Urſache der Lebensthätigkeit mit anderen bekannten Urſachen, welche Bewegung oder Form- und Beſchaffenheitsänderungen der Materie bewirken, in ihren Aeußerungen nichts gemein hat.

Eine Vergleichung ihrer Eigenthümlichkeiten mit der Wirkungsweiſe dieſer anderen Urſachen, kann übrigens ſchon deshalb keinen Nachtheil bringen, weil die Natur und das Weſen einer Naturerſcheinung nicht durch Abſtraction, ſon-

dern nur durch vergleichende Beobachtungen erkennbar sind.

Wenn die Lebenserscheinungen nämlich als Aeußerungen einer eigenthümlichen Kraft angesehen werden, so müssen die Wirkungen dieser Kraft an gewisse erforschbare Gesetze gebunden sein, die mit den allgemeinsten Gesetzen des Widerstandes und der Bewegung im Einklange sind, welche die Weltkörper und Weltkörpersysteme in ihren Bahnen erhalten, wodurch Form- und Beschaffenheitsänderungen in den Körpern bedingt werden, ganz abgesehen von dem Stoff, welcher als Träger der Lebenskraft sich darstellt, oder der Form, in der sich die Lebenskraft äußert.

Die Lebenskraft giebt sich in einem belebten Körpertheil als eine Ursache der Zunahme an Masse, sowie des Widerstandes gegen äußere Thätigkeiten zu erkennen, welche die Form, Beschaffenheit und Zusammensetzung der Elementartheilchen ihres Trägers zu ändern streben.

Als eine Kraft der Bewegung, Form- und Beschaffenheitsänderung der Materie zeigt sie sich durch Störung und Aufhebung des Zustandes der Ruhe, in dem sich die chemischen Kräfte befinden, durch welche die Bestandtheile der ihren Trägern zugeführten Verbindungen, die wir als Nahrungsstoffe kennen, zusammengehalten werden.

Die Lebenskraft bewirkt eine Zersetzung dieser Nahrungsstoffe, sie hebt die Kraft der Anziehung auf, die zwischen ihren kleinsten Theilchen unausgesetzt thätig ist, sie ändert die Richtung der chemischen Kräfte in der Art, daß die Elemente der Nahrungsstoffe sich in einer andern Weise ordnen,

daß sie zu neuen, den Trägern der Lebenskraft gleichen oder unähnlichen Verbindungen zusammentreten; sie ändert die Richtung und Stärke der Cohäsionskraft, sie hebt den Cohäsionszustand der Nahrungsmittel auf und zwingt die neuen Verbindungen, zu Formen zusammenzutreten, welche keine Aehnlichkeit mit den Formen haben, welche durch die frei (ohne Widerstand) wirkende Cohäsionskraft gebildet werden.

Die Lebenskraft äußert sich als eine Kraft der Anziehung, insofern die durch die Form- und Beschaffenheitsänderung des Nahrungsstoffes neu gebildete Verbindung, bei gleicher Zusammensetzung mit ihrem Träger, zu einem Bestandtheil dieses Trägers wird.

Die dem Träger der Lebenskraft unähnlichen, neuerzeugten Verbindungen treten aus dem Körpertheile aus, sie erleiden in der Form gewisser Secretionen, anderen Körpertheilen zugeführt, bei ihrer Berührung damit, eine Reihe ähnlicher Veränderungen.

Als Widerstand giebt sich die Lebenskraft in belebten Körpertheilen zu erkennen, insofern durch sie, durch ihr Vorhandensein in ihren Trägern, die Elemente derselben das Vermögen erlangen, Störungen und Aenderungen in ihrer Form und Zusammensetzung durch äußere Thätigkeiten zu widerstehen, eine Fähigkeit, die sie für sich als chemische Verbindungen nicht besitzen.

Wie bei anderen Kräften umfaßt der Begriff einer ungleichen Intensität der Lebenskraft in einem belebten Körpertheil nicht nur die ungleiche Fähigkeit der Zunahme an

Masse und der Ueberwindung von (chemischen) Widerständen, sondern man bezeichnet damit auch gradezu die Verschiedenheit in der Größe des Widerstandes selbst, den die Theile oder Bestandtheile eines belebten Körpertheils einer Aenderung in der Form und Zusammensetzung durch neue äußere einwirkende Ursachen entgegensetzen; ganz ähnlich wie die Stärke der Cohäsionskraft oder der Affinität in gradem Verhältniß steht zu dem Widerstande, den diese Kräfte einer äußern mechanischen oder chemischen Ursache entgegensetzen, welche die Theile einer Verbindung von einander zu trennen strebt.

Die Aeußerungen der Lebenskraft sind abhängig von einer gewissen Form ihrer Träger und einer bestimmten Zusammensetzung der Substanz des lebendigen Körpertheils.

Die Fähigkeit der Zunahme an Masse in einem belebten Körpertheil wird bedingt durch die unmittelbare Berührung mit Stoffen, die sich zu einer Zersetzung eignen, oder deren Elementartheile zu Bestandtheilen des Trägers der Lebensthätigkeit übergehen können.

Die Aeußerung der Zunahme setzt voraus, daß die einwirkende Lebenskraft mächtiger ist, als der Widerstand, den die chemische Kraft einer Zersetzung oder Umsetzung der Elementartheile der Nahrungsstoffe ihr entgegensetzt.

Die Aeußerungen der Lebenskraft sind abhängig von einer gewissen Temperatur; weder in einer Pflanze, noch in einem Thiere zeigen sich Lebenserscheinungen, wenn die Temperatur in gewissen Verhältnissen abnimmt.

Die Lebenserscheinungen eines belebten Organismus nehmen an Stärke und Intensität durch Wärmeentziehung ab, wenn die Temperatur, welche er besitzt, nicht durch andere Ursachen wieder erneuert wird.

Entziehung von Nahrungsstoff setzt allen Lebensäußerungen eine bestimmte Grenze.

Der Contact der belebten Körpertheile mit Nahrungsstoff wird in dem Thierorganismus bedingt durch eine mechanische Kraft, welche in ihm selbst erzeugt wird und gewissen Organen die Fähigkeit giebt, Ortsveränderungen zu bewirken, eine mechanische Bewegung hervorzubringen, mechanische Widerstände aufzuheben.

Man kann einem ruhenden Körper eine gewisse Bewegung ertheilen durch eine Menge in ihren Aeußerungen höchst verschiedener Kräfte; wir setzen ein Uhrwerk in Bewegung durch ein fallendes Gewicht (durch die Schwere), durch eine gespannte Feder (durch Elasticität). Wir bringen jede Art von Bewegungen hervor durch die elektrische oder magnetische Kraft, sowie durch die chemischen Kräfte, ohne daß wir im Stande sind zu sagen, wenn wir die Aeußerung dieser Thätigkeiten nur in ihrer Erscheinung ins Auge fassen, durch welche von diesen verschiedenen Ursachen des Ortswechsels der ruhende Körper die Bewegung oder Geschwindigkeit empfangen hat.

In dem Organismus des Thieres kennen wir nur eine Quelle der bewegenden Kraft, und diese Quelle ist die nämliche Ursache, welche die Zunahme belebter Körpertheile an

Masse bedingt, welche ihnen das Vermögen giebt, äußeren Actionen Widerstand zu leisten, es ist die Lebenskraft.

Um zu einer klaren Einsicht dieser in ihrer Form so verschiedenen Aeußerungen der Lebenskraft zu gelangen, muß man sich erinnern, daß eine jede Kraft sich in einer Materie durch zwei für die Beobachtung durchaus verschiedene Zustände der Thätigkeit zu erkennen giebt.

Die in den Theilchen eines Steins vorhandene Kraft der Schwere ertheilt ihnen ein unausgesetztes Streben, sich nach dem Mittelpunkte der Erde hinzubewegen.

Für die Wahrnehmung verschwindet diese Thätigkeit, wenn der Stein z. B. auf einem Tische liegt, dessen Theile der Aeußerung seiner Schwere einen Widerstand entgegensetzen. Die auf ihn wirkende Kraft ist stets vorhanden, sie äußert sich als Druck auf die Unterlage, allein er bleibt auf seinem Platze, er besitzt keine Bewegung. Mit Gewicht bezeichnen wir die Aeußerung seiner Schwere im Zustande der Ruhe.

Was den Stein am Fallen hindert, ist ein Widerstand, welcher bewirkt wird durch eine Kraft der Anziehung, mit welcher die Theilchen des Holzes zusammenhängen; eine Wassermasse würde ihn am Fallen nicht gehindert haben.

Wenn die Kraft, welche die Theilchen des Steins nach dem Mittelpunkte der Erde hintreibt, größer wäre als die Kraft, womit die Holztheilchen zusammenhängen, so würde die Cohäsionskraft überwunden werden, sie würde den Stein am Fallen nicht hindern können.

Nehmen wir den Tisch und damit die Kraft hinweg, welche die Aeußerung der Schwere aufgehoben hatte, so zeigt sich die letztere als die Ursache der Ortsveränderung des Steins, er kommt in Bewegung, d. h. er fällt: Widerstand ist stets eine Kraft.

Je nachdem wir ihn kürzere oder längere Zeit fallen lassen, erlangt er Fähigkeiten, die er im ruhenden Zustande nicht besaß, er erhält nämlich das Vermögen, schwächere oder stärkere Widerstände (Kräfte) aufzuheben, oder ruhenden Körpern Bewegung mitzutheilen.

Von einer gewissen Höhe herabfallend macht er einen bleibenden Eindruck an dem Orte, den er berührt, von einer noch größern Höhe (längere Zeit) fallend, macht er ein Loch in die Tischplatte; seine eigene Bewegung theilt sich einer gewissen Anzahl Holztheilchen mit, die nun mit dem Steine selbst fallen. Keine dieser Eigenschaften besaß der ruhende Stein.

Die erlangte Geschwindigkeit ist stets die Wirkung der bewegenden Kraft. Sie ist unter sonst gleichen Umständen dem Druck proportional.

Ein frei fallender Körper gewinnt nach einer Sekunde eine Geschwindigkeit von 30 Fuß. Derselbe Körper auf dem Monde fallend, würde in einer Sekunde nur eine Geschwindigkeit von $^{30}/_{3600} = 0{,}1$ Zoll gewinnen, weil dort die Intensität der Schwere (der Druck, welcher auf den Körper wirkt, die bewegende Kraft) 3600 mal kleiner ist.

Wenn der Druck gleichförmig fortwirkt, so steht die Ge-

ſchwindigkeit genau im Verhältniß zum Druck, dergeſtalt, daß z. B. der 3600mal langſamer fallende Körper nach 3600 Sekunden dieſelbe Geſchwindigkeit annimmt, wie der andere nach einer Sekunde.

Die Wirkung iſt folglich nicht der bewegenden Kraft allein, noch der Zeit allein, ſondern dem Druck, multiplicirt mit der Zeit = Kraftmoment, proportional.

In zwei gleichen Körpermaſſen bezeichnet die Geſchwindigkeit das Kraftmoment. Unter dem Einfluß deſſelben Drucks bewegt ſich aber ein Körper um ſo langſamer, je größer ſeine Maſſe; die doppelte Maſſe braucht, um in gleicher Zeit eine gleiche Geſchwindigkeit zu erlangen, einen doppelten Druck, oder ſie muß unter dem einfachen Drucke eine doppelt ſo lange Zeit in Bewegung bleiben.

Um einen Ausdruck für die ganze eingetretene Wirkung zu haben, muß man daher, die Maſſe mit ihrer Geſchwindigkeit multipliciren.

Dieſes Product heißt Bewegungsgröße.

Die Größe der Bewegung eines Körpers muß in allen Fällen dem Kraftmoment genau entſprechen.

Größe der Bewegung und Kraftmoment wird auch ſchlechtweg mit Kraft bezeichnet, weil man ſich vorſtellt, daß ein kleiner Druck, der z. B. 10 Sekunden gewirkt hat, ebenſoviel werth iſt, als ein zehnmal größerer Druck, der nur eine Sekunde thätig war.

Bewegungsmoment heißt in der Mechanik die Wirkung einer Kraft ohne Rückſicht auf die Zeit (Geſchwindig-

keit), in welcher sie zur Aeußerung kam. — Wenn ein Mann z. B. dreißig Pfunde 100 Fuß hoch hebt, ein zweiter dreißig Pfund auf 200 Fuß Höhe, so hat der zweite doppelt so viel Kraft wie der erste verwendet; ein dritter welcher 60 Pfund auf 50 Fuß Höhe gehoben hat, verbraucht dazu nicht mehr Kraft wie der erste, um 30 Pfund 100 Fuß hoch zu heben. Die Bewegungsmomente des ersten (30×100) und des dritten (60×50) sind sich gleich, das Bewegungsmoment des zweiten (30×200) ist doppelt so groß.

Kraftmomente und Bewegungsmomente sind demnach in der Mechanik Ausdrücke oder Maßstäbe für Kraftwirkungen, die sich auf eine in gegebener Zeit erlangte Geschwindigkeit oder auf einen gegebenen Raum beziehen; in diesem Sinne lassen sie sich auf die Wirkungen aller anderen Ursachen der Bewegung, Form- und Beschaffenheitsveränderung übertragen, wie groß oder wie klein auch der Raum oder die Zeit sein mag, in der sich ihre Wirkung für die Sinne offenbart.

Eine jede Kraft äußert sich demnach in der Materie als Widerstand gegen äußere Ursachen der Orts- (Form- und Beschaffenheits-) Veränderung; als Bewegung-erzeugende Kraft zeigt sie sich, wenn ihr keine Widerstände entgegenstehen oder in der Ueberwindung von Widerständen.

Eine und dieselbe Kraft wirkt Bewegung mittheilend und Bewegungen vernichtend; in dem einen Falle, wenn ihrer Thätigkeitsäußerung keine Widerstände entgegenstehen; in dem andern, wenn sie selbst die Aeußerung einer

andern Ursache der Bewegung (Form- und Beschaffenheits-Aenderung) aufhebt. Gleichgewicht (oder Ruhe) heißt der Zustand der Thätigkeit, wo ein Kraft- oder Bewegungsmoment, durch ein entgegengesetztes Kraft- oder Bewegungsmoment aufgehoben ist.

Beide Thätigkeitsäußerungen beobachten wir an der Kraft, welche den belebten Körpertheilen ihre eigenthümlichen Eigenschaften giebt.

Durch Aufhebung der zwischen den Bestandtheilen der Nahrungsstoffe wirkenden chemischen Kräfte (der Cohäsion und Affinität), durch Aenderung der Lage oder des Ortes, in welchem sich ihre Elementartheilchen befinden, giebt sich die Lebenskraft als bewegende Kraft zu erkennen; sie äußert sich als Bewegung erzeugende Kraft durch Ueberwindung der chemischen Anziehung der Bestandtheile der Nahrungsstoffe und als die Ursache, die sie zwingt, sich in einer neuen Ordnung mit einander zu vereinigen.

Es ist klar, daß einem belebten Körpertheil, welcher also die Fähigkeit besitzt, Widerstände aufzuheben und den Elementartheilchen der Nahrungsstoffe eine Bewegung mitzutheilen durch die in ihm frei sich äußernde Lebenskraft, ein Bewegungsmoment zukommen muß, was ja nichts anderes ist, als das Maß der eingetretenen Bewegung, Form- und Beschaffenheits-Aenderung.

Wir wissen, daß dieses Bewegungsmoment der Lebenskraft in einem belebten Körpertheil verwendbar ist, um ruhenden Materien Bewegung zu ertheilen (Zersetzung zu bewirken, Widerstände aufzuheben), und wenn die Lebenskraft

in ihren Aeußerungen sich ähnlich verhält wie andere Kräfte, so muß dieses Bewegungsmoment mitgetheilt oder fortgepflanzt werden können durch Materien, die in sich selbst durch eine entgegenwirkende Thätigkeit seine freie Aeußerung nicht aufheben.

Die durch irgend eine Ursache gewonnene Bewegung eines Stoffes oder einer Materie kann in sich selbst nicht vernichtet werden, sie kann zwar für die Wahrnehmung verschwinden, allein auch aufgehoben durch Widerstände (durch entgegengesetzte Kraftwirkungen) wird ihr Effect nicht vernichtet. Der fallende Stein übt durch seine im Fallen gewonnene Bewegungsgröße, auf dem Tische angelangt, eine Wirkung aus; der hervorgebrachte Eindruck auf das Holz, die Geschwindigkeit, welche von der seinigen sich auf die Holztheile überträgt, ist sein Effect.

Uebertragen wir die Begriffe von Bewegung, Gleichgewicht und Widerstand auf die chemischen Kräfte, die in ihrer Wirkungsweise der Lebenskraft unendlich näher stehen, als die Schwere, so wissen wir mit der größten Bestimmtheit, daß sie nur bei unmittelbarer Berührung sich thätig zeigen; wir wissen, daß die ungleiche Fähigkeit chemischer Verbindungen, Widerstand gegen äußere Störungen zu leisten, gegen die Einwirkung der Wärme, der elektrischen Kraft, die ihre Theilchen zu trennen streben, so wie ihr Vermögen Widerstände in anderen Verbindungen aufzuheben (Zersetzung zu bewirken), daß mit einem Worte die in einer Verbindung thätige Kraft, abhängig ist von einer gewissen Ordnung, in welcher sich ihre Elementartheilchen berühren.

Die nämlichen Elemente in einer andern Ordnung mit einander vereinigt, äußern mit anderen Verbindungen in Berührung eine höchst ungleiche Fähigkeit Widerstand zu leisten oder Widerstände aufzuheben, in der einen Form ist die zur Aeußerung gelangte Kraft verwendbar (der Körper ist activ, eine Säure z. B.), in der andern nicht (er ist indifferent), in einer dritten Form ist sein Kraftmoment der ersten entgegengesetzt (er ist activ, aber eine Basis).

Aendern wir die Ordnung der Elemente, so sind wir im Stande, die Bestandtheile einer Verbindung durch einen andern activen Körper zu trennen, die, in einer andern Form vereinigt, seiner Action einen unüberwindlichen Widerstand entgegensetzten.

Aehnlich wie zwei gleiche unelastische Massen von gleicher Geschwindigkeit, die aus entgegengesetzter Richtung getrieben, mit einander in Berührung kommend, zur Ruhe gelangen, ähnlich also wie zwei gleiche aber entgegengesetzte Bewegungsmomente sich gegenseitig aufheben, kann das Kraftmoment einer chemischen Verbindung, durch ein gleiches aber entgegengesetztes Kraftmoment einer zweiten Verbindung ganz oder zum Theil aufgehoben, allein es kann nicht vernichtet werden, so lange die Ordnung nicht gestört wird, durch welche die in ihnen wohnende Kraft zur Aeußerung gelangt ist.

Die chemische Kraft der Schwefelsäure ist im Gyps eben so ungeschwächt vorhanden, als im Vitriolöl, aber für die Wahrnehmung ist sie verschwunden; nehmen wir die Ursache hinweg, die ihre Aeußerung auf andere Materien aufhob,

so zeigt sie sich in ihrem Träger mit ihrer ganzen Stärke.

So kann die Cohäsionskraft eines festen Körpers durch eine chemische Kraft (in der Auflösung), durch Wärme (beim Schmelzen), für die Beobachtung völlig verschwinden, ohne daß sie nur entfernt geschwächt oder vernichtet wäre. Entfernen wir die ihr entgegenwirkende Kraftäußerung (den Widerstand), so zeigt sie sich in der Krystallisation unverändert.

Durch die elektrische Kraft, durch die Wärme, sind wir im Stande, der chemischen Kraft in ihren Aeußerungen die mannigfaltigsten Richtungen zu geben; wir stellen damit die Ordnung fest, in welcher sich die Elementartheilchen vereinigen sollen. Nehmen wir die Ursache hinweg (Wärme, elektrische Kraft), die ihrer schwächeren Anziehung nach der einen Richtung hin das Uebergewicht gab, so wird die stärkere Anziehung nach einer andern Richtung hin sich unausgesetzt thätig zeigen, und wenn diese stärkere Anziehung das Beharrungsvermögen der Elementartheilchen überwinden kann, so werden sich die Elementartheile in einer neuen Form mit einander vereinigen, das ist, es wird eine neue Verbindung von veränderten Eigenschaften gebildet werden müssen.

In Verbindungen dieser Art, in welchen also die freie Aeußerung der chemischen Kraft, durch andere Kräfte gehindert wurde, kann ein Stoß, eine mechanische Reibung, die Berührung mit einer Materie, deren Elementartheile sich im Zustande der Bewegung (Umsetzung, Zersetzung) be-

finden, irgend eine Ursache von Außen, deren Thätigkeit sich der stärkeren Anziehung der Elementartheilchen nach einer andern Richtung hinzufügt, hinreichen, um dieser stärkeren Anziehung das Uebergewicht zu geben, das Beharrungsvermögen zu überwinden, ihre Form und Beschaffenheit, welche sie der Mitwirkung fremder Ursachen verdanken, zu ändern, ein Zerfallen der Verbindung in eine oder mehrere neue Körper von veränderten Eigenschaften zu bewirken.

Umsetzungen, oder wenn man will, Bewegungserscheinungen, können in Verbindungen dieser Classe, bewirkt werden durch die in einer andern chemischen Verbindung frei und verwendbar wirkende chemische Kraft, und zwar ohne daß ihre Aeußerung durch Widerstände erschöpft oder aufgehoben wird. So wird das Gleichgewicht in der Anziehung der Elemente des Rohrzuckers, durch Berührung mit einer sehr kleinen Menge Schwefelsäure aufgehoben; er verwandelt sich in Traubenzucker; ganz ähnlich sehen wir die Elemente des Amylons sich mit den Elementen des Wassers zu einer neuen Form ordnen, ohne daß die Schwefelsäure, welche gedient hatte, um diese Umsetzung zu bewirken, ihren chemischen Charakter verliert, sie bleibt in Bezug auf andere Materien, auf die sie eine Wirkung äußert, ebenso activ als wie vorher, grade so, als wenn sie keine Art von Wirkung auf das Amylon ausgeübt hätte.

Ganz verschieden von der Aeußerung der sogenannten mechanischen Kräfte haben wir in den chemischen Kräften

Urſachen von Bewegungserſcheinungen, von Form- und Beſchaffenheitsänderungen, ohne wahrnehmbare Erſchöpfung der Kraft, wodurch ſie hervorgerufen werden, erkannt; allein der Grund der fortdauernden Thätigkeitsäußerung bleibt ſtets derſelbe, es iſt der Mangel einer entgegengeſetzten Thätigkeit (eines Widerſtandes), der ſie aufzuheben oder ins Gleichgewicht zu ſetzen fähig iſt.

Aehnlich wie die Aeußerungen der chemiſchen Kräfte (das Kraftmoment einer chemiſchen Verbindung) abhängig erſcheinen von einer beſtimmten Ordnung, in der ſich ihre Elementartheilchen berühren, zeigt die Erfahrung, daß die Lebenserſcheinungen unzertrennlich von der Materie ſind, daß die Aeußerungen der Lebenskraft in einem belebten Körpertheil bedingt werden durch eine gewiſſe Form des Trägers und durch eine gewiſſe Ordnungsweiſe ſeiner Elementartheilchen; heben wir die Form oder Zuſammenſetzung des Organs auf, ſo verſchwinden alle Lebensäußerungen.

Nichts hindert uns, die Lebenskraft als eine beſondere Eigenſchaft zu betrachten, die gewiſſen Materien zukommt, und wahrnehmbar wird, wenn ihre Elementartheilchen zu einer gewiſſen Form zuſammengetreten ſind.

Dieſe Vorſtellung nimmt den Lebenserſcheinungen nichts von ihrer wunderbaren Eigenthümlichkeit, man kann ſie als einen Anhaltspunkt betrachten, von dem aus ſich eine Unterſuchung derſelben, ſowie die Erforſchung ihrer Geſetze anknüpfen läßt, ganz ſo wie man die Eigenſchaften und Geſetze der Bewegungen des Lichts, als abhängig von einer

Lichtmaterie, oder einem Aether betrachtet, der mit den erforschten Gesetzen nichts weiter zu thun hat.

In dieser Form gedacht, vereinigt die Lebenskraft in ihren Aeußerungen alle Eigenthümlichkeiten der chemischen Kräfte und der nicht minder wunderbaren Ursache, die wir als den letzten Grund der elektrischen Erscheinungen ansehen.

Die Lebenskraft äußert sich nicht wie die Schwerkraft oder magnetische Kraft in unendlichen Entfernungen, sondern sie ist, wie die chemischen Kräfte, nur bei unmittelbarer Berührung thätig, sie wird durch einen Complex materieller Theile wahrnehmbar.

Ein belebter Körpertheil erhält nach obiger Voraussetzung die Fähigkeit, Widerstand zu leisten und Widerstände aufzuheben, durch das Zusammentreten seiner Elementartheilchen in einer gewissen Form und er muß, so lange diese Form und Ordnung durch entgegengesetzte Kräfte nicht aufgehoben wird, seine Kraft unausgesetzt zu behaupten vermögen.

Wenn durch den Act der Thätigkeitsäußerung eines belebten Körpertheils die Elemente der Nahrungsstoffe in der ihm gleichen Form und Beschaffenheit zusammengetreten sind, so erlangen sie eine ihm gleiche Fähigkeit; es gelangt durch dieses Zusammentreten die in ihnen wohnende Lebenskraft zur freien Aeußerung, sie wird in gleicher Weise verwendbar.

Wenn man sich nun erinnert, daß alle Nahrungsstoffe belebter Organismen Verbindungen zweier oder mehrerer Elemente sind, welche durch chemische Kräfte zusammengehal-

ten werden, wenn man erwägt, daß in dem Act der Thätigkeitsäußerung eines belebten Körpertheils die Elemente der Nahrungsstoffe in einer andern Ordnung zusammentreten, so ist völlig gewiß, daß das Kraft- oder Bewegungsmoment der Lebenskraft stärker war, als die zwischen den Elementen der Nahrung sich äußernde chemische Anziehung *).

Die chemische Kraft, welche die Bestandtheile zusammenhielt, wirkte gleich einem Widerstande, welcher überwunden wurde durch die active Lebenskraft.

Wären beide gleich gewesen, so würde keine Art von wahrnehmbarer Wirkung eingetreten sein; bei überwiegender chemischer Action würde der belebte Körpertheil eine Veränderung erlitten haben.

Wenn wir uns nun denken, daß eine gewisse Quantität von Lebenskraft dazu verwendet werden mußte, um sich mit der chemischen Kraft ins Gleichgewicht zu setzen, so bleibt immer noch ein Ueberschuß von Kraft, durch welchen die Zersetzung bewirkt wurde; in diesem Ueberschuß besteht das Kraftmoment des belebten Körpertheils, durch den die Zersetzung bewerkstelligt wurde; er erhält durch ihn ein dauerndes Vermögen, weitere Zersetzungen zu bewirken und seinen

*) Die Hände eines Mannes, welcher mit einem Seile 30 Pfund 100 Fuß hoch hebt, legen einen Weg von 100 Fuß zurück, während seine Muskelthätigkeit einem Widerstand (Druck) von 30 Pfunden das Gleichgewicht hält. Wäre die von dem Manne anwendbare Kraft nicht größer, als um dem Druck von dreißig Pfunden das Gleichgewicht zu halten, so würde er nicht vermögend sein, das Gewicht zu der angegebenen Höhe zu heben.

Zustand, seine Form und Beschaffenheit gegen äußere Actionen zu behaupten.

Wir können uns denken, daß dieser Ueberschuß hinweggenommen und in einer andern Weise verwendet werden kann; das Bestehen des belebten Körpertheils würde dadurch nicht gefährdet werden, eben weil in diesem Falle ein Ruhe- und Gleichgewichtszustand eintreten würde; allein mit der Hinwegnahme dieses Ueberschusses würde er seine Fähigkeit der Zunahme an Masse, sein Vermögen weitere Zersetzungen zu bewirken, äußeren Ursachen von Störungen zu widerstehen, verlieren. Wenn ihm in diesem Gleichgewichtszustande Sauerstoff (eine chemische Action) zugeführt werden würde, so würde dessen Streben, sich mit einem Elemente des belebten Körpertheils zu vereinigen, kein Hinderniß entgegenstehen, eben weil ihm das Vermögen, Widerstand zu leisten, durch anderweitige Verwendung von Lebenskraft genommen worden ist. Je nach der Menge des zugeführten Sauerstoffs würde eine entsprechende Menge des belebten Körpertheils seinen Zustand des Lebens verlieren und die Form einer chemischen Verbindung erhalten von einer dem belebten Stoff unähnlichen Zusammensetzung, es würde mit einem Worte ein Wechsel in den Eigenschaften der belebten Verbindung, ein Stoffwechsel entstehen.

Wenn wir erwägen, daß die Fähigkeit der Zunahme an Masse in der Pflanze beinahe keine Grenze hat, daß hundert Weidenzweige, von einem Baume genommen, zu hundert Bäumen werden, so kann man kaum einen Zweifel hegen,

daß mit dem Zuſammentreten der Elemente des Nahrungsſtoffs zu einem Beſtandtheil der Pflanze, zu dem vorhandenen Kraftmoment, in dem neugebildeten Pflanzentheile ein neues Kraftmoment hinzukommt, in der Art, daß mit der Zunahme an Maſſe die Summe von Lebenskraft wächſt.

Je nach der Quantität verwendbarer Lebenskraft ändern ſich die Producte, die durch ihre Thätigkeit aus dem zugeführten Nahrungsſtoff gebildet werden. Die Beſtandtheile der Knospe, der Wurzelfaſer, des Blattes, der Blüthe und Frucht ſind höchſt verſchieden; die chemiſche Kraft, wodurch ihre Elemente zuſammen gehalten werden, iſt ſehr ungleich.

Von den ſtickſtofffreien Beſtandtheilen der Pflanzen kann man behaupten, daß kein Theil des Kraftmomentes verwendet wird, um ihre Form und Beſchaffenheit zu behaupten, ſobald ihre Elemente einmal in der Ordnung zuſammengetreten ſind, in der ſie zu Trägern der Lebenskraft werden.

Ganz verſchieden verhalten ſich die ſtickſtoffhaltigen Pflanzenſtoffe, denn ſie gehen, wie man gewöhnlich ſagt, von der Pflanze getrennt, von ſelbſt in Gährung und Fäulniß über. Die Urſache dieſer Zerſetzung oder Umſetzung ihrer Elemente iſt die chemiſche Action, welche der Sauerſtoff auf einen ihrer Beſtandtheile ausübt. Wir wiſſen nun, daß, ſo lange die Pflanze Lebenserſcheinungen zeigt, Sauerſtoffgas von ihrer Oberfläche abgeſchieden wird, daß dieſer Sauerſtoff ohne alle Wirkung iſt auf die Beſtandtheile der lebendigen Pflanze, zu denen er ſonſt die größte Anziehung beſitzt, und es iſt klar, daß eine gewiſſe Quantität Lebenskraft

verwendet werden muß, theils um die Elemente der complexen stickstoffhaltigen Bestandtheile, in der Form, Beschaffenheit und Ordnung zu erhalten, die ihnen zukommt, theils als Widerstand gegen die unaufhörliche Einwirkung des Sauerstoffs der Luft auf ihre Elemente, so wie des Sauerstoffs, der in ihrem Organismus durch den Lebensproceß abgeschieden wird.

Mit der Zunahme an diesen veränderlichen Bestandtheilen, in der Blüthe z. B. und in der Frucht, wächst die Summe von chemischer Kraft, deren freie Aeußerung durch ein entsprechendes Maß von Lebenskraft im Gleichgewicht gehalten, als Widerstand verbraucht wird.

Die Pflanze nimmt so lange an Masse zu, bis sich die in ihr wohnende Lebenskraft mit allen äußeren Ursachen, die ihrer Aeußerung entgegenwirken, ins Gleichgewicht gesetzt hat, eine jede neue Ursache von Störung, die sich den vorhandenen hinzufügt (Temperaturwechsel ꝛc.), nimmt ihr jetzt die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, sie stirbt ab.

In den perennirenden Pflanzen (den Holzpflanzen z. B.) ist die Masse der veränderlichen Bestandtheile (der stickstoffhaltigen), verglichen mit den stickstofffreien, so klein, daß von der ganzen Summe von Kraft, als Widerstand, nur ein verschwindendes Moment verbraucht wird; bei den jährigen Pflanzen ist dieses Verhältniß umgekehrt.

In allen Perioden des Lebens einer Pflanze wird die vorhandene active (durch Widerstände nicht aufgehobene) Lebenskraft nur zu einer Form von Lebensäußerung verwen-

det, zur Zunahme an Masse nämlich, zur Ueberwindung von Widerständen; kein Theil der Kraft wird zu anderen Zwecken verbraucht.

In dem Organismus des Thieres zeigt sich die Lebenskraft, wie in der Pflanze in der Fähigkeit der Zunahme an Masse, als die Ursache des Widerstandes gegen äußere Einwirkungen, allein die Zunahme so wie der Widerstand sind in gewisse Grenzen eingeschlossen.

Wir beobachten nämlich, daß der Uebergang der Nahrungsstoffe in Blut, die Berührung des Blutes mit den belebten Körpertheilen bedingt wird von einer mechanischen Kraft, deren Aeußerung von besonderen Organen ausgeht und vermittelt wird durch ein besonderes System von Apparaten, denen die Fähigkeit zukommt, die empfangene Bewegung fortzupflanzen und zu verbreiten; von einem zweiten Systeme ähnlicher Apparate finden wir das Vermögen des Thieres abhängig, den Ort zu wechseln und durch seine Glieder mechanische Effecte hervorzubringen. Diese Apparate, so wie die von ihnen ausgehenden Bewegungserscheinungen, fehlen in der Pflanze.

Um sich ein klares Bild über den Ursprung und die Quelle der mechanischen Bewegungen im Thierkörper zu verschaffen, dürfte es eine Erleichterung sein, sich an die Wirkungsweise anderer Kräfte zu erinnern, welche der Lebenskraft in ihren Aeußerungen am nächsten stehen.

Wenn wir eine Anzahl Zink- und Kupferplatten in einer gewissen Weise geordnet mit einer Säure in Berührung

bringen, so tritt, wenn man die beiden äußersten Punkte des Apparates mit einem Metalldraht in Verbindung setzt, eine chemische Action an den Zinkplatten ein, und der Draht erhält in Folge dieser Action die merkwürdigsten und wunderbarsten Eigenschaften.

Dieser Draht zeigt sich nämlich als der Träger einer Kraft, welche durch ihn mit außerordentlicher Schnelligkeit nach allen Richtungen hingeleitet und fortgepflanzt werden kann; er ist der Leiter oder Fortpflanzer einer ununterbrochenen Reihe von Thätigkeits-Aeußerungen.

Eine solche Fortpflanzung von Bewegung ist nicht denkbar, wenn in dem Drahte eine Ursache des Widerstandes zu überwinden wäre, jeder Widerstand würde einen Theil der bewegenden Kraft zur ruhenden machen.

Wird der Draht in der Mitte zerschnitten, sein Zusammenhang unterbrochen, so hört damit die Fortpflanzung der Kraft auf, und wir sehen, daß in diesem Falle die Action der Säure auf das Zink augenblicklich aufhört.

Stellen wir die Verbindung wieder her, so tritt die verschwundene Action mit ihrer ganzen Energie wieder ein.

Wir können durch die in dem Drahte vorhandene Thätigkeit eine Menge der verschiedenartigsten Effecte bewirken, Widerstände aller Art überwältigen, Lasten heben, Schiffe in Bewegung setzen, und, was noch weit merkwürdiger ist, dieser Draht verhält sich wie eine hohle Röhre, in welcher ein Strom von chemischer Kraft frei und ohne Hinderniß circulirt.

Die Eigenschaften, die wir als festgekettet an gewisse Materien mit dem Ausdruck der stärksten und energischsten Verwandtschaft bezeichnen, wir finden sie, dem Anschein nach, frei und ungebunden an diesem Drahte wieder, wir können sie, von ihm aus, auf andere Materien übertragen und ihnen damit eine Affinität (die Fähigkeit, Verbindungen einzugehen) ertheilen, die ihnen für sich nicht zukommt; je nach der Quantität der Kraft, die in dem Drahte circulirt, können wir damit Verbindungen zerlegen, deren Elemente die mächtigste Verwandtschaft zu einander haben, und an allen diesen Thätigkeitsäußerungen nimmt die Substanz des Drahtes nicht den geringsten Antheil, er ist nur der Leiter der Kraft.

An diesem Drahte beobachten wir noch überdies Erscheinungen der Anziehung und Abstoßung, die wir dem aufgehobenen Gleichgewichtszustande der elektrischen und magnetischen Kraft zuschreiben müssen, und es stellen sich bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts des gestörten elektrischen Zustandes, Licht und Wärme, als ihre nie fehlenden Begleiter ein.

Alle diese merkwürdigen Erscheinungen werden hervorgerufen durch die chemische Action, welche Säure und Zink auf einander ausüben, sie sind begleitet von einer Form- und Beschaffenheitsänderung, welche beide erleiden.

Die Säure verliert ihren chemischen Character, das Zink geht eine Verbindung mit ihr ein. Die in dem Metalldrahte hervorgerufenen Thätigkeitsäußerungen, sie sind eine

unmittelbare Folge des Wechsels in ihren Eigenschaften.

Ein Theilchen Säure nach dem andern verliert seine, ihm zukommenden, chemischen Eigenschaften und wir sehen, daß in eben diesem Grade der Draht eine chemische, mechanische, galvanische oder magnetische Kraft, oder wie man sie nennen will, empfängt; je nach der Anzahl von Theilchen der Säure, welche in einer und derselben Zeit diese Veränderung erfahren (je nach der Oberfläche des Zinks), empfängt der Draht eine größere oder geringere Quantität von diesen Kräften.

Die Fortdauer des Stromes von Kraft hängt ab von der Fortdauer der chemischen Action, die Fortdauer der chemischen Action ist aufs engste geknüpft, an die Ableitung der Kraft.

Hindern wir die Fortpflanzung der Kraft, so behält die Säure ihren chemischen Character; wird sie zur Ueberwindung von chemischen oder mechanischen Widerständen verbraucht, zur Zersetzung chemischer Verbindungen oder zur mechanischen Bewegung, so dauert die chemische Action fort, das heißt, ein Theilchen Säure nach dem andern wechselt seine Eigenschaften.

Wir haben in dem Vorhergehenden diese merkwürdigen Erscheinungen in einer Form aufgefaßt, welche unabhängig von den Erklärungen der Schule ist. Ist die in dem Drahte circulirende Kraft, die elektrische Kraft? ist es Affinität? pflanzt sie sich in dem Leiter wie eine in Bewegung gesetzte Flüssigkeit, oder als eine Reihe von Bewegungsmomenten,

wie der Schall, das Licht, von einem Theilchen des Leiters zu dem andern fort? Alles dieses weiß man nicht, und wird es nie ermitteln. Auf die Wahrheit der Erscheinungen haben alle Vorstellungen, die man ihnen als Erklärungen unterlegt, nicht den geringsten Einfluß, denn sie beziehen sich lediglich auf die Form, in welcher sie sich äußern.

Nur darüber ist man nicht im Zweifel, daß nämlich alle Effecte, welche durch den Draht hervorgebracht werden können, bedingt werden von dem Wechsel in den Eigenschaften des Zinks und der Säure, denn der Ausdruck »chemische Action« bezeichnet ja nicht mehr und nicht weniger, als den Act ihrer Veränderung; daß sie abhängig sind, von dem Vorhandensein eines Leiters, einer Substanz, welche die eintretende Thätigkeitsäußerung, das Kraftmoment, fortpflanzt nach allen Richtungen hin, wo es durch Widerstände nicht aufgehoben wird, daß es also in ein Bewegungsmoment übergeht, mit dem man mechanische Bewegungen hervorbringen kann, was, auf andere Körper übertragen, diesen alle Eigenschaften giebt, deren letzte Ursache die chemische Kraft selbst ist; sie erhalten das Vermögen, Zersetzungen und Verbindungen zu bewirken, was ihnen, ohne Zufuhr an Kraft, durch den Leiter, völlig abgehen würde.

Wenn wir diese wohlbekannten Erfahrungen als Mittel benutzen, um, durch sie geführt, die letzte Ursache der mechanischen Effecte im Thierorganismus zu erforschen, so giebt die Beobachtung zu erkennen, daß die Bewegung des Blutes und der Säfte von ganz bestimmten Organen ausgeht,

welche, wie das Herz und die Eingeweide, die bewegende Kraft nicht in sich selbst erzeugen, sondern von anderen Seiten her empfangen.

Wir kennen mit zweifelloser Gewißheit in den Nerven die Leiter und Verbreiter mechanischer Effecte, wir wissen, daß durch sie die Bewegung nach allen Seiten hin fortgepflanzt wird. Für jede Bewegung kennen wir einen besondern Nerven, einen besondern Leiter, mit dessen Leitungsvermögen, mit dessen Unterbrechung sich die Fortpflanzung verändert oder eine Grenze findet.

Durch die Nerven empfangen alle Theile des Thierkörpers, die Glieder, die zu ihren Functionen, zum Ortswechsel, zur Hervorbringung mechanischer Effecte unentbehrliche Kraft der Bewegung, wo die Nerven fehlen, vermissen wir Bewegung; die an einem Orte im Ueberfluß erzeugte Kraft wird den anderen durch die Nerven zugeleitet, was das eine Organ in sich selbst an Kraft nicht zu erzeugen vermag, wird ihm von anderen Seiten zugeführt, was ihm an Lebenskraft fehlt, um Widerstand zu leisten gegen äußere Ursachen von Störungen, um Widerstände aufzuheben, empfängt es als Ueberschuß von einem andern Organe, welches ihn für sich selbst nicht zu verwenden vermag.

Wir beobachten ferner, daß die willkührlichen und unwillkührlichen Bewegungen, daß alle mechanischen Effecte im Thierorganismus begleitet, daß sie abhängig sind von einer eigenthümlichen Form- und Beschaffenheitsänderung in der Substanz gewisser belebter Körpertheile, deren Zu- oder Ab-

nahme im engsten Zusammenhange steht mit dem Maß von Bewegung oder mit der Quantität von Kraft, welche durch die Bewegungen verzehrt worden ist.

Als eine unmittelbare Folge der zur Aeußerung gelangten, mechanischen Kraft sehen wir, daß ein Theil der Muskelsubstanz ihre vitalen Eigenschaften, ihren Character des Lebens verliert, daß sie aus dem belebten Körpertheile austritt, daß dieser Theil seine Fähigkeit der Zunahme an Masse, sein Vermögen Widerstand zu leisten, einbüßt; wir finden, daß dieser Wechsel in den Eigenschaften begleitet ist von der Aufnahme eines fremden Elementes, des Sauerstoffs, in die Zusammensetzung der belebten Muskelsubstanz (ähnlich wie die Säure ihren chemischen Character durch Aufnahme von Zink verlor), und alle Erfahrungen beweisen, daß dieser Uebergang der belebten Muskelsubstanz, in Verbindungen ohne alle Lebensäußerungen, beschleunigt oder verlangsamt wird, je nach der Quantität der verbrauchten Kraft zur Bewegung; ja daß sie sich gegenseitig proportional sind, daß ein rascher Uebergang der Muskelsubstanz, sagen wir, ein rascher Stoffwechsel, eine größere Quantität von mechanischer Kraft und ein größeres Maß von mechanischer Bewegung (verbrauchter, mechanischer Kraft) einen rascheren Stoffwechsel gegenseitig bedingen.

Aus diesem ganz bestimmten Zusammenhange des Stoffwechsels im Thierkörper mit der durch mechanische Bewegungen verzehrten Kraft kann kein anderer Schluß gezogen werden, als daß die in gewissen, belebten Körpertheilen active

oder verwendbare Lebenskraft die Ursache ist der mechanischen Effecte des Thierkörpers.

Die bewegende Kraft stammt zweifellos von belebten Körpertheilen, sie besaßen ein Kraft- oder Bewegungsmoment, was sie in eben dem Grade verloren, als andere ein Kraft- oder Bewegungsmoment empfangen haben; sie verlieren ihre Fähigkeit der Zunahme an Masse, ihr Vermögen, Widerstand gegen äußere Ursachen von Störungen zu leisten; es ist klar, die letzte Ursache, die Lebenskraft, von denen sie diese Eigenschaften erhielten, sie hat zur Hervorbringung der mechanischen Kraft gedient, sie ist als Bewegung verzehrt worden.

Wie ließe sich in der That einsehen, daß ein belebter Körpertheil den Zustand des Lebens verliert, daß er unfähig wird, der Einwirkung des im arteriellen Blute ihm zugeführten Sauerstoffs zu widerstehen, daß er das Vermögen einbüßt, chemische Widerstände aufzuheben, wenn das Kraftmoment der Lebenskraft, was ihm alle diese Eigenschaften gab, nicht zu anderen Zwecken verwendet worden wäre!

Durch das Vermögen der Leiter (der Nerven), das Kraftmoment eines belebten Körpertheils, den Effect, den die in ihm thätige Lebenskraft auf alle seine Umgebungen äußert, fortzupflanzen nach anderen Orten hin, wo die Kraft (d. h. ihr Bewegungsmoment) ohne alle Widerstände verzehrt wird (ohne Bewegung tritt kein Stoffwechsel ein, ist die Bewegung eingetreten, so steht ihr kein Widerstand entgegen), wird offenbar in dem belebten Körpertheil ein Gleichgewichts-

zuſtand zwiſchen den chemiſchen Kräften und der noch in ihm wohnenden Lebenskraft herbeigeführt, der ohne dieſen Verbrauch an Lebenskraft zur mechaniſchen Bewegung nicht eingetreten wäre.

Eine jede dem Organismus fremde Urſache, welche auf die Form, Beſchaffenheit und Zuſammenſetzung des Organs eine Wirkung auszuüben vermag, findet jetzt keinen Widerſtand mehr. Ohne die Ableitung der Kraft und ihre Verwendung zu anderen Zwecken, ohne das Hinzutreten von Sauerſtoff würde das Organ ſeinen Zuſtand, aber ohne alle Lebensäußerung behauptet haben, erſt durch die chemiſche Action des Sauerſtoffs findet der Stoffwechſel, d. h. das Austreten in der Form einer unbelebten Verbindung ſtatt.

Stoffwechſel, mechaniſche Kraftäußerung und Sauerſtoffaufnahme, ſtehen in dem Thierkörper in ſo enger Beziehung zu einander, daß man die Quantität von Bewegung, die Menge des umgeſetzten, belebten Stoffes, in einerlei Verhältniß ſetzen kann mit einer gewiſſen Menge, des, von dem Thiere, in einer gegebenen Zeit aufgenommenen und verbrauchten Sauerſtoffs. Für ein beſtimmtes Maß von Bewegung, für eine Proportion als mechaniſche Kraft verbrauchter Lebenskraft, gelangt ein Aequivalent von chemiſcher Kraft zur Aeußerung, d. h. es wird ein Aequivalent Sauerſtoff zum Beſtandtheil des Organs, was die Lebenskraft verlor, und ein ihm gleiches Verhältniß von der Materie dieſes Organs tritt aus dem Körpertheil, in der Form einer Sauerſtoffverbindung aus.

Alle Theile des Thierkörpers, welche die Natur zum

Stoffwechsel (zur Hervorbringung von mechanischer Kraft) bestimmt hat, sind nach allen Richtungen hin von den feinsten Kanälen durchzogen, in denen unausgesetzt ein Strom von Sauerstoff in der Form von arteriellem Blut circulirt, der zum Austreten ihrer Bestandtheile (zur Störung des Gleichgewichtes) unumgänglich nöthig ist.

So lange die Lebenskraft dieser Körpertheile nicht zu anderen Zwecken verbraucht und abgeleitet wird, äußert der Sauerstoff des arteriellen Blutes nicht die geringste Wirkung auf ihre Substanz und stets wird nur eine der Ableitung entsprechende (den hervorgebrachten mechanischen Effecten correspondirende) Menge davon aufgenommen.

Der Sauerstoff der Atmosphäre ist die von außen her wirkende Ursache des Verbrauchs an Stoff im Thierkörper, er wirkt wie eine Kraft, welche die Aeußerung der Lebenskraft in jedem Zeitmomente stört und aufzuheben strebt; als chemische Action wird aber seine Einwirkung, die von ihm ausgehende Störung, im Gleichgewicht gehalten durch die in dem belebten Körpertheile frei wirkende Lebenskraft, oder sie wird vernichtet durch eine der seinigen entgegengesetzte, chemische Thätigkeit, deren Aeußerung immer als abhängig angesehen werden muß von der Lebenskraft.

Nach chemischen Begriffen heißt die chemische Action des Sauerstoffs vernichten, ihm Stoffe darbieten, Theile von Materien, die sich mit ihm zu verbinden vermögen.

Die Action des Sauerstoffs (Affinität) wird entweder durch die Bestandtheile des Organs (nach Ableitung der

Lebenskraft), die ſich mit ihm zu verbinden vermögen, ausgeglichen, oder das Organ ſetzt ihr (der Action des Sauerſtoffs) die Producte von anderen Organen, oder gewiſſe Stoffe entgegen, welche aus den Beſtandtheilen der Nahrung, in Folge der vitalen Thätigkeit gewiſſer Apparate entſtanden ſind.

Nur das Muskularſyſtem producirt in dieſem Sinne, in ſich ſelbſt, einen Widerſtand gegen die chemiſche Action des Sauerſtoffs und gleicht ſie vollſtändig aus.

Die Subſtanz der Zellen, Membranen und Häute, deren kleinſte Theilchen ſich nicht im unmittelbaren Contact mit arteriellem Blut (mit Sauerſtoff) befinden, iſt nicht zum Stoffwechſel beſtimmt. Welche Art von Veränderungen ſie auch im Lebensproceſſe erleiden mag, ſie treffen unter allen Umſtänden nur ihre Oberfläche.

Die Leimgebilde, Schleimhäute, Sehnen ꝛc. ſind nicht zur Hervorbringung von mechaniſcher Kraft beſtimmt, ſie enthalten in ihrer Subſtanz keine Leiter der mechaniſchen Effecte. Das Muskularſyſtem iſt mit zahlloſen Nerven durchwebt. Die Subſtanz des Uterus iſt von der übrigen Muskelſubſtanz chemiſch, in keiner Weiſe verſchieden, allein ſie iſt nicht zum Stoffwechſel, zur Krafterzeugung beſtimmt, ſie enthält keine Ableiter der bewegenden Kraft.

Den Membranen, Schleimhäuten und Zellen geht das Vermögen, ſich bei Gegenwart von Feuchtigkeit mit Sauerſtoff zu verbinden, keineswegs ab, wir wiſſen, daß ſie im feuchten Zuſtande mit Sauerſtoff nicht in Berührung

gebracht werden können, ohne eine fortschreitende Veränderung zu erfahren. Die eine Oberfläche der Eingeweide, die Lungenzellen, sind aber unausgesetzt in Berührung mit Sauerstoff; es ist klar, daß sie eine eben so rasche Umsetzung, Veränderung durch seine chemische Action erfahren müßten, wenn in dem Organismus selbst, nicht eine Quelle von Widerstand existirte, der die Einwirkung des Sauerstoffs völlig vernichtete. Unter diesem Widerstande lassen sich alle Materien zusammenfassen, welche die Fähigkeit haben oder unter dem Einfluß der Lebenskraft erhalten, sich mit Sauerstoff zu verbinden und in ihrem Vermögen seine chemische Action auszugleichen, die Substanz der Leimgebilde übertreffen.

Alle Bestandtheile des Thierkörpers, welche in sich selbst durch die Lebenskraft, der Einwirkung des Sauerstoffs nicht zu widerstehen vermögen, müssen sich zu diesem Zwecke weit mehr eignen, wie die unter dem Einfluß der Lebenskraft, wenn auch nur durch die Nerven, stehenden Gebilde; die Bedeutung der Galle für die Substanz der Eingeweide, der Lungenzellen, so wie die des Fettes, Schleimes und der Secretionen überhaupt, kann nach dieser Betrachtung nicht verkannt werden.

Wenn die Membranen durch ihre eigne Substanz Widerstand gegen die Einwirkung des Sauerstoffs produciren müssen, wenn es also an den Stoffen fehlt, welche die Natur zu ihrem Schutze bestimmt hat, so werden sie, da ihre Erneuerung in enge Grenzen eingeschlossen ist, der chemi-

ſchen Action unterliegen müſſen. Eingeweide und Lunge werden immer gleichzeitig abnormale Veränderungen erfahren.

In dem Stoffwechſel ſelbſt, in der Umſetzung der belebten Subſtanz des Muskularſyſtems, erhalten dieſe Organe den zu ihrem Beſtehen unentbehrlichen Widerſtand gegen die Einwirkung des Sauerſtoffs; je nach ſeiner Beſchleunigung nimmt die Quantität der ſecernirten Galle zu, die Menge des vorhandenen Fettes nimmt in gradem Verhältniß ab.

Zur Unterhaltung der unwillkürlichen Bewegungen im Thierkörper wird in jedem Zeitmomente ſeines Lebens eine gewiſſe Quantität Lebenskraft verbraucht und es findet deshalb ein unaufhörlicher Stoffwechſel ſtatt, allein die Menge der Subſtanz, welche in Folge der verbrauchten Kraft ihren Zuſtand des Lebens, ihre Fähigkeit der Zunahme an Maſſe verliert, iſt in enge Grenzen eingeſchloſſen; ſie ſteht in gradem Verhältniß zu der, zu dieſen Bewegungen, nöthigen Kraft.

Wenn wir uns nun auch denken können, daß die belebte Muskelſubſtanz bei hinreichender Zufuhr an Nahrung ihre Fähigkeit der Zunahme in keinem Zeitmomente verliert, daß ſich dieſe Form der Lebens-Aeußerung unausgeſetzt geltend macht, ſo kann dies keineswegs für diejenigen Körpertheile angenommen werden, deren frei wirkende Lebenskraft zur mechaniſchen Bewegung verbraucht worden iſt. Der Verbrauch an Stoff durch Bewegung und Anſtrengung iſt bei je zwei Individuen höchſt verſchieden.

Wenn man nun erwägt, daß die unmerklichſte Bewegung eines Fingers und der Glieder Kraft verbraucht, daß, in

Folge der verzehrten mechanischen Kraft, ein correspondirender Theil der Muskeln an Volumen abnimmt, so ist klar, daß ein Gleichgewicht im Ersatz und Verbrauch an Stoff (an belebten Körpertheilen) nur dann sich herstellen kann, wenn der ausgetretene Körpertheil in dem nämlichen Augenblicke, wo er seinen Zustand des Lebens verliert, wieder an einer andern Stelle erneuert wird.

Die Fähigkeit der Zunahme an Masse ist abhängig von dem, einem jeden Körpertheile zukommenden Kraftmomente, sie muß sich unausgesetzt äußern können, so lange (bei hinlänglicher Zufuhr von Nahrungsstoff) er dieses Kraftmoment nicht verliert (durch Verwendung z. B. zur mechanischen Bewegung).

Unter allen Umständen ist die Zunahme selbst an die Zeit gebunden, d. h. sie kann für eine begrenzte Zeit nicht unbegrenzt sein.

In dem nämlichen Augenblick, in welchem ein belebter Körpertheil seinen Zustand des Lebens verliert und aus dem Organ in der Form einer unbelebten Verbindung austritt, kann dieser Theil nicht zunehmen, seine Masse, seine Volumen nehmen ja ab.

Durch die fortdauernde Verwendung der Kraftmomente belebter Körpertheile zu mechanischen Effecten, wird demnach ein fortdauerndes Austreten von Masse bedingt, und erst von dem Augenblicke an, wo die Ursache des Verbrauchs nicht mehr wirkt, kann sich die Fähigkeit der Zunahme wieder äußern.

Da nun verschiedene Individuen in 24 Stunden, je nach der zur Hervorbringung willkürlicher, mechanischer Effecte verwendeten Kraft, eine ungleiche Menge von ihren belebten Körpertheilen verbrauchen, so muß für ein jedes, wenn die Bewegungserscheinungen nicht ihre Grenze finden sollen, ein Zustand eintreten, in welchem alle willkürlichen Bewegungen völlig unterdrückt sind, wo also für diese kein Verbrauch stattfindet. Dieser Zustand heißt Schlaf.

Auf die Fähigkeit der Zunahme an Masse eines Körpertheils, dem sein Kraftmoment nicht genommen worden ist, kann der Verbrauch desselben zu mechanischen Effecten in einem andern Körpertheil, nicht den geringsten Einfluß äußern (der eine kann an Masse zunehmen, während der andere abnimmt, ohne daß sich beide Actionen stören), der Verbrauch in dem einen kann den Ersatz in dem andern nicht vermindern und nicht steigern.

Da nun der Verbrauch an mechanischer Kraft zu den unwillkürlichen Bewegungen im Schlafe fortdauert, so ist klar, daß auch ein Verbrauch an Stoff im Schlafe fortdauert, und es muß, wenn das ursprüngliche Gleichgewicht wieder eintreten soll, vorausgesetzt werden, daß während des Schlafes eine eben so große Quantität von Kraft (in der Form belebter Körpertheile) sich wieder sammelt, als in der vorhergegangenen Zeit des Wachens zu den willkürlichen und unwillkürlichen mechanischen Effecten verwendet worden ist.

Wird das Gleichgewicht in Ersatz und Verbrauch von Stoff im mindesten gestört, so giebt sich dies sogleich in

einem Unterschied von verwendbarer Kraft zu mechanischen Effecten zu erkennen.

Es ist ferner klar, daß wenn ein Mißverhältniß in der Leitungsfähigkeit der Nerven der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen stattfindet, so wird nach dem Grade, in welchem die einen oder die anderen dies Bewegungsmoment, was sie durch Stoffwechsel empfangen haben, fortzupflanzen vermögen, der Unterschied in den Bewegungserscheinungen selbst bemerklich sein. Mit der Zunahme der Blutbewegung und der Bewegung der Eingeweide wird die Hervorbringung mechanischer Effecte durch die Glieder in gradem Verhältniß abnehmen müssen (wie bei den sogenannten Fressern), und wenn in einer gegebenen Zeit für mechanische Bewegung (durch Anstrengung, Laufen, Tanzen ꝛc.) mehr Lebenskraft verbraucht wird, als für die willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen überhaupt verwendbar ist (als sich in der gegebenen Zeit an Stoff umsetzen kann), so wird zur Ausgleichung der für die willkürlichen Bewegungen mehrverbrauchten mechanischen Kraft ein Theil der Kraft, die zu den unwillkürlichen Bewegungen nöthig ist, verwendet werden müssen. Die Bewegung des Herzens, der Eingeweide muß verlangsamt werden oder sie hört gänzlich auf.

Von dem ungleichen Grade der Leitungsfähigkeit der Nerven müssen die Zustände abgeleitet werden, die man mit Lähmung, Ohnmacht, Krampf bezeichnet. Die Lähmung der Nerven der willkürlichen Bewegung kann für

sich keine Abmagerung nach sich ziehen; häufig wiederkehrende epileptische Anfälle (Verbrauch von Lebenskraft zu mechanischen Effecten) sind stets von einer außerordentlich raschen Abmagerung begleitet.

Es muß die höchste Bewunderung erwecken, wenn man erwägt, mit welcher unendlichen Weisheit der Schöpfer die Mittel vertheilt hat, die das Thier, die Pflanze, zu seinen Functionen, zu seinen ihm eigenthümlichen Lebensäußerungen befähigen.

Die ganze Richtung, die ganze Stärke der Lebenskraft behält der belebte Pflanzentheil durch die Abwesenheit aller Leiter der Kraft. Durch sie wird das Blatt befähigt, die stärksten chemischen Anziehungen zu überwinden, die Kohlensäure zu zerlegen und sich die Bestandtheile ihrer Nahrungsstoffe anzueignen.

Nur in der Blüthe der Pflanze findet ein dem Stoffwechsel im Thierkörper ähnlicher Proceß statt, es zeigen sich Bewegungserscheinungen, allein die mechanischen Effecte pflanzen sich nicht fort aus Mangel an Leitern der Kraft.

Die nämliche Lebenskraft, die wir in der Pflanze als eine beinahe unbegrenzte Fähigkeit der Zunahme an Masse kennen, verwandelt sich in dem Thierkörper in bewegende Kraft (in einen Strom von Lebenskraft), und eine wunderbare und weise Oekonomie bestimmt zur Ernährung des Thieres nur solche Stoffe, die eine mit den Organen der Krafterzeugung (dem Muskularsystem) identische Zusammensetzung besitzen. Der Aufwand von Kraft, den ihre belebten

Theile bedürfen, um aus dem Blute sich selbst wiederzuerzeugen, der Widerstand der chemischen Kraft, welcher in den Bestandtheilen der stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe durch die Lebensthätigkeit der Organe überwunden werden muß, welche bestimmt sind, sie zu Bestandtheilen des Blutes zu machen, ist für nichts zu achten gegen die Kraft und Energie, mit welcher die Bestandtheile der Kohlensäure zusammenhängen. Eine gewisse Quantität Kraft könnte nicht in bewegende Kraft übergehen, wenn sie zur Ueberwindung der chemischen Kräfte verwendet werden müßte; das Bewegungsmoment der Lebenskraft wird durch alle Widerstände verringert. Der Uebergang der Bestandtheile des Blutes in Muskelfaser (in ein Organ der Krafterzeugung) ist nur eine Formänderung, beide sind gleich zusammengesetzt; das Blut ist flüssig, die Muskelfaser ist festes Blut; man kann sich denken, daß er vor sich geht ohne allen Verbrauch von Lebenskraft, denn bei dem Uebergang eines flüssigen Körpers in einen festen bedarf es keiner Kraftäußerung, sondern nur der Beseitigung von Hindernissen (Wärme z. B.), die sich der Kraft, welche der Zustand bedingt (der Cohäsionskraft), in ihren Aeußerungen entgegensetzen.

In welcher Form, auf welche Weise die Lebenskraft die mechanischen Effecte im Thierkörper bewirkt, ist gänzlich unbekannt und wird durch Versuche so wenig ermittelt werden können, wie der Zusammenhang der chemischen Action mit den Bewegungserscheinungen, die wir mit der galvanischen Säule hervorzubringen vermögen; alle Erklärungen, die man

zu geben versucht hat, sind immer nur Bilder der Erscheinung, es sind mehr oder weniger genaue Beschreibungen und Vergleichungen bekannter Erscheinungen mit diesen unbekannten; es geht uns in dieser Beziehung wie dem Unkundigen, dem das Aufundniedersteigen eines eisernen Stempels in einem Gefäße, worin das Auge nichts Sichtbares erkennen kann, und sein Zusammenhang mit dem Drehen und Bewegen von Tausenden von Rädern, die sich in einer gewissen Entfernung von dem Stempel befinden, unbegreiflich erscheint.

Wir wissen nicht, wie ein an sich unsichtbares, unwägbares Etwas, die Wärme, gewissen Materien die Fähigkeit ertheilt, den ungeheuersten Druck auf ihre Umgebungen zu äußern, wie überhaupt dieses Etwas hervorgebracht wird, wenn wir Holz oder Kohlen verbrennen.

So ist es denn auch mit der Lebenskraft und den Erscheinungen, welche belebte Körper darbieten; ihre Ursache ist nicht chemische Kraft, nicht Elektricität, nicht Magnetismus, es ist eine Kraft, welche die allgemeinsten Eigenschaften aller Ursachen der Bewegung, Form- und Beschaffenheitsänderung der Materie besitzt, und eine eigenthümliche Kraft, weil ihr Aeußerungen zukommen, welche keine der anderen Kräfte an sich trägt.

II.

In der belebten Pflanze überwiegt die Intensität der Lebenskraft bei weitem die chemische Action des Sauerstoffs.

Wir wissen mit der größten Bestimmtheit, daß der Sauerstoff durch den Einfluß der Lebenskraft von Elementen abgeschieden wird, zu denen er die stärkste Affinität besitzt; daß er in Gasform austritt, ohne die geringste Einwirkung auf die Bestandtheile der Säfte auszuüben.

Wie groß muß in der That der Widerstand erscheinen, den die Lebenskraft dem terpentinöl- oder gerbsäurehaltigen Blatte verleiht, wenn wir die Verwandtschaft in Betracht ziehen, welche der Sauerstoff zu diesen Bestandtheilen besitzt!

Diese Intensität der Wirkung oder des Widerstandes erhält das belebte Blatt durch das Sonnenlicht, dessen Einfluß in chemischen Actionen mit der eines hohen Wärmegrades (einer schwachen Glühhitze) vergleichbar ist und verglichen wird.

In der Nacht zeigt sich in der lebendigen Pflanze ein entgegengesetzter Proceß, wir sehen, daß sich die Bestandtheile der Blätter und grünen Theile mit dem Sauerstoff der Luft verbinden, eine Fähigkeit, die ihnen im Lichte abging.

Man kann hieraus keinen andern Schluß ziehen, als daß die Intensität der Lebenskraft mit der Abnahme des Lichts

ſich vermindert, daß mit der kommenden Nacht ein Gleichgewichtszuſtand eintritt und bei völliger Abweſenheit des Lichts alle Theile der Pflanze, die während des Tages die Fähigkeit beſaßen, den Sauerſtoff aus chemiſchen Verbindungen auszuſcheiden oder ſeiner Einwirkung Widerſtand zu leiſten, dieſe Fähigkeit völlig verlieren.

Eine ganz ähnliche Erſcheinung beobachten wir bei den Thieren.

Nur in gewiſſen Temperaturen zeigt der belebte Thierkörper die ihm zukommenden Lebensäußerungen. Einem beſtimmten Kältegrade ausgeſetzt, hören ſie völlig auf.

Eine Entziehung von Wärme muß deshalb völlig gleichbedeutend angeſehen werden, einer Verminderung der Lebensthätigkeit; der Widerſtand, den die Lebenskraft belebten Körpertheilen gegen äußere Urſachen von Störungen verleiht, muß in gewiſſen Temperaturen in dem nämlichen Verhältniß abnehmen, wie die Fähigkeit ihrer Elementartheile zunimmt, ſich mit dem Sauerſtoff der Luft zu verbinden.

Durch die Verbindung des Sauerſtoffs mit den Beſtandtheilen der Gebilde, die ſich umgeſetzt haben, wird bei den fleiſchfreſſenden Thieren die zur Aeußerung der Lebensthätigkeit nöthige Temperatur erzeugt. Bei den grasfreſſenden Thieren wird eine gewiſſe Menge Wärme durch die Beſtandtheile ihrer ſtickſtofffreien Nahrungsmittel entwickelt, welche die Fähigkeit haben, eine Verbindung mit dem Sauerſtoff einzugehen.

Es iſt klar, daß die Temperatur eines Thierkörpers ſich

nicht ändern kann, wenn die Menge des eingeathmeten Sauerstoffs mit dem Wärmeverlust durch äußere Abkühlung in gradem Verhältniß zunimmt.

Zwei Individuen von gleichem Gewichte, welche ungleichen Kältegraden ausgesetzt sind, verlieren in einer gegebenen Zeit, nach Außen hin, eine ungleiche Menge Wärme. Die Erfahrung lehrt, daß sie, wenn die ihnen eigenthümliche Temperatur und ihr ursprüngliches Gewicht sich nicht ändern soll, einer ungleichen Menge Speise bedürfen; in der niedrigern Temperatur mehr Speise wie in der höhern.

Das Gleichbleiben des Gewichts bei ungleicher Quantität genossener Nahrung setzt, wie sich von selbst versteht, voraus, daß in derselben Zeit eine der Temperatur proportionale Menge Sauerstoff aufgenommen worden ist, in der niedern Temperatur mehr wie in der höhern.

Wir finden, daß das Gewicht beider Individuen nach 24 Stunden gleich ist dem ursprünglichen Gewichte; angenommen, daß die Nahrung zu Blut wird, daß das Blut zur Ernährung gedient hat, so ist klar, daß mit der Wiederkehr des ursprünglichen Gewichtes ein den Bestandtheilen der Speise gleiches Gewicht von den Bestandtheilen des Körpers seinen Zustand des Lebens verloren und mit dem Sauerstoff verbunden wieder ausgetreten ist.

Das eine Individuum, was bei dem höhern Kältegrade mehr Speise zu sich nahm, hat auch mehr Sauerstoff aufgenommen, es ist eine größere Menge seiner Körpertheile mit diesem Sauerstoff ausgetreten und in Folge der Verbindung

des Sauerstoffs mit den umgesetzten Bestandtheilen ist ein größeres Maß von Wärme frei geworden, wodurch die entführte Wärme wieder ersetzt und die seinem Organismus zukommende Temperatur erhalten wurde.

Durch die Wärmeentziehung muß demnach, bei hinreichender Nahrung und ungehindertem Sauerstoffzutritt, der Stoffwechsel beschleunigt werden und mit der, in einer gegebenen Zeit beschleunigten Umsetzung der belebten Körpertheile muß gleichzeitig ein größeres Maß von Lebenskraft zu mechanischen Effecten verwendbar geworden sein.

Mit der äußern Abkühlung verstärken sich die Athembewegungen, mit der niedern Temperatur wird ein größeres Gewicht Sauerstoff dem Blute zugeführt, der Verbrauch an Stoff nimmt zu und wenn der Ersatz mit diesem Verbrauch nicht im Gleichgewicht (durch Zufuhr an Speise) erhalten wird, so nimmt die Temperatur des Körpers allmählig ab.

In einer gegebenen Zeit kann aber keine unbegrenzte Menge Sauerstoff in den Körper aufgenommen, es kann nur eine gewisse Quantität des belebten Stoffs seinen Zustand des Lebens verlieren, es kann nur ein begrenztes Maß von Lebenskraft als mechanische Kraft zur Aeußerung gelangen. Nur in dem Falle wird also die Temperatur des Thierkörpers sich nicht ändern, wenn Abkühlung, Krafterzeugung und Sauerstoffaufnahme sich einander im Gleichgewichte halten. Nimmt die Wärmeentziehung über einen bestimmten Punkt hinaus zu, so nehmen die Lebenserscheinungen in dem nämlichen Verhältnisse ab, denn die Temperatur nimmt ab,

welche als eine sich gleichbleibende Bedingung, zu ihrer Aeußerung angesehen werden muß.

Die Erfahrung zeigt nun, daß bei der Abnahme der Temperatur des Körpers, das Vermögen der Glieder, mechanische Effecte hervorzubringen (die zu den willkürlichen Bewegungen nöthige Kraft) ebenfalls abnimmt, es tritt der Zustand ein, den man Schlaf nennt, zuletzt hören alle unwillkürlichen Bewegungen (des Herzens, der Eingeweide) auf, es tritt ein Scheintod ein.

Es ist klar, daß die Ursache der Krafterzeugung, der Stoffwechsel nämlich, deshalb abnimmt, weil mit der Entziehung von Wärme, ähnlich wie durch Abnahme des Lichtes bei der Pflanze, die Intensität der Lebenskraft sich vermindert; es ist klar, daß das Kraftmoment eines belebten Körpertheils abhängig ist von der ihm zukommenden Temperatur, ganz ähnlich, wie der Effect eines fallenden Körpers in einer bestimmten Beziehung steht zu gewissen andern Bedingungen, die man Masse nennt oder Geschwindigkeit.

Nimmt die Temperatur ab, so nimmt die Lebensthätigkeit ab; mit dem Steigen der Temperatur muß das Kraftmoment belebter Körpertheile in seiner ganzen Intensität wieder hergestellt werden.

Krafterzeugung zu mechanischen Effecten und Temperatur müssen deshalb, in einer ganz bestimmten Beziehung stehen, zu der Menge des in einer gegebenen Zeit von dem Thierkörper aufnehmbaren Sauerstoffs.

Die Menge von Sauerstoff, welche ein Wallfisch und

ein Fuhrmannspferd in einer gleichen Zeit einzuathmen vermögen, ist sehr ungleich. Die Temperatur, sowie die Menge des Sauerstoffs, ist bei dem Pferde weit größer.

Die mechanische Kraft, welche ein harpunirter Wallfisch entwickelt, dessen Körper von dem umgebenden Medium getragen wird, so wie die Kraft eines Fuhrmannspferdes, was seinen eigenen Körper und eine schwere Last 8 — 10 Stunden lang fortzubewegen hat, muß mit dem von beiden verzehrten Sauerstoff in einerlei Verhältniß stehen. Wenn man die Zeit beachtet, in welcher die Kraft zur Aeußerung gelangt, so ist sie offenbar bei dem Pferde weit größer.

Beim Besteigen hoher Berge, wo durch das Einathmen einer sehr verdünnten Luft, in gleichen Zeiten, weit weniger Sauerstoff dem Blute zugeführt wird, wie in Thälern oder an dem Ufer des Meeres, nimmt der Stoffwechsel in dem nämlichen Verhältniß und damit die zu mechanischen Effecten verwendbare Kraft, ab; Neigung zum Schlaf, Mangel an Kraft für die willkürlichen Bewegungen stellt sich meistens ein; nach zwanzig oder dreißig Schritten zwingt die Ermüdung zu neuer Ansammlung von Kraft durch Ruhe (Einsaugung von Sauerstoff, ohne Verbrauch an Kraft für willkürliche Bewegungen).

Durch die Aufnahme von Sauerstoff in die Substanz belebter Körpertheile verlieren sie ihren Zustand des Lebens und treten als formlose Verbindungen aus, allein nicht aller eingeathmete Sauerstoff wird zu dieser Umsetzung verwendet; der größte Theil dient zur Vergasung, zur Entfernung

aller dem Organismus nicht mehr angehörenden Stoffe, und wie erwähnt, wird in Folge der Verbindung ihrer Elemente mit dieſem Sauerſtoff, die dem Organismus zukommende Temperatur erzeugt.

Wärmeerzeugung und Stoffwechſel ſtehen in enger Beziehung zu einander, allein obwohl im Thierkörper Wärme hervorgebracht werden kann ohne allen Stoffwechſel, ſo kann der letztere dennoch nicht unabhängig von der Mitwirkung des Sauerſtoffs gedacht werden.

Nach allen bis jetzt gemachten Beobachtungen enthält nach dem Genuß von geiſtigen Getränken, weder die ausgeathmete Luft, noch der Schweiß, noch der Urin, Spuren von Alkohol, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß ſeine Beſtandtheile ſich im Thierkörper mit Sauerſtoff verbinden, daß ſein Kohlenſtoff und Waſſerſtoff als Kohlenſäure und Waſſer wieder austreten.

Der Sauerſtoff, welcher dieſe Verwandlung bewirkt, muß nothwendig von dem arteriellen Blute genommen worden ſein, denn wir kennen keinen andern Weg als die Blutcirculation, auf welchem Sauerſtoff in das Innere des Körpers gelangen kann.

Vermöge ſeiner Flüchtigkeit und der Leichtigkeit, womit der Alkoholdampf von den Membranen und thieriſchen Geweben durchgelaſſen wird, kann er ſich überall nach allen Orten im Körper hin verbreiten.

Wäre die Fähigkeit der Beſtandtheile des Alkohols, ſich mit Sauerſtoff zu vereinigen, nicht größer, als die der

Verbindungen, welche durch den Stoffwechsel gebildet werden, oder als die der Substanz der belebten Körpertheile ist, so würden sie (die Bestandtheile des Alkohols) sich mit Sauerstoff nicht verbinden können.

Es ist deßhalb einleuchtend, daß durch den Genuß von Alkohol, dem Stoffwechsel in gewissen Körpertheilen, eine rasche Grenze gesetzt werden muß. Der Sauerstoff des arteriellen Blutes, der sich ohne die Gegenwart des Alkohols mit belebtem Stoff verbunden haben würde, tritt jetzt an die Bestandtheile des Alkohols, ein Theil des arteriellen Blutes wird zu venösem Blut, ohne daß die Muskelsubstanz an dieser Umwandlung Antheil nimmt.

Wir beobachten nun, daß die Wärmeentwickelung im Organismus nach dem Genuß von Wein eher zu- als abnimmt, ohne daß damit ein entsprechendes größeres Maß von mechanischer Kraft zur Aeußerung gelangt.

Eine mäßige Quantität Wein bedingt bei Frauen und Kindern, welche an Weingenuß nicht gewöhnt sind, ganz im Gegentheil eine Abnahme der zu den willkürlichen Bewegungen nöthigen Kraft; Müdigkeit, Abgeschlagenheit der Glieder, Neigung zum Schlaf geben offenbar zu erkennen, daß die zu mechanischen Effecten verwendbare Kraft, dies will sagen, daß der Stoffwechsel abgenommen hat.

Gewiß kann an diesen Symptomen eine Verminderung der Leitungsfähigkeit der willkürlichen Bewegungsnerven einen gewissen Antheil haben, allein dies muß auf die Summe von verwendbarer Kraft ohne allen Einfluß sein.

Was die Leiter der willkürlichen Bewegungen an Krafteffecten nicht fortzupflanzen vermögen, wird von den Leitern der unwillkürlichen Bewegungen aufgenommen und dem Herzen, den Eingeweiden zugeführt werden müssen. Die Blutbewegung wird in diesem Fall, auf Kosten der zu willkürlichen Bewegungen durch die Glieder verwendbaren Kraft beschleunigt erscheinen, ohne daß aber, wie bemerkt, durch den Oxydationsproceß des Alkohols ein größers Maaß von mechanischer Kraft erzeugt worden ist.

Wir beobachten zuletzt bei den Winterschläfern, daß während ihres Winterschlafs die Fähigkeit der Zunahme an Masse (eine der Hauptäußerungen der Lebenskraft), durch den Ausschluß aller Speise, völlig unterdrückt ist; bei manchen tritt in Folge der niedern Temperatur und der hierdurch herabgestimmten Lebensthätigkeit ein Scheintod ein, bei anderen dauern die unwillkürlichen Bewegungen fort; das Thier behält eine von der Umgebung unabhängige Temperatur. Die Athembewegungen dauern fort, nach wie vor wird Sauerstoff als der Bedinger der Wärme- und Krafterzeugung aufgenommen; wir finden vor dem Winterschlaf alle Theile ihres Körpers, die in sich selbst keinen Widerstand gegen die Einwirkung des Sauerstoffs zu produciren vermögen, welche wie die Eingeweide und Membranen nicht zum Stoffwechsel bestimmt sind, mit Fett bedeckt, mit einer Materie umgeben, welche diesen Widerstand übernimmt.

Wenn wir uns nun denken, daß der während des Winterschlafs aufgenommene Sauerstoff nicht in die Zusammen-

ſetzung der belebten Körpertheile, ſondern mit den Beſtandtheilen des Fettes in Verbindung tritt, ſo wird der belebte Körpertheil, obwohl ein gewiſſes Bewegungsmoment zu der Unterhaltung des Blutumlaufs verwendet worden iſt, nicht austreten.

Mit der höhern Temperatur wächſt in gleichem Grade die Fähigkeit der Zunahme an Maſſe, die Blutbewegung nimmt mit der Sauerſtoffaufnahme zu. Manche dieſer Thiere magern während dem Winterſchlafe, andere erſt mit dem Erwachen aus dem Winterſchlafe ab.

Bei den Winterſchläfern wird die in den belebten Körpertheilen thätige Kraft ausſchließlich nur zur Unterhaltung der unwillkürlichen Bewegungen verbraucht, alle Kraftverwendung zu willkürlichen Bewegungen iſt völlig unterdrückt.

Im Gegenſatz zu dieſen Erſcheinungen wiſſen wir, daß bei Uebermaß von Bewegung und Anſtrengung, die in den belebten Körpertheilen thätige Kraft ausſchließlich und vollſtändig zur Hervorbringung willkürlicher mechaniſcher Effecte verzehrt werden kann, in der Art, daß für die unwillkürlichen Bewegungen keine Kraft mehr zu verwenden übrig bleibt. Ein Hirſch kann zu Tode gehetzt werden, aber dies kann nicht geſchehen ohne Umſetzung aller belebten Theile ſeines Muskularſyſtems, ſein Fleiſch iſt nicht genießbar; der Zuſtand der Umſetzung, in den es durch einen enormen Kraft- und Sauerſtoffverbrauch übergegangen iſt, ſetzt ſich mit dem Aufhören aller Bewegungserſcheinungen fort; in ſeinen belebten

Körpertheilen ist aller Widerstand der Lebenskraft gegen äußere Ursachen und Störungen völlig aufgehoben.

So eng mit einander verknüpft nun auch die Bedingungen der Wärme- und Krafterzeugung zu mechanischen Effecten sich der Beobachtung darstellen mögen, so kann die Wärmeentwicklung für sich allein in keiner Weise als die Ursache der mechanischen Effecte angesehen werden.

Alle Erfahrungen beweisen, daß es im Organismus nur eine Quelle von mechanischer Kraft giebt und diese Quelle ist der Uebergang belebter Körpertheile in leblose Verbindungen.

Von dieser Wahrheit ausgehend, welche unabhängig ist von jeder Theorie, läßt sich das animalische Leben als bedingt durch die Wechselwirkung entgegengesetzter Kräfte betrachten, von denen die einen als Ursachen der Zunahme (des Ersatzes an Stoff), die andern als Ursachen der Abnahme (des Verbrauchs an Stoff) angesehen werden müssen.

Die Zunahme an Masse wird in belebten Körpertheilen bewirkt durch die Lebenskraft; ihre Aeußerung ist abhängig von der Wärme (von einer gewissen einem jeden Organismus eigenthümlichen Temperatur).

Die Ursache des Verbrauchs ist die chemische Action des Sauerstoffs, ihre Aeußerung ist abhängig von einer Entziehung von Wärme, so wie von der Verwendung der Lebenskraft zu mechanischen Effecten.

Der Act des Verbrauchs heißt Stoffwechsel,

er tritt ein in Folge der Aufnahme von Sauerstoff in die Substanz belebter Körpertheile; diese Aufnahme von Sauerstoff findet nur dann statt, wenn der Widerstand, welchen die Lebenskraft belebter Körpertheile der chemischen Action des Sauerstoffs entgegensetzt, kleiner ist als diese chemische Action selbst, und dieser schwächere Widerstand wird bedingt durch Entziehung von Wärme oder durch Verwendung der in den Körpertheilen thätigen Kraft zu mechanischen Bewegungen.

In Folge der Verbindung des im arteriellen Blute zugeführten Sauerstoffs mit allen Bestandtheilen des Thierkörpers, die seiner chemischen Action keinen Widerstand entgegensetzen, wird die zur Aeußerung der Lebensthätigkeit nöthige Temperatur erzeugt.

Aus den Beziehungen des Sauerstoffverbrauches zu dem Stoffwechsel und zur Wärmeentwickelung im Thierkörper ergeben sich die folgenden allgemeinen Regeln.

Für jedes Verhältniß Sauerstoff, was in dem Körper in Verbindung tritt, muß eine entsprechende Menge Wärme erzeugt werden.

Die Summe der zu mechanischen Effecten verwendbaren Kraft muß gleich sein der Summe von Lebenskraft aller zum Stoffwechsel geeigneten Gebilde.

Wenn in gleichen Zeiten eine ungleiche Menge von Sauerstoff verzehrt worden ist, so zeigt sich dies in einem unglei-

chen Maß von freigewordener Wärme und mechanischer Kraft.

Ein ungleiches Maß von verbrauchter mechanischer Kraft oder von Wärme bedingt die Aufnahme einer entsprechenden Menge Sauerstoff.

Zum Uebergang belebter Körpertheile in leblose Verbindungen, sowie zur Verbindung des Sauerstoffs mit den Bestandtheilen des Thierkörpers, welche Verwandtschaft zu ihm haben, gehört Zeit.

In einer gegebenen Zeit kann nur ein begrenztes Maß von mechanischen Effecten zur Aeußerung gelangen, es kann nur eine begrenzte Menge von Wärme in Freiheit gesetzt werden.

Was in den mechanischen Effecten an Geschwindigkeit verbraucht wird, geht an Zeit ab, d. h. je rascher die hervorgebrachten Bewegungen sind, desto schneller wird die Kraft erschöpft.

Die Summe der im Thierkörper in einer gegebenen Zeit erzeugten mechanischen Kraft ist gleich der Summe der in der nämlichen Zeit zur Hervorbringung der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen nöthigen Kraft, d. h. alle Kraft, welche das Herz, die Eingeweide ꝛc. zu ihren Bewegungen bedürfen, geht für die willkürlichen Bewegungen verloren.

Die Menge der zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Verbrauch und Ersatz nöthigen, stickstoffhaltigen Speise steht im graden Verhältniß zu der Menge der umgesetzten Gebilde.

Die Menge des belebten Stoffs, welcher in dem Thierkörper seinen Zustand des Lebens verliert, steht bei gleichen Temperaturen in geradem Verhältniß zu den in der gegebenen Zeit hervorgebrachten mechanischen Effecten.

Die Quantität der in einer gegebenen Zeit umgesetzten Gebilde ist meßbar durch den Stickstoffgehalt des Harns.

Die Summe der bei gleichen Temperaturen in zwei Individuen hervorgebrachten mechanischen Effecte ist proportional dem Stickstoffgehalt ihres Harns, gleichgültig ob die mechanische Kraft zu den willkürlichen oder unwillkürlichen Bewegungen verwendet, ob sie durch die Glieder, oder das Herz und die Eingeweide verzehrt worden ist.

Der Zustand des Thierkörpers, den man mit Gesundheit bezeichnet, umfaßt den Begriff eines Gleichgewichts zwischen allen Ursachen des Verbrauchs und den Ursachen des Ersatzes, und das Thierleben giebt sich hiernach zu erkennen als die Wechselwirkung beider Ursachen, es zeigt sich als eine sich wiederholende Aufhebung und Wiederherstellung des Gleichgewichtszustandes.

Der Masse nach ist in den verschiedenen Lebensaltern der Ersatz und Verbrauch an Stoff ungleich, allein im Zustand der Gesundheit muß die verwendbare Lebenskraft stets als eine der Summe der belebten Körpertheile entsprechende, unveränderliche Größe angesehen werden.

Die Zunahme an Masse steht in jedem Lebensalter in einem ganz bestimmten Verhältniß zu der als bewegende Kraft verbrauchten Lebenskraft.

Die Lebenskraft, welche zu mechanischen Effecten verwendet wird, geht von der Summe an Kraft ab, welche zur Zunahme verwendbar ist.

Die thätige Kraft, welche in dem Thierkörper zur Ueberwindung von Widerständen, sagen wir zu Bildungseffecten (zur Zunahme an Masse), verwendet wird, ist gleichzeitig nicht zur Hervorbringung mechanischer Effecte verwendbar.

Hieraus folgt von selbst, daß wenn der Masse nach, wie in dem Kindesalter, der Ersatz (die Zunahme an Masse) größer ist, als der Verbrauch, daß die hervorgebrachten mechanischen Effecte in demselben Verhältniß kleiner gewesen sein müssen.

Mit der Steigerung der mechanischen Effecte vermindert sich in dem nämlichen Verhältniß die Fähigkeit der Zunahme oder des Ersatzes an belebten Körpertheilen.

Ein vollkommnes Gleichgewicht in dem Verbrauch der Lebenskraft zu Bildungseffecten und mechanischen Effecten findet demnach nur in dem erwachsenen Zustande statt; es zeigt sich unverkennbar an dem vollkommnen Ersatz von verbrauchtem Stoff. Im Greisenalter wird mehr verbraucht, im Kindesalter wird mehr ersetzt als verbraucht.

Die zu mechanischen Effecten von einem erwachsenen Manne verwendbare Kraft wird in der Mechanik zu einem Fünftel seines eigenen Gewichts angenommen, was er acht Stunden lang mit einer Geschwindigkeit von 5 Fuß in zwei Secunden fortbewegen kann.

Nehmen wir das Gewicht eines Mannes zu 150 Pfund

an, ſo iſt ſeine Kraft gleich einem Gewicht von 30 Pfunden, die er 72000 Fuß weit trägt. Für jede Secunde iſt ſein Kraftmoment $30 \times 2{,}5 = 75$ und für die ganze Tageszeit ſein Bewegungsmoment $30 \times 72000 = 216000$.

Durch die Wiederherſtellung ſeines Körpergewichts ſammelt der Mann nun eine Summe von Kraft wieder an, die ihm den zweiten Tag geſtattet, ohne Erſchöpfung eine gleiche Anzahl von mechaniſchen Effecten hervorzubringen.

Dieſer Erſatz an Kraft geſchieht in einem ſiebenſtündigen Schlaf.

In den Fabriken von gewalztem Eiſen kommt es häufig vor, daß für den gewöhnlichen Gang der Maſchine ihr Druck nicht ſtark genug iſt, um eine Eiſenſtange von einer gewiſſen Dicke durch die Cylinder der Walze durchgehen zu machen. Man hilft ſich in dieſem Fall, indem man die ganze Kraft des Dampfs auf das Schwungrad wirken läßt und alsdann erſt, wenn dieſes eine große Geſchwindigkeit erlangt hat, die Eiſenſtange unter die Walze bringt, wo ſie dann (während das Schwungrad ſeine Geſchwindigkeit verliert) mit großer Leichtigkeit zu einer Tafel zuſammengepreßt wird. Was das Schwungrad an Geſchwindigkeit zunahm, gewann die Walze an Kraft; durch dieſes Verfahren iſt offenbar in der Geſchwindigkeit Kraft angeſammelt worden; allein in dieſem Sinne häuft ſich im lebendigen Organismus keine Kraft an.

Die Wiederherſtellung der Kraft geſchieht im Thierkör-

per durch die Neubildung der ausgetretenen, zur Krafterzeugung bestimmten Körpertheile, durch die Verwendung der thätigen Lebenskraft zu Bildungseffecten und mit der Wiederherstellung der ausgetretenen Körpertheile, erhält der Organismus eine der verwendeten, gleiche Kraft zurück.

Es ist einleuchtend, daß die während des Schlafs in Bildungseffecten sich äußernde Lebenskraft, gleich sein muß, der ganzen Summe der im wachenden Zustande zu allen mechanischen Effecten zusammengenommenen verwendeten bewegenden Kraft, plus einer gewissen Quantität von Kraft, welche zur Unterhaltung der im Schlafe fortdauernden, unwillkürlichen Bewegungen erforderlich war.

Von Tag zu Tag erhält der arbeitende Mann bei hinlänglicher Nahrung durch sieben Stunden Schlaf diese ganze Summe von Kraft zurück, und abgesehen von der zu den unwillkürlichen Bewegungen nöthigen Kraft, die in allen Individuen gleich ist, kann man annehmen, daß die zur Arbeit verwendbare, mechanische Kraft in gradem Verhältniß steht zu der Anzahl von Stunden Schlaf.

Der Mann schläft 7 und wacht 17 Stunden; bei Wiederherstellung des Gleichgewichtes nach 24 Stunden sind demnach die in 17 Stunden geäußerten mechanischen Effecte gleich den in 7 Schlafstunden verwendeten Bildungseffecten.

Wenn ein Greis nur 3½ Stunden schläft und alles übrige gleich wie bei dem Manne gesetzt wird, so würde er jedenfalls nur die Hälfte der mechanischen Effecte hervorzubringen vermögen, wie der Mann von gleichem Gewicht, er würde

nur 15 Pfund die nämliche Strecke weit tragen können.

Der Säugling schläft 20 Stunden und wacht 4 Stunden; die in ihm thätige Kraft, welche zu Bildungseffecten verwendet wird, verhält sich zu der, welche zu mechanischen Effecten (zur Bewegung der Glieder) verwendet wird, wie 20 : 4; aber seine Glieder besitzen kein Kraftmoment, denn er kann seinen eigenen Körper noch nicht tragen. Nehmen wir an, der Greis und Säugling verbrauche zu mechanischen Effecten eine dem Verhältniß, der von dem Manne verwendbaren, entsprechende Menge Kraft, so stehen die mechanischen Effecte im Verhältniß zu der Anzahl der Stunden des Wachens, die Bildungseffecte im Verhältniß zu der Anzahl der Stunden Schlaf, und wir haben:

Kraftverbrauch zu mechanischen Effecten		Kraftverbrauch zu Bildungseffecten
beim Mann 17	:	7
beim Säugling 4	:	20
beim Greis 20,5	:	3,5

Bei dem Manne findet zwischen Verbrauch und Ersatz ein vollkommnes Gleichgewicht statt, beim Säugling und Greis weichen Ersatz und Verbrauch von einander ab. Setzen wir den Kraftverbrauch in den siebzehn Stunden des Wachens gleich dem Kraftverbrauch zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im Schlaf = 100 = 17 Wachestunden = 7 Schlafstunden, so ergeben sich folgende Verhältnisse.

Die mechanischen Effecte verhalten sich zu den Bildungseffecten

beim Mann = 100 : 100
beim Säugling = 25 : 250
beim Greis = 125 : 50

oder die Zunahme zur Abnahme

beim Erwachsenen = 100 : 100
beim Säugling = 100 : 10
beim Greis = 100 : 250

Es ist hiernach klar, daß wenn der Greis eine den Schlafstunden des Mannes proportionale Arbeit verrichtet, so wird der Verbrauch größer sein wie der Ersatz, d. h. sein Körper wird rasch abnehmen, im Fall er 15 Pfund, mit einer Geschwindigkeit von 2½ Fuß in der Sekunde 72000 Fuß weit trägt, aber 6 Pfund Last wird er diese Strecke weit fortbewegen können.

Beim Kinde verhält sich die Zunahme zur Abnahme wie 10 : 1 und wenn wir den Verbrauch an mechanischen Effecten bei ihm also um das zehnfache steigern, so wird erst dann ein Gleichgewicht an Ersatz und Verbrauch eintreten; das Kind wird in diesem Fall freilich nicht an Masse zunehmen, allein es wird daran auch nicht abnehmen.

Wenn bei dem Erwachsenen der Kraftverbrauch zu mechanischen Effecten in 24 Stunden, über die in 7 Schlafstunden ersetzbare Quantität gesteigert wird, so muß, wenn das Gleichgewicht sich wiederherstellen soll, in den folgenden 24

Stunden, in dem nämlichen Verhältniß, weniger Kraft zu mechanischen Effecten verwendet werden, im entgegengesetzten Fall nimmt die Masse des Körpers ab und es tritt mehr oder weniger schnell der Zustand ein, welcher das Greisenalter characterisirt.

Mit jeder Stunde Schlaf mehrt sich beim Greise die Summe der verwendbaren Krafteffecte, oder nähert sich dem Gleichgewichtsverhältniß an Ersatz und Verbrauch wie beim erwachsenen Menschen.

Es ist ferner klar, daß wenn ein Theil der Kraft, welche zu mechanischen Bewegungen ohne Störung des Gleichgewichtes verwendbar ist, zur Bewegung der Glieder, Hebung von Lasten, Arbeit ꝛc. nicht verzehrt wird, so wird sie durch die unwillkürlichen Bewegungen verwendbar sein. Wenn die Bewegung des Herzens und der Säfte, der Eingeweide (der Blutumlauf und die Verdauung) sich in dem nämlichen Verhältniß beschleunigt findet, wie zu mechanischen Effecten durch die Glieder weniger Kraft verbraucht wird, so wird das Gewicht des Körpers in 24 Stunden weder zu- noch abnehmen; der Körper nimmt an Masse also nur dann zu, wenn die in den Schlafstunden gesammelte und zu mechanischen Effecten verwendbare Kraft weder für die willkürlichen, noch unwillkürlichen Bewegungen verzehrt wird.

Die angeführten approximativen Zahlenwerthe für den Kraftverbrauch im Organismus des Menschen beziehen sich, wie ausdrücklich hervorgehoben worden, nur auf eine gegebene, unveränderliche Temperatur; in ungleicher Temperatur

und bei Mangel an Nahrung müssen sich alle diese Verhältnisse ändern.

Wenn wir einen Körpertheil mit Eis und Schnee umgeben, während die übrigen in ihrer gewöhnlichen Beschaffenheit bleiben, so tritt mehr oder weniger schnell in Folge der Entziehung von Wärme, ein rascherer Stoffwechsel an der abgekühlten Stelle ein.

Der Widerstand der belebten Körpertheile gegen die Einwirkung des Sauerstoffs an der abgekühlten Stelle ist kleiner, als an allen übrigen Orten, was im Resultate ganz gleich ist einer Erhöhung des Widerstandes an diesen andern Orten.

Das Kraftmoment der Lebenskraft an den nicht abgekühlten Stellen wird nach wie vor zur mechanischen Bewegung verbraucht, allein die ganze Wirkung des eingeathmeten Sauerstoffs wendet sich der abgekühlten Stelle zu.

Denken wir uns einen Cylinder von Eisen, in den wir Dampf unter einem gewissen Drucke einströmen lassen, so wird, wenn die Kraft, mit welcher die Theile des Eisens zusammenhängen, gleich ist der Kraft, welche sie zu trennen strebt, ein Gleichgewichtszustand eintreten, d. h. die ganze Wirkung des Dampfes wird durch den Widerstand aufgehoben. Wenn aber eine der Wände des Cylinders beweglich ist, ein Stempel z. B., dem Druck des Dampfes also einen geringeren Widerstand entgegensetzt, als die anderen Wände, so wird der ganze Druck in der Bewegung dieser einen Wand, in der Hebung des Stempels, verzehrt. Wenn wir nicht

neuen Dampf (neue Kraft) hinzuſtrömen laſſen, ſo wird ſich bald ein Gleichgewichtszuſtand einſtellen. Einen gewiſſen Druck hält die Wand aus ohne ſich zu bewegen, durch einen größeren Druck wird der Stempel gehoben; wenn dieſer Ueberſchuß von Kraft verzehrt iſt durch die Bewegung, ſo wird er nicht weiter gehoben werden; wenn immer neuer Dampf hinzuſtrömt, ſo wird ſeine Bewegung fortdauern.

An der abgekühlten Stelle ſetzen die belebten Körpertheile der chemiſchen Action des Sauerſtoffs ein kleineres Hinderniß entgegen; ſeine Fähigkeit, mit ihren Beſtandtheilen eine Verbindung einzugehen, iſt an dieſem Orte erhöht; einmal ausgetreten hört aller Widerſtand völlig auf, und in Folge der Verbindung des Sauerſtoffs mit den Beſtandtheilen der umgeſetzten Gebilde wird ein größeres Maß von Wärme frei.

Für eine gegebene Quantität Sauerſtoff bleibt ſich die erzeugte Wärmemenge völlig gleich; an der abgekühlten Stelle nimmt der Stoffwechſel und damit die Wärmeentwicklung zu, an den anderen nimmt der Stoffwechſel (die Wärmeentwicklung) ab. Hat aber die abgekühlte Stelle, durch die Verbindung des Sauerſtoffs mit den ausgetretenen Körpertheilen, ihre urſprüngliche Temperatur wiedererhalten, ſo nimmt damit der Widerſtand ihrer belebten Körpertheile gegen den nachſtrömenden Sauerſtoff wieder zu, an allen übrigen Orten iſt aber nun der Widerſtand kleiner geworden, d. h. es tritt nun auch an dieſen ein raſcherer Stoffwechſel, eine Erhöhung der Temperatur ein, und mit dieſer wird, wenn die Urſache des Stoffwechſels fortdauert, ein größe-

res Maß von Lebenskraft zu mechanischen Effekten verwendbar.

Denken wir uns nun, daß der ganzen Oberfläche des Körpers Wärme entzogen wird, so wird die ganze Wirkung des Sauerstoffs der Haut zugelenkt werden, in kurzer Zeit muß der Stoffwechsel im ganzen Körper zunehmen; das Fett, so wie alle Bestandtheile des Thierkörpers, welche die Fähigkeit haben, mit dem in größerer Quantität zugeführten Sauerstoff sich zu verbinden, werden in der Form von Sauerstoffverbindungen aus dem Körper treten.

Theorie der Krankheit.

Ein jeder Stoff oder Materie, eine jede chemische oder mechanische Thätigkeit, welche die Wiederherstellung des Gleichgewichtes in den Aeußerungen der Ursachen des Verbrauches und Ersatzes in der Art ändert oder stört, daß sich ihre Wirkung den Ursachen des Verbrauches hinzufügt, heißt Krankheits-Ursache; es entsteht Krankheit, wenn die Summe von Lebenskraft, welche alle Ursachen von Störungen aufzuheben strebt (wenn also der Widerstand der Lebenskraft), kleiner ist, als die einwirkende, störende Thätigkeit.

Tod heißt der Zustand, wo aller Widerstand der Lebenskraft völlig aufhört; so lange dieser Zustand nicht eintritt,

äußern die belebten Körpertheile ſtets noch einen Widerſtand.

In der Beobachtung zeigt ſich die Wirkung einer Krankheitsurſache in dem geſtörten Verhältniſſe zwiſchen dem, einem jeden Lebensalter zukommenden, Verbrauch und Erſatz. In der Heilkunde heißt Krankheit jeder abnorme Zuſtand des Erſatzes oder Verbrauchs, in allen Körpertheilen oder in einem einzelnen Körpertheil.

Es iſt klar, daß eine und dieſelbe Krankheitsurſache auf den Organismus, je nach dem Lebensalter, eine höchſt ungleiche Wirkung äußern muß, daß ein gewiſſes Maß von Störung, welche Krankheit in dem erwachſenen Zuſtande bewirkt, ohne Einfluß auf die Lebensäußerungen im Kindes- oder Greiſenalter ſein kann. Eine Krankheitsurſache kann im Greiſenalter, wenn ſie ſich der Wirkung der Urſache des Verbrauchs hinzufügt, den Tod bewirken (allen Widerſtand der Lebenskraft vernichten), während ſie im reifen Lebensalter nur ein Mißverhältniß im Verbrauch und Erſatz (Krankheit), und im Kindesalter nur ein Gleichgewichtsverhältniß zwiſchen Verbrauch und Erſatz, das iſt, den abſtracten Zuſtand von Geſundheit, hervorbringt.

Eine Krankheitsurſache, welche die Urſache des Erſatzes verſtärkt, entweder direct, oder inſofern die Urſache des Verbrauchs in ihrer Wirkung dadurch geſchwächt wird, hebt den relativ normalen Geſundheitszuſtand im Kindesalter und im reifen Alter auf, und ſetzt im Greiſenalter Verbrauch und Erſatz in's Gleichgewicht.

Ein Kind erträgt, leicht gekleidet, Abkühlung durch hohe

Kältegrade ohne Störung seiner Gesundheit, seine zu mechanischen Effekten verwendbare Kraft, so wie seine Temperatur nehmen mit dem durch Abkühlung sich einstellenden Stoffwechsel zu, während ein hoher Wärmegrad, welcher den Stoffwechsel hindert, einen krankhaften Zustand nach sich zieht.

Wir sehen im Gegensatze hierzu in den Hospitälern und in den wohlthätigen Anstalten (in Brüssel ꝛc.), in welchen alte Leute ihre letzten Lebenstage zubringen, daß, wenn die Temperatur des Schlafraums (im Winter) zwei bis drei Grade unter die erwartete Temperatur fällt, daß durch diese schwache Abkühlung der Tod von den ältesten und an sich schwächsten Greisen und Greisinnen herbeigeführt wird; man findet sie in ihren Betten ruhig liegend ohne die geringsten Symptome von Krankheit oder anderen erkennbaren Ursachen des Todes.

Mangel an Widerstand eines belebten Körpertheils gegen die Ursachen des Verbrauchs ist, wie sich von selbst versteht, Mangel an Widerstand gegen die Einwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs.

Wenn nun durch irgend eine Ursache der Störung in einem belebten Körpertheil dieser Widerstand abnimmt, so nimmt in gleichem Grade der Stoffwechsel zu.

Da nun die Bewegungserscheinungen in dem Thierkörper abhängig sind von dem Stoffwechsel, so folgt mit der Steigerung des Stoffwechsels in irgend einem Körpertheil, von selbst, eine Beschleunigung aller Bewegungen; je nach der Fortpflanzungsfähigkeit der Nerven vertheilt sich die ver-

wendbare Kraft auf die Leiter der unwillkürlichen Bewegungen allein oder auf alle zusammengenommen.

Wird demnach in Folge einer krankhaften Umsetzung der belebten Körpertheile ein größeres Maß von Kraft erzeugt, als zur Hervorbringung der normalen Bewegung erforderlich ist, so zeigt sich dies in einer Beschleunigung aller oder einzelner, unwillkürlichen Bewegungen, so wie in einer höheren Temperatur des kranken Körpertheils.

Dieser Zustand heißt Fieber.

Bei einem Uebermaß von Krafterzeugung durch Stoffwechsel überträgt sich die Kraft (da sie nur durch Bewegung verzehrt werden kann), auf die Apparate der willkürlichen Bewegung.

Dieser Zustand heißt Fieberparoxysmus.

In Folge der durch den Fieberzustand beschleunigten Blutbewegung wird in einer gegebenen Zeit dem kranken Ort sowohl, wie allen anderen Orten, ein größeres Maß arterielles Blut und damit Sauerstoff hinzugeführt, und wenn die thätige Kraft an den gesunden Orten in ihrer Aeußerung sich gleich bleibt, so muß die ganze Wirkung des mehr hinzugeführten Sauerstoffs sich auf den kranken Ort allein erstrecken.

Je nachdem ein einzelnes Organ oder ein System von Organen, krank ist, erstreckt sich der Stoffwechsel auf einen einzelnen Ort, oder auf das ganze ergriffene System.

Entstehen an den kranken Orten in Folge des Stoffwechsels aus den Bestandtheilen des Gebildes oder Blutes

neue Producte, welche die nächstliegenden Theile zu ihren eigenen vitalen Function nicht verwenden können, sind ihre Umgebungen unfähig, sie anderen Orten, wo sie eine Veränderung erfahren können, zuzuführen, so erleiden sie an dem Orte selbst, wo sie sich gebildet haben, einen der Verwesung, Fäulniß oder Gährung ähnlichen Umsetzungsproceß.

In gewissen Fällen beseitigt die Heilkunde diese Krankheitszustände, indem sie in der Nähe des kranken, oder an irgend einem andern passenden Ort, einen künstlichen Krankheitszustand (Blasenpflaster, Senfpflaster, Haarseil ꝛc.) hervorbringt, indem sie an diesen Orten den Widerstand der Lebensthätigkeit durch künstliche Störungen vermindert; es gelingt dem Arzte, den ursprünglichen Krankheitszustand zu heben, wenn die hervorgebrachte Störung (der verringerte Widerstand) die zu besiegende Krankheitsstörung überwiegt.

Der raschere Stoffwechsel und die höhere Temperatur an dem kranken Orte zeigt, daß der Widerstand der Lebensthätigkeit an dem kranken Orte gegen den Sauerstoff schwächer ist, wie im gesunden Zustande, aber erst mit dem Tode hört er völlig auf. Durch die künstliche Verminderung des Widerstandes an einem andern Körpertheil wird der Widerstand des ursprünglich kranken Theils zwar direct nicht verstärkt, allein die chemische Action (die Ursache des Stoffwechsels) nimmt an dem kranken Körpertheil ab, indem sie einem andern Orte zugelenkt wird, wo es der Kunst des Arztes gelungen ist, einen noch geringern Widerstand gegen Stoffwechsel (gegen die Einwirkung des Sauerstoffs) hervor-

zubringen. Es tritt eine vollkommne Hebung der urſprünglichen Krankheit ein, wenn Widerſtand und Einwirkung an dem kranken Körpertheil ins Gleichgewicht gebracht ſind. Es erfolgt Geſundheit, Wiederherſtellung des kranken Körpertheils in ſeinem urſprünglichen Zuſtande, wenn es gelingt, die ſtörende Action des Sauerſtoffs durch irgend ein Mittel ſo weit zu ſchwächen, daß ſie kleiner wird, als der Widerſtand der unausgeſetzt vorhandenen, wiewohl verminderten Lebensthätigkeit; denn dies iſt die Bedingung der Zunahme an Maſſe im lebendigen Organismus überhaupt.

In Fällen anderer Art, wo die äußeren künſtlichen Störungen ohne Wirkung ſind, ſchlägt der praktiſche Arzt, um den Widerſtand der Lebensthätigkeit zu erhöhen, andere indirecte Wege ein, auf welche die vollendetſte Theorie, weder ſcharfſichtiger noch richtiger, hätte führen können; er vermindert nämlich durch Blutentziehung die Anzahl der Träger des Sauerſtoffs und damit die Bedingung des Stoffwechſels; er ſchließt in der Speiſe alle Stoffe aus, welche die Fähigkeit beſitzen, zu Blut zu werden; er giebt ausſchließlich oder vorzugsweiſe nur ſtickſtofffreie Nahrung, welche den Reſpirationsproceß unterhält, ſo wie Obſt und Theile von Vegetabilien, welche die zu den Secreten nöthigen Alkalien enthalten.

Gelingt es ihm, die Einwirkung des Sauerſtoffs im Blute auf den kranken Körpertheil ſo weit zu vermindern, daß die Lebensthätigkeit des letztern, ſein Widerſtand, die chemiſche Action nur etwas überwiegt, und geſchieht dies, ohne den

Functionen der anderen Organe eine Grenze zu setzen, so ist die Wiederherstellung gewiß.

Zu der in diesen Fällen mit Geschick und Beobachtungsgabe angewendeten Heilmethode fügt sich, man kann sagen zur Hülfe des kranken Körpertheils, die Lebenskraft der übrigen, nicht ergriffenen Theile hinzu, denn durch Blutentziehung, durch Ausschluß der zur Blutbildung nöthigen Speise, nimmt ja auch auf sie die äußere Ursache der Störung ab, welche ihre eigne Lebenskraft im Gleichgewicht erhielt; ihre eigne Thätigkeit erhält ein Uebergewicht; der Stoffwechsel nimmt zwar im ganzen Körper ab, und damit die Bewegungserscheinungen, allein die Summe aller Widerstände zusammengenommen nimmt zu in dem Grade, wie der auf sie in dem Blute einwirkende Sauerstoff sich vermindert. In dem Gefühl von Hunger gelangt gewissermaßen dieser Widerstand zum Bewußtsein, und die überwiegende Lebensthätigkeit zeigt sich bei vielen Verhungernden in einer abnormalen Zunahme oder einer abnormalen Umsetzung gewisser Theile von Organen. Mitleidenschaft heißt eine Uebertragung des geringern Widerstandes der Lebensthätigkeit von einem kranken Körpertheil nicht gerade auf die zunächstliegenden, sondern auf andere Organe, wenn die Functionen beider sich gegenseitig bedingen. Wenn die Verrichtungen des kranken Organs mit denen eines andern in Verbindung stehen, wenn das eine z. B. die Materien nicht mehr producirt, welche zur vitalen Function des andern gehören, so überträgt sich auf diese, wiewohl nur scheinbar, der Krankheitszustand.

Ueber die Natur und das Weſen der Lebenskraft kann man ſich wohl keiner ſelbſtgeſchaffenen Täuſchung hingeben, wenn man beachtet, daß ſie ſich in allen ihren Aeußerungen ganz ähnlich wie andere Naturkräfte verhält, daß ſie ohne Bewußtſein, völlig willenlos, einem Blaſenpflaſter untergeordnet iſt.

Die Nerven, welche die willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen im Thierkörper vermitteln, ſind, nach dem Vorhergehenden, nicht die Erzeuger, ſondern nur die Leiter der Lebenskraft; ſie pflanzen die Bewegung fort und verhalten ſich gegen andere Urſachen von Bewegungen, welche in ihren Aeußerungen der Lebenskraft ähnlich ſind, gegen einen elektriſchen Strom z. B. auf eine völlig gleiche Weiſe, ſie geſtatten ihm den Durchgang und bieten als Leiter der Elektricität alle Erſcheinungen dar, welche ihnen als Leitern der Lebenskraft zukommen. Niemandem wird es wohl, nach dem gegenwärtigen Zuſtande unſerer Kenntniſſe, in den Sinn kommen, als die Urſache der Bewegungserſcheinungen in dem Thierkörper die Elektricität anzuſehen, allein die mediciniſchen Wirkungen der Elektricität, ſo wie die eines Magneten, der in Berührung mit dem Körper die Entſtehung eines elektriſchen Stromes vermittelt, können nicht geleugnet werden. Denn zu der vorhandenen Kraft der Bewegung und Störung addirt ſich in dem elektriſchen Strome eine neue Urſache von Bewegung, Form- und Beſchaffenheitsänderung, deren Wirkungen nicht gleich Null geſetzt werden dürfen.

Auf eine höchst rationelle Weise wendet die praktische Medicin in manchen Krankheiten die Kälte als Mittel an, um den Stoffwechsel auf eine ungewöhnliche Weise zu steigern und zu beschleunigen. Dies geschieht namentlich bei gewissen krankhaften Zuständen der Substanz des Centrums der Bewegungsapparate, wenn eine glühende Hitze und ein rascher Strom von Blut nach dem Kopfe, eine abnormale Umsetzung des Gehirns erkennen lassen. Wenn dieser Zustand über eine gewisse Zeit hindurch dauert, so giebt die Erfahrung zu erkennen, daß alle Bewegungen im Thierkörper aufhören; wenn sich der Stoffwechsel auf das Gehirn vorzugsweise beschränkt, so nimmt der Stoffwechsel, die Krafterzeugung, in allen anderen Theilen ab; durch Umgebung dieses Körpertheils mit Eis wird die Temperatur herabgestimmt, allein die Ursache der Wärmeentwicklung dauert fort; der Widerstand der Lebensthätigkeit wird vermindert, die Umsetzung, die Entscheidung über den Ausgang der Krankheit, wird auf eine kürzere Zeitdauer beschränkt. Man darf nicht vergessen, daß das Eis schmilzt und Wärme aus dem kranken Körpertheil aufnimmt, daß mit der Entfernung des Eises, vor dem Verlauf der Umsetzung, die höhere Temperatur wieder sich einstellt, daß man durch Umgebung mit Eis weit mehr Wärme entzieht, als durch Umhüllung mit einem schlechten Wärmeleiter; es ist offenbar in der gleichen Zeit eine größere Menge Wärme frei geworden, was nur durch gesteigerte Zufuhr von Sauerstoff, der eine raschere Umsetzung bedingen mußte, möglich ist.

Ein nicht ganz unpassendes Bild für die Vorgänge im Thierkörper geben die sich selbst regulirenden Dampfmaschinen ab, an denen zur Hervorbringung einer gleichförmigen Bewegung der menschliche Geist den bewundernswürdigsten Scharfsinn bethätigt hat.

Jedermann weiß, daß in dem Rohre, was den Dampf zu dem Cylinder führt, in welchem ein Stempel in die Höhe gehoben werden soll, ein durchbrochener Hahn angebracht ist, durch dessen Oeffnung aller Dampf seinen Weg nehmen muß; durch eine mit dem Schwungrad in Verbindung stehende Vorrichtung öffnet sich dieser Hahn, wenn das Rad langsamer, es schließt sich mehr oder weniger, wenn es geschwinder geht, als zur gleichförmigen Bewegung erforderlich ist. Mit dem Oeffnen des Hahns strömt mehr Dampf zu (mehr Kraft), die Bewegung der Maschine wird beschleunigt; mit dem Schließen des Hahns wird der hinzuströmende Dampf mehr oder weniger abgeschlossen, die Kraft, welche auf den Stempel wirkt, nimmt ab, die Spannung des Dampfes im Kessel nimmt zu; sie wird zu einer spätern Verwendung aufgespart. Die Spannung des Dampfes, die Kraft, wenn man will, wird hervorgebracht durch Stoffwechsel, durch Verbrennung von Kohlen unter dem Heerde der Maschine. Die Kraft steigt (die Menge des entwickelten Dampfes und seine Spannung nehmen zu) mit der Temperatur des Heerdes, welche abhängig ist von Zufuhr an Kohlen und Luft. Es finden sich an diesen Maschinen andere Vorrichtungen, welche beide zu reguliren bestimmt sind.

Steigt die Spannung des Dampfes im Kessel, so schließen sich die Luftzüge, die Verbrennung wird verlangsamt, die Zufuhr an Kraft (an Dampf) vermindert; geht die Maschine langsamer, so strömt ihr mehr Dampf zu, die Luftzüge öffnen sich und die Ursache der Wärmeentwicklung (Krafterzeugung) nimmt zu, eine letzte Vorrichtung wirft dem Heerde ohne Unterlaß Kohlen zu.

Wenn wir nun an irgend einer Stelle des Dampfkessels die Temperatur erniedrigen, so nimmt seine Spannung ab; dies giebt sich sogleich an den Regulatoren der Kraft zu erkennen, die nun ganz die Functionen verrichten, wie wenn wir eine gewisse Quantität Dampf (Kraft) aus dem Kessel hätten heraustreten lassen; der Dampfregulator, die Luftzüge öffnen sich, die Maschine wirft sich selbst eine größere Menge Kohlen zu.

Ganz ähnlich wie in diesen Maschinen, verhält es sich im Thierkörper hinsichtlich der Wärme und Krafterzeugung. Mit der Abnahme der äußern Temperatur verstärken sich die Athembewegungen, es wird Sauerstoff häufiger und in verdichteterem Zustande zugeführt, der Stoffwechsel erhöht sich, es muß mehr Nahrungsstoff zugeführt werden, wenn die Temperatur nicht wechseln soll.

Es bedarf wohl keiner Erinnerung, daß ein gespannter Dampf in dem Thierkörper, so wenig wie ein elektrischer, Strom, als die Ursache der Krafterzeugung angesehen werden kann.

Aus der in dem Obigen entwickelten Theorie der Krank-

heit ergiebt sich von selbst, daß ein ausgebildeter Krankheitszustand in einem Körpertheil durch die chemische Action eines Arzneimittels nicht zum Verschwinden gebracht werden kann.

Einem abnormalen Umsetzungsproceß kann durch Arzneimittel eine Grenze gesetzt werden, er kann beschleunigt oder verlangsamt werden, allein damit ist der Normal- (Gesundheits-) Zustand nicht zurückgekehrt.

Die Kunst des Arztes besteht in der Kenntniß der Mittel, die ihm gestatten, einen Einfluß auf den Verlauf der Krankheit auszuüben, und in der Beseitigung und Entfernung aller störenden Ursachen, deren Wirkung sich der Wirkung der Krankheitsursache hinzufügt.

Eine jede Theorie bringt nur durch die richtige Anwendung ihrer Principien einen wirklichen Nutzen. Eine und dieselbe Heilmethode kann dem einen Individuum die Gesundheit wiedergeben, während sie, auf ein anderes angewandt, den sichern Tod nach sich zieht. So hat in gewissen, entzündlichen Krankheiten, bei muskelreichen Personen, die antiphlogistische Behandlung ihren entschiedenen Werth, während Blutentziehung bei anderen von nachtheiligen Folgen begleitet ist. Das belebende Blut bleibt immer die wichtigste Bedingung zur Wiederherstellung eines aufgehobenen Gleichgewichts-Zustandes, welche stets an den Gewinn von Zeit geknüpft ist; es muß als die letzte und wichtigste Ursache eines dauernden, vitalen Widerstandes der kranken sowohl, wie der nicht ergriffenen Körpertheile angesehen und im Auge behalten werden.

Es iſt ferner klar, daß in allen Krankheiten, wo das Fieber die Bildung von Anſteckungsſtoffen und Exenthemen begleitet, zwei Krankheitszuſtände ſich neben einander vollenden, und daß das Blut (Fieber) als der Träger des Stoffs (Sauerſtoffs), ohne deſſen Mitwirkung die krankhaften Erzeugniſſe nicht unſchädlich gemacht, zerſtört und aus dem Körper entfernt werden können, reaktionell als Heilmittel auftritt, durch deſſen Mitwirkung zuletzt eine Ausgleichung bewirkt wird.

Theorie der Reſpiration.

Bei dem Durchgang des venöſen Blutes durch die Lunge ändern die Blutkörperchen ihre Farbe, mit dieſem Farbewechſel beobachten wir, daß Sauerſtoff aus der Luft aufgenommen, daß für jedes Volumen Sauerſtoff in den meiſten Fällen, ein ihm gleiches Volumen Kohlenſäure abgeſchieden wird.

Die Blutkörperchen enthalten eine Eiſenverbindung, kein anderer Beſtandtheil der lebendigen Körpertheile enthält Eiſen.

Welche Art von Veränderung auch die übrigen Beſtandtheile des Blutes in der Lunge erleiden mögen, gewiß iſt, daß die Blutkörperchen des venöſen Blutes einen Farbewechſel erfahren, welcher abhängig iſt von der Einwirkung des Sauerſtoffs.

Wir sehen nun, daß die Blutkörperchen des arteriellen Blutes in den weiten Kanälen ihre Farbe bewahren, daß sie sie erst bei dem Durchgange durch die Capillargefäße verlieren. Alle Bestandtheile des venösen Blutes, welche die Fähigkeit hatten sich mit Sauerstoff zu verbinden, nehmen in der Lunge einen entsprechenden Theil davon auf; Versuche mit Serum zeigen, daß es mit reinem Sauerstoff in Berührung dessen Volumen nicht merklich ändert. Venöses Blut mit Sauerstoff in Berührung röthet sich unter Absorption des Sauerstoffs; es wird hierbei eine entsprechende Menge Kohlensäure gebildet.

Es ist klar, der Farbewechsel der Blutkörperchen hängt von der Verbindung von irgend einem ihrer Bestandtheile mit dem Sauerstoff ab, und mit dieser Sauerstoffaufnahme tritt eine gewisse Quantität Kohlensäure aus.

Von dem Serum scheidet sich diese Kohlensäure nicht ab, denn es besitzt nicht die Fähigkeit, bei Berührung mit Sauerstoff Kohlensäure abzugeben; das Blut von den Blutkörperchen getrennt (das Serum) absorbirt sein halbes bis gleiches Volumen Kohlensäure (siehe den Artikel Blut in dem Handwörterbuche der Chemie von Poggendorff, Wöhler und Liebig, Seite 877), es ist bei gewöhnlicher Temperatur nicht mit Kohlensäure gesättigt.

Das arterielle Blut geht, von dem Thiere genommen, unausgesetzt einer Veränderung entgegen, seine hochrothe Farbe wird schwarzroth; das hochrothe Blut, was seine Farbe den Blutkörperchen verdankt, wird schwarzroth durch

Kohlensäure; diese Farbeänderung trifft die Blutkörperchen; es absorbirt eine Menge Gase, welche sich in der Blutflüssigkeit (ohne Blutkörperchen) nicht lösen; es ist klar, die Blutkörperchen haben das Vermögen, sich mit Gasen zu verbinden.

Die Blutkörperchen ändern ihre Farbe in verschiedenen Gasen; dieser Wechsel kann von zwei Ursachen, einer Verbindung oder einer Zersetzung herrühren.

Durch Schwefelwasserstoff werden sie schwarzgrün und zuletzt schwarz, die ursprüngliche röthe Farbe kann durch Contact mit Sauerstoffgas nicht wieder hervorgebracht werden; es ist offenbar hier eine Zersetzung vor sich gegangen.

Die durch Kohlensäure schwarzroth gewordenen Blutkörperchen werden beim Contact mit Sauerstoff unter Abscheidung von Kohlensäure wieder hochroth, ähnlich verhalten sie sich gegen Stickoxydulgas; es ist klar, daß sie keine Zersetzung erfahren hatten; sie besitzen also die Fähigkeit, eine Verbindung mit Gasen einzugehen, ihre Verbindung mit Kohlensäure wird durch Sauerstoff wieder aufgehoben; sich selbst überlassen, wird außerhalb des Thierkörpers die Sauerstoffverbindung wieder schwarzroth, ohne durch Sauerstoff wieder hochroth zu werden.

Die Blutkörperchen enthalten eine Eisenverbindung.

Aus dem nie fehlenden Eisengehalt des rothen Blutes muß geschlossen werden, daß er unbedingt für das animalische Leben nothwendig sei, und seitdem die Physiologie bewiesen hat, daß die Blutkörperchen an dem Ernährungspro-

ceſſe keinen Antheil nehmen, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß ſie in dem Reſpirationsproceß eine Rolle übernehmen.

Die Eiſenverbindung in den Blutkörperchen verhält ſich wie eine Sauerſtoffverbindung, denn durch Schwefelwaſſerſtoff wird ſie ganz auf dieſelbe Weiſe zerlegt, wie die Eiſenoxyde oder die ihnen ähnlichen Eiſenverbindungen. Durch verdünnte Mineralſäuren läßt ſich aus friſchem oder getrocknetem Blutroth Eiſenoxyd, bei gewöhnlicher Temperatur ausziehen.

Das Verhalten der Eiſenverbindungen giebt vielleicht Aufſchluß über die Rolle, welche das Eiſen in dem Reſpirationsproceſſe ſpielt; kein einziges Metall kann in Beziehung auf merkwürdige Eigenſchaften mit den Eiſenverbindungen verglichen werden.

Die Eiſenoxydulverbindungen beſitzen das Vermögen anderen Sauerſtoffverbindungen Sauerſtoff zu entziehen; die Eiſenoxydverbindungen geben Sauerſtoff unter anderen Bedingungen mit der allergrößten Leichtigkeit wieder ab.

Eiſenoxydhydrat in Berührung mit ſchwefelfreien organiſchen Materien verwandelt ſich in kohlenſaures Eiſenoxydul.

Kohlenſaures Eiſenoxydul in Berührung mit Waſſer und Sauerſtoff wird zerſetzt, alle Kohlenſäure, die es enthält, entweicht; durch Aufnahme von Sauerſtoff verwandelt es ſich in Eiſenoxydhydrat, was durch reducirende Materien wieder zurückführbar iſt in eine Eiſenoxydulverbindung.

Aber nicht bloß die Sauerſtoffverbindungen des Eiſens, ſondern auch die Cyanverbindungen zeigen ein ähnliches Ver-

halten. In dem Berlinerblau haben wir Eisen in Verbindung mit allen organischen Bestandtheilen des Thierkörpers: Wasserstoff und Sauerstoff (Wasser), Kohlenstoff und Stickstoff (Cyan).

Dem Lichte ausgesetzt, entweicht Cyan, es wird weiß, im Dunkeln zieht es Sauerstoff an und wird wieder blau.

Alle diese Beobachtungen zusammengenommen führen zu der Meinung, daß die Blutkörperchen des arteriellen Blutes eine mit Sauerstoff gesättigte Eisenverbindung enthalten, welche im lebendigen Blute beim Durchgang durch die Capillargefäße ihren Sauerstoff verliert; dasselbe geschieht, wenn das Blut vom Körper genommen sich zu zersetzen anfängt (zu faulen beginnt); die an Sauerstoff reiche Verbindung geht also durch Sauerstoffabgabe (Reduction) in eine sauerstoffarme Verbindung über. Eins der Oxydationsproducte, welches hierbei gebildet wird, ist Kohlensäure. Die Eisenverbindung des venösen Bluts besitzt die Fähigkeit, sich mit Kohlensäure zu verbinden; es ist klar, daß die Blutkörperchen des arteriellen Blutes, wenn sie nach Abgabe von einem Theile ihres Sauerstoffs Kohlensäure vorfinden, sich mit dieser Kohlensäure verbinden werden.

In der Lunge angelangt werden sie den verlornen Sauerstoff wieder aufnehmen, für jedes Volumen Sauerstoff wird eine entsprechende Menge Kohlensäure wieder austreten, sie werden in ihren ursprünglichen Zustand wieder zurückkehren, d. h. das Vermögen wieder erhalten, Sauerstoff abzugeben.

Für jedes Volum Sauerstoff, was die Blutkörperchen

abzugeben vermögen, wird (da die Kohlensäure ihr gleiches Volum Sauerstoff ohne Condensation enthält) nicht mehr und nicht weniger als ein Volumen kohlensaures Gas gebildet werden können; für jedes Volumen Sauerstoff, was sie aufzunehmen fähig sind, kann nicht mehr Kohlensäure abgeschieden werden, als überhaupt aus diesem Volum Sauerstoff erzeugbar ist.

Wenn ein kohlensaures Eisenoxydul durch Aufnahme von Sauerstoff in Eisenoxyd übergeht, so werden für jedes Volum Sauerstoff, was zum Uebergang in Eisenoxyd gehört, vier Volumina Kohlensäure abgeschieden.

Für ein Volumen Sauerstoff kann sich aber nur ein Volumen Kohlensäure bilden, es kann also auch nicht mehr abgeschieden werden; die ihres Sauerstoffs beraubte Verbindung muß aber die Fähigkeit haben, noch Kohlensäure aufzunehmen, und wir sehen in der That, daß das Blut in keinem Zustande des Lebens mit Kohlensäure gesättigt ist, daß es zu der Kohlensäure, die es schon enthält, noch eine Menge Kohlensäure aufzunehmen vermag, ohne daß damit die Function der Blutkörperchen gestört erscheint. (Nach dem Trinken von moussirenden Weinen, Bier, Mineralwasser muß nothwendig mehr Kohlensäure ausgeathmet werden.) In allen Fällen, wo der Sauerstoff der Blutkörperchen nicht zur Bildung von Kohlensäure gedient hat, wird stets nur eine der erzeugten Kohlensäure entsprechende Menge ausgeathmet werden können; bei Genuß von Fett und Wein jedenfalls weniger, wie nach dem Genuß von Champagner.

Nach der ſo eben entwickelten Vorſtellung geben die Blutkörperchen des arteriellen Blutes, bei ihrem Durchgang durch die Capillargefäße, Sauerſtoff an gewiſſe Beſtandtheile des Thierkörpers ab. Ein kleiner Theil dieſes Sauerſtoffs dient zur Hervorbringung des Stoffwechſels und bedingt das Austreten belebter Körpertheile, ſo wie die Bildung und Erzeugung der Secrete, der größte Theil dieſes Sauerſtoffs wird zur Verwandlung der, den belebten Körpertheilen nicht mehr angehörenden Subſtanzen, in Sauerſtoffverbindungen verwendet.

Auf ihrem Wege nach dem Herzen hin, verbinden ſich die Blutkörperchen, welche ihren Sauerſtoff abgegeben haben, mit Kohlenſäuregas zu venöſem Blut, in der Lunge angelangt, findet ein Austauſch ſtatt.

Die organiſche Eiſenverbindung des venöſen Blutes nimmt in der Lunge und der Luft den verlornen Sauerſtoff wieder auf, und in Folge dieſer Sauerſtoffaufnahme ſcheidet ſich alle damit verbundene Kohlenſäure wieder ab.

Alle in dem venöſen Blute vorhandenen Materien, welche Verwandtſchaft zum Sauerſtoff beſitzen, verwandeln ſich in der Lunge, ähnlich wie die Blutkörperchen, in höhere Sauerſtoffverbindungen, es entſteht eine gewiſſe Quantität Kohlenſäure, von der ſtets ein Theil in der Blutflüſſigkeit gelöſ't bleibt.

Die Quantität der gelöſ'ten (oder der an Natron gebundenen) Kohlenſäure muß in beiden Blutarten, da ſie einerlei Temperatur beſitzen, gleich ſein, allein das arterielle

Blut muß, sich selbst überlassen, nach kurzer Zeit eine größere Menge Kohlensäure enthalten, wie das venöse, weil der aufgenommene Sauerstoff zur Bildung von Kohlensäure verwendet wird.

In dem Organismus des Thieres finden mithin zwei Oxydationsprocesse statt, der eine in der Lunge, der andere in den Capillargefäßen. Durch den erstern wird, trotz der starken Abkühlung und gesteigerten Verdunstung, die constante Temperatur der Lunge, durch den andern die constante Temperatur in den übrigen Körpertheilen hervorgebracht.

Ein Mensch, welcher täglich 27,8 Loth Kohlenstoff in der Form von Kohlensäure ausathmet, verzehrt in 24 Stunden 74 Loth Sauerstoff (64 Loth = 1 Kilogramm), welche den Raum von 807 Litres = 51648 hessische Kubikzoll (64 = 1 Litre) einnehmen.

Rechnet man auf die Minute 18 Athemzüge, so haben wir in 24 Stunden 25920 Athemzüge und bei jedem Athemzug werden demnach $\frac{51648}{25920} = 1{,}99$ Kubikzoll Sauerstoff in das Blut aufgenommen.

In einer Minute treten $18 \times 1{,}99 = 35{,}8$ Kubikzoll Sauerstoff zu den Bestandtheilen des Blutes, welche bei gewöhnlicher Temperatur etwas weniger wie 12 Gran (802,8 Milligramm) wiegen.

Nehmen wir nun an, daß in einer Minute 10 Pfund Blut (5 Kilogramm) (Müller, Physiologie Bd I. S. 345) durch die Lunge gehen und diese den Raum von 320 Ku-

bikzoll einnehmen, so verbindet sich 1 Kubikzoll Sauerstoff sehr nahe mit 9 Kubikzoll Blut.

Nach den Untersuchungen von Denis, Richardson, Nasse (Handwörterbuch der Physiologie Bd. I. S. 138) enthalten 10000 Blut 8 Theile Eisenoxyd. 76800 Gran (10 Pfd.) Blut enthalten demnach 61,54 Gran Eisenoxyd im arteriellen oder 55,14 Eisenoxydul im venösen Blut.

Nehmen wir nun an, das Eisen in den Blutkörperchen des venösen Blutes sei als Eisenoxydul, das im arteriellen Blut als Eisenoxyd enthalten, so nehmen 55,14 Gran Eisenoxydul bei ihrem Durchgang durch die Lunge in einer Minute 6,40 Gran Sauerstoff auf; da nun in dieser Zeit im Ganzen von 10 Pfund Blut 12 Gran Sauerstoff aufgenommen werden, so treten von diesen 12 Gran, 5,6 Gran an die anderen Bestandtheile des Blutes.

55,14 Gran Eisenoxydul verbinden sich nun mit 34,8 Gran Kohlensäure, welche den Raum von 73 Kubikzoll einnehmen. Es ist deshalb klar, daß die in dem Blute vorhandene Menge Eisen, als Eisenoxydul gedacht, hinreicht, um den Träger der doppelten Menge Kohlensäure abzugeben, welche überhaupt auf Kosten alles in der Lunge aufgenommenen Sauerstoffs erzeugbar ist.

Die eben entwickelte Hypothese stützt sich auf die bekannten Beobachtungen und zwar erklärt sie den Respirationsproceß, soweit er von den Blutkörperchen abhängig ist, vollkommen, sie schließt die Meinung nicht aus, daß auch auf anderen Wegen Kohlensäure in die Lunge gelangen, daß gewisse

andere Bestandtheile des Bluts zur Bildung von Kohlensäure in der Lunge Veranlassung geben können; allein alles dies steht in keiner Beziehung zu dem vitalen Proceß, durch welchen in allen Theilchen des Körpers die zu seinem Bestehen nöthige Wärme erzeugt wird. Dies allein kann aber vorläufig nur als ein würdiger Gegenstand der Untersuchung betrachtet werden; warum dunkelrothes Blut durch Salpeter, Kochsalz ꝛc. hellroth wird, ist eine nicht uninteressante Frage, die aber mit dem Athmungsproceß in keinem Zusammenhange steht.

Die furchtbare Wirkung des Schwefelwasserstoffs, der Blausäure, welche beim Einathmen in wenigen Secunden allen Bewegungserscheinungen im Thierkörper eine Grenze setzen, erklären sich aus den bekannten Veränderungen, welche alle Eisenverbindungen bei Gegenwart von Alkalien, die im Blute nicht fehlen, durch diese Stoffe erleiden, auf eine ungezwungene Weise.

Denken wir uns, daß die Blutkörperchen ihre Fähigkeit verlieren, Sauerstoff aufzunehmen, diesen Sauerstoff wieder abzugeben und die gebildete Kohlensäure fortzuführen, so wird ein solcher hypothetischer Krankheitszustand augenblicklich an der Temperatur und den Bewegungserscheinungen im Thierkörper erkennbar sein. Es wird nämlich kein Stoffwechsel stattfinden, ohne daß damit die Bewegungen selbst eine unmittelbare Grenze finden.

Die Leiter der Kraft werden den Eingeweiden, dem Herzen, nach wie vor, die zu ihren Functionen nöthige Kraft

zuführen, ſie werden ſie von dem Muskularſyſtem erhalten, ohne aber daß aus dieſen ein Beſtandtheil austritt; Galle- und Harnſecretion können nicht ſtattfinden; die Temperatur des Körpers muß abnehmen.

Dem Ernährungsproceß wird durch dieſen Zuſtand eine Grenze geſetzt und in kürzerer oder längerer Zeit muß der Tod eintreten, ohne, was hier das Wichtigſte iſt, von Fiebererſcheinungen begleitet zu ſein.

Dieſes Beiſpiel ſoll dazu dienen, um Veranlaſſung zu einer Unterſuchung des Bluts in Krankheitszuſtänden ähnlicher Art, zu geben, denn es kann nicht dem geringſten Zweifel unterliegen, daß die Rolle, welche den Blutkörperchen zugeſchrieben worden iſt, als vollkommen ausgemittelt und aufgeklärt betrachtet werden kann, wenn ſich in ſolchen Zuſtänden eine Abweichung in der Form, Beſchaffenheit und dem Verhalten der Blutkörperchen ergiebt, die durch geeignete Reagentien erkennbar ſein muß.

Wenn die Kraft, welche die Lebenserſcheinungen bedingt, als eine Eigenſchaft gewiſſer Materien angeſehen wird, ſo führt dieſe Vorſtellung von ſelbſt auf eine neue und ſchärfere Betrachtungsweiſe gewiſſer räthſelhafter Erſcheinungen, welche die nämlichen Subſtanzen in Zuſtänden darbieten, wo ſie keine Beſtandtheile belebter Organismen mehr ausmachen.

Analytiſche Belege

zu

dem chemiſchen Proceß

der

Reſpiration und Ernährung

ſo wie

zu dem chemiſchen Proceß

der

Umſetzung der Gebilde.

Die Noten correſpondiren mit den in den Abſchnitten im Texte aufgeführten Nummern.
Alle mit * bezeichneten Zahlenreſultate der Analyſen ſind in dem chemiſchen Laboratorium in Gießen ausgeführt.

Anhang.

Seite 1. Einleitung zu den Analysen.

Erklärung der Formeln.

Die frühere Darstellung der Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Stoffe, die Angabe des Gehaltes in ihren Bestandtheilen nach Procenten, ist von den Chemikern längst verlassen, weil sie keine Einsicht in die Beziehungen gestattet, welche zwischen zwei und mehr Verbindungen stattfinden. Um hiervon einige Beispiele zu geben, soll die Zusammensetzung der Essigsäure und des Aldehyds, des Bittermandelöls und der Benzoesäure hier erwähnt werden.

	Essigsäure	Aldehyd*	Benzoesäure*	Bittermandelöl*
Kohlenstoff	40,00	55,024	69,25	79,56
Wasserstoff	6,67	8,983	4,86	5,56
Sauerstoff	53,33	35,993	25,89	14,88

Aldehyd verwandelt sich nun in Essigsäure, Bittermandelöl in Benzoesäure durch Aufnahme von Sauerstoff, ohne daß sich an ihren Elementen sonst irgend etwas ändert. In den bloßen Zahlenverhältnissen läßt sich diese Beziehung nicht erkennen, drücken wir aber die Zusammensetzung beider in einer Formel aus, so fällt der Zusammenhang zwischen die-

ſen Materien auch demjenigen in die Augen, welcher von der Chemie nichts weiß, als daß der Buchſtabe C ein Aequivalent Kohlenſtoff, H 1 Aeq. Waſſerſtoff, N 1 Aeq. Stickſtoff und O 1 Aeq. Sauerſtoff bedeutet.

Formel der Eſſigſäure	Formel des Aldehyds	Formel der Benzoeſäure	Formel des Bittermandelöls
$C_4H_6O_4$	$C_4H_6O_2$	$C_{14}H_{12}O_4$	$C_{14}H_{12}O_2$

Dieſe Formeln ſind genaue Ausdrücke der Analyſen, die, man kann es ſich ſo denken, ſich auf eine unveränderliche Kohlenſtoffquantität beziehen; ſie zeigen, daß Eſſigſäure und Aldehyd, Benzoeſäure und Bittermandelöl nur in dem Sauerſtoffgehalt von einander abweichen, daß ſie von den übrigen Elementen einerlei Verhältniſſe enthalten. Das Verſtändniß der folgenden Formeln iſt nicht minder einfach.

Cyamelid	1 At. Cyanurſäure	3 At. Cyanſäurehydrat
$C_6N_6H_6O_6$	$Cy_6 (= C_6N_6)\ O_3 + 3H_2O =$	$3(Cy_2O + H_2O) =$
	$=$ Summa $C_6N_6H_6O_6$	$=$ Summa $C_6N_6H_6O_6$

Die erſte Formel iſt eine ſogenannte empiriſche Formel, in der man wohl das relative Verhältniß der Elemente genau kennt, aber nicht die Ordnung, in welcher ſie zuſammengetreten ſind. Die zweite Formel drückt aus, daß 6 At. Cyan oder 6 At. Stickſtoff und 6 At. Kohlenſtoff zu einem zuſammengeſetzten Atom ſich vereinigt haben, das mit 3 At. Sauerſtoff und 3 At. Waſſer Cyanurſäurehydrat gebildet hat; die letzte drückt aus die Art und Weiſe der Ordnung der Atome in dem Cyanſäurehydrat, dreimal genom-

men; dieſelbe Anzahl von Elementen, wie in der Cyanurſäure iſt zu 3 Atomen Cyanſäurehydrat zuſammengetreten. Wie man verfährt, um die procentiſche Zuſammenſetzung eines Körpers in einer Formel auszudrücken, gehört nicht hierher; es ſoll nur erwähnt werden, wie man verfahren muß, um aus einer jeden Formel rückwärts die procentiſche Zuſammenſetzung zu finden. Für dieſen Zweck muß man beachten, daß der Buchſtabe C in einer chemiſchen Formel ein Gewicht von 76,437 Kohlenſtoff (nach den neueſten Beſtimmungen 75,8 oder 75, eine Abweichung, welche auf die angeführten Formeln, da ſie alle nach der Zahl 76,437 berechnet ſind, ohne den geringſten Einfluß iſt) bedeutet, der Buchſtabe H ein Gewicht von 6,239 Waſſerſtoff, der Buchſtabe N = 88,52 Stickſtoff, und zuletzt der Buchſtabe O, ein Gewicht von 100 Sauerſtoff.

Die Formel des Proteins $C_{48} N_{12} H_{72} O_{14}$ drückt alſo aus:

48	mal	76,437	=	3668,88	Kohlenſtoff
12	»	88,52	=	1062,24	Stickſtoff
72	»	6,239	=	449,26	Waſſerſtoff
14	»	100,00	=	1400,00	Sauerſtoff

in Summa das Gewicht von 6580,38 Protein.

						in 100 Theilen
In 6580,38	Theilen	Protein	ſind	enthalten	3668,88 Kohlenſtoff	55,742
In 6580,38	»	»	»	»	1062,24 Stickſtoff	16,143
In 6580,38	»	»	»	»	449,26 Waſſerſtoff	6,827
In 6580,38	»	»	»	»	1400,00 Sauerſtoff	21,288
						100,000

Note 1. Seite 13.

Sauerſtoffverbrauch des erwachſenen Mannes.

Ein erwachſener Mann

nach	verbraucht in 24 Stunden an Sauerſtoffgas		erzeugt in 24 Stunden an kohlenſaurem Gas		im kohlenſ. Gas enthaltener Kohlenſtoff	
	W. Zoll	Gran	W. Zoll	Gran	Gran	
Lavoiſier u. Seguin	46037	15661	14930	8584	2820	franz.
Menzies	51480	17625				engl.
Davy	45504	15751	31680	17811	4853	engl.
Allen u. Pepys. .	39600	13464	39600	18612	5148	engl.

(Aus L. Gmelins Handbuch der theor. Chemie.)

Note 2. Seite 14.

Zuſammenſetzung des Bluts: (Siehe Note 29.)

	in 100 Theilen		in 4,8 Pfd. = 36864 Gran
Kohlenſtoff	51,96	. . .	19154,5
Waſſerſtoff	7,25	. . .	2672,7
Stickſtoff	15,07	. . .	5555,4
Sauerſtoff	21,30	. . .	7852,0
Aſche . .	4,42	. . .	1629,4
	100,000		36864,0

Gran		Gran		
19154,5	Kohlenſtoff bildet mit	50539,5	Sauerſtoff	Kohlenſäure
2672,7	Waſſerſtoff » »	21415,8	»	Waſſer
	Summa =	71955,3	Sauerſtoff	
Hiervon ab vorhandener Sauerſtoff =		7852,0		
	bleiben	64103,3	Gran	

Sauerſtoff, welche zur vollſtändigen Verbrennung von 4,8 Pfd. Blut erforderlich ſind.

In obiger Rechnung ist angenommen worden, daß 24 Pfd. Blut 4,8 Pfd. trocknen Rückstand (80 pCt.) hinterlassen.

Note 3. Seite 14.

Bestimmung der Menge des ausgeathmeten Kohlenstoffs.

Faeces:

2,356 trockene Faeces hinterließen 0,320 Asche (13,58 pCt.).

0,352 Faeces gaben 0,576 Kohlensäure und 0,218 Wasser.

Linsen:

0,566 bei 100° getrocknete Linsen gaben 0,910 Kohlensäure und 0,336 Wasser.

Erbsen:

1,060 hinterließen 0,037 Asche

0,416 gaben 0,642 Kohlensäure und 0,241 Wasser.

Kartoffeln:

0,443 trockene Kartoffeln gaben 0,704 Kohlensäure und 0,248 Wasser.

Schwarzbrod:

0,302 trocknes Schwarzbrod gaben 0,496 Kohlensäure und 0,175 Wasser

0,241 » » » 0,393 » 0,142 »

Zusammensetzung (des Fleisches s. Note 29.)

	der Faeces	des Schwarzbrods		der Kartoffeln	
	Playfair*	Boeckmann*		Bousfingault	Boeckmann*
Kohlenstoff	45,24	45,09	45,41	44,1	43,944
Wasserstoff	6,88	6,54	6,45	5,8	6,222
Stickstoff, Sauerstoff	34,73	35,12	34,89	45,1	44,919
Asche . .	13,15	3,25	3,25	5,0	4,915
	100,00	100,00	100,00	100,0	100,000
Wasser . .	300,				
	400,00				

	Erbsen Playfair*	Linsen Playfair*	Bohnen Playfair*
Kohlenstoff	35,743	37,38	38,24
Wasserstoff	5,401	5,54	5,84
Stickstoff / Sauerstoff	39,366	37,98	38,10
Asche . .	3,490	3,20	3,71
Wasser . .	16,000	15,90	14,11
	100,000	100,000	100,000

	Frisches Fleisch		Kartoffeln		Schwarzbrod, einen Tag alt	
	Boeckmann*		Boussingault	Boeckmann*	Boeckmann*	
Wasser	75	74,8	72,2	73,2	33	31,418
Trockne Substanz	25	25,2	27,8	26,8	67	68,582
	100	100,0	100,0	100,0	100	100,000

Berechnung des von einem erwachsenen Menschen ausgeathmeten Kohlenstoffs.

Fleisch. Das fettlose Muskelfleisch, zu 74 Wasser und 26 pCt. fester Substanz angenommen, enthält in 100 Theilen 13,6 Kohlenstoff. Das gewöhnliche Fleisch enthält Muskelfleisch, Zellgewebe und Fett. Die beiden letzteren machen im Durchschnitt $\frac{1}{7}$ vom Gewicht des im Fleischladen erkauften Fleisches aus. Die Anzahl der verzehrten Lothe (64 Loth = 1 Kilogramm) beträgt 8896, welche bestehen aus:

7625 Loth fettloses Muskelfleisch enthalten Kohlenstoff 1037 Loth
1271 » Zellgewebe mit Fett » » 898 »

in Summe Kohlenstoff 1935 Loth

Mit den Knochen enthält das gekaufte Fleiſch 29 pCt. feſte Subſtanz, und 278 Pfd. Fleiſch 28 Pfd. trockne Knochen, ſie ſind nicht in Rechnung genommen, obwohl ſie beim Kochen 8—10 pCt. Leimſubſtanz verlieren, welche mit als Nahrung genoſſen wird.

Fett. Es ſind verzehrt worden 112 Loth Fett, welche zu 80 pCt. Kohlenſtoff in Summa 89,6 Loth Kohlenſtoff enthalten.

Kohlenſtoffgehalt der verzehrten Linſen, Bohnen und Erbſen.

Es ſind verzehrt worden 107 Loth Linſen, 436 Loth Bohnen und 371 Loth Erbſen, im Ganzen 914 Loth; bei einem Gehalte von 37 pCt. Kohlenſtoff ſind verzehrt worden 338,2 Loth Kohlenſtoff.

Kartoffeln. 100 Theile friſche Kartoffeln enthalten 12,2 Kohlenſtoff; in den verzehrten 31752 Loth ſind enthalten 3873,7 Kohlenſtoff.

Brod. 855 Mann eſſen täglich 855 × 64 Loth, dazu noch 36 Pfd. Suppenbrod macht zuſammen 55872 Loth. 100 Loth friſches Brod enthalten durchſchnittlich 30,15 Loth Kohlenſtoff, es ſind mithin im Brod verzehrt worden 17543 Loth Kohlenſtoff.

Im Ganzen ſind verzehrt worden:

im Fleiſch	1935	Loth	Kohlenſtoff
Fett	89,6	»	»
Bohnen, Erbſen, Linſen	338,2	»	»
Kartoffeln	3873,7	»	»
Brod	17543,0	»	»
von 855 Mann	23779,5	Loth	Kohlenſtoff
von 1 Mann	27,8	Loth	Kohlenſtoff

Die Faeces eines Soldaten wiegen 11 Loth (5½ Unze); ſie enthalten mit ihrem ganzen Waſſergehalt 11 pCt. Kohlenſtoff; für 86 Kreuzer Gemüſe, Weißkraut, Kohlrabi, Gelberüben ꝛc. erhält man durchſchnittlich 172 Pfd.; 25 Maas Sauerkraut wiegen 100 Pfd. Für 48½ Kreuzer Zwiebeln, Lauch, Sellerie erhält man auf dem Markte durchſchnittlich 24¼ Pfd. Dem Gewicht nach haben 855 Mann Soldaten verzehrt:

an grünem Gemüſe	5604	Loth
an Sauerkraut	3200	»
an Zwiebeln ꝛc.	776	»
	9580	Loth
ein Mann täglich	11,2	Loth

Der Kohlenſtoffgehalt des verzehrten Gemüſes iſt gleich dem Kohlenſtoffgehalt der Faeces angenommen. Wurſt, Branntwein, Bier, überhaupt was im Wirthshaus verzehrt worden, nicht gerechnet.

Die Zahlen, welche den vorhergehenden Berechnungen zu Grunde gelegt wurden, sind durchschnittlich dem Verbrauch von 855 Mann casernirter Soldaten entnommen, deren Speisen (Brod, Kartoffeln, Fleisch, Linsen, Erbsen, Bohnen ꝛc.) während eines Monats bis auf Pfeffer, Salz und Butter, mit der größten Genauigkeit gewogen und jedes einzelne der Elementaranalyse unterworfen worden war (siehe Tabelle). Eine Ausnahme hiervon machten drei Gardisten, welche außer dem vorschriftsmäßigen Brodquantum (2 Pfd. täglich) in jeder Löhnungsperiode ½ Laib = 2½ Pfd. mehr bekamen und ein Tambour, der ½ Laib übrig behielt. Nach einem annähernden Ueberschlage des Feldwebels verzehrt jeder Soldat täglich durchschnittlich 6 Loth Wurst, 1½ Loth Butter, ½ Schoppen (¼ Litr.) Bier und ¹⁄₁₀ Schoppen Branntwein, deren Kohlenstoffgehalt mehr als das Doppelte beträgt, von dem Kohlenstoffgehalt der Faeces und des Urins zusammengenommen. Die Faeces betragen bei einem Soldaten durchschnittlich 11 Loth, sie enthalten 75 pCt. Wasser und der trockne Rückstand 45,24 pCt. Kohlenstoff und 13,15 pCt. Asche. 100 Theile frische Faeces enthalten hiernach 11,31 Kohlenstoff, sehr nahe so viel als ein gleiches Gewicht frisches Fleisch. In obiger Rechnung ist der Kohlenstoff der Faeces und der des Urins gleichgesetzt worden dem Kohlenstoffgehalt der frischen Gemüse und der anderen Speisen, welche im Wirthshause verzehrt wurden.

Großhe

Uebersicht der im Monate November 1840

1840. November. In der Periode vom	Es haben gegessen Mann	Ochsenfleisch ℔	Schweinefleisch ℔	Kartoffeln Kümpfe	Erbsen Gescheid	Bohnen Gescheid
1 — 5	139	36	9	12	1½	1
6 — 10	145	37	9	13½	—	—
11 — 15	136	36	9	12½	—	1
16 — 20	136	37	9	14½	1	1
21 25	147	39	Bratwurst 7½	14	—	—
26 — 30	152	30	19½	14½	1	1
Summa . .	855	215	63	81	3½	4
Im Durchschnitt essen daher täglich 28½ Mann und es erhält ein Mann	monatlich	$7^{31}/_{57}$ ℔	$2^{12}/_{57}$ ℔	$2^{48}/_{57}$	$^{7}/_{57}$	$^{8}/_{57}$
	täglich	$8^{8}/_{171}$ Lth.	$2^{306}/_{855}$ Lth.	$^{81}/_{855}$	$^{87}/_{1710}$	$^{4}/_{855}$
		$10^{846}/_{855}$ Loth täglich				

1 Gescheid Bohnen wiegt 3 ℔ 15 Loth
1 » Linsen » 3 » 11 »
1 » Erbsen » 3 » 10 »
1 Kumpf Kartoffeln » 12 » 8 »

Compagnie.

ge obiger Compagnie verbrauchten Victualien.

	Gemüſe	Brod	Salz	Zwiebeln und Grünes	Pfeffer	Fett	Eſſig
	kr.	℔	℔	kr.	kr.	Loth.	Schoppen
	6	5	4½	8	2½	26⅔	—
	35	7½	5	6½	2½	21⅓	—
	21	7½	4½	7	2	16	—
	6	6	4½	8½	3½	26⅔	—
	18	7½	5½	11	2½	10⅔	1⅓
	—	2½	4	7½	2½	10⅔	—
	86	36	28	48½	15½	112	1½
	$3^{1}/_{57}$	$1^{15}/_{57}$	$^{56}/_{57}$	$1^{40}/_{57}$	$^{31}/_{57}$	$3^{159}/_{171}$	$^{3}/_{57}$
	$^{86}/_{855}$	$^{36}/_{855}$	$^{28}/_{855}$	$^{97}/_{1710}$	$^{31}/_{1710}$	$^{112}/_{855}$	$^{3}/_{1710}$

Note 4. Seite 15.

Nahrungsmittel eines Pferdes, in 24 Stunden verzehrt.

Nahrungsmittel.	Gewicht im feuchten Zuſtande.	Gewicht im trockenen Zuſtande.	Kohlenſtoff.	Waſſerſtoff.	Sauerſtoff.	Stickſtoff.	Salze und Erden.
Heu	7500	6465	2961,0	323,2	2502,0	97,0	581,8
Hafer	2270	1927	977,0	123,3	707,2	42,4	77,1
Waſſer	16000	—	—	—	—	—	13,3
Summa . .	25770	8392	3938,0	446,5	3209,2	139,4	672,2

Producte eines Pferdes in 24 Stunden *).

Producte.	Gewicht im feuchten Zuſtande.	Gewicht im trockenen Zuſtande.	Kohlenſtoff.	Waſſerſtoff.	Sauerſtoff.	Stickſtoff.	Salze und Erden.
Harn	1330	302	108,7	11,5	34,1	37,8	109,9
Excremente . . .	14250	3525	1364,4	179,8	1328,9	77,6	574,6
Summa . .	15580	3827	1472,9	191,3	1363,0	115,4	684,5
Totalgewichte des erſten Theils dieſer Tafel. . . .	25770	8392	3938,0	446,5	3209,2	139,4	672,2
Differenz	10190	4565	2465,1	255,2	1846,2	24,0	12,3
Richtung der Differenz	—	—	—	—	—	—	+

*) Ann. de Chim. et de phys. T. LXX. p. 136.

Nahrungsmittel einer Kuh,
in 24 Stunden verzehrt.

Nahrungsmittel.	Gewicht im feuchten Zustande.	Gewicht im trockenen Zustande.	Kohlenstoff.	Wasserstoff.	Sauerstoff.	Stickstoff.	Salze und erdige Materien.
Kartoffeln	15000	4170	1839,0	241,9	1830,6	50,0	208,5
Grummet	7500	6315	2974,4	353,6	2204,0	151,5	631,5
Wasser	60000	—	—	—	—	—	50,0
Summa . .	82500	10485	4813,4	595,5	4034,6	201,5	889,0

Producte einer Kuh
in 24 Stunden *).

Producte.	Gewicht im feuchten Zustande.	Gewicht im trockenen Zustande.	Kohlenstoff.	Wasserstoff.	Sauerstoff.	Stickstoff.	Salze und erdige Materien.
Excremente . . .	28413	4000,0	1712,0	208,0	1508,0	92,0	480,0
Harn	8200	960,8	261,4	25,0	253,7	36,5	384,2
Milch	8539	1150,6	628,2	99,0	321,0	46,0	56,4
Summa . .	45152	6111,4	2601,6	332,0	2082,7	174,5	920,6
Totalgewichte des ersten Theils dieser Tafel	82500	10485,0	4813,4	595,5	4034,6	201,5	889,0
Differenz	37348	4374,6	2211,8	263,5	1951,9	27,0	31,6
Richtung der Differenz	—	—	—	—	—	—	+

*) Ann de Chim. et de phys. T. LXX. p. 136.

Note 5. Seite 20.

Temperatur und Bewegung des Bluts.

Nach Prevoſt und Dumas

iſt bei der	die mittlere Temperatur	die Anzahl der Pulsſchläge in der Minute	die Anzahl der Athemzüge in der Minute
Taube	42° C	136	34
Huhn	41,5	140	30
Ente	42,5	170	21
Rabe	42,5	110	21
Lerche	44,0	200	22
Simia Callitriche	35,5	90	30
Meerſchwein	38,0	140	36
Hund	37,4	90	28
Katze	38,5	100	24
Ziege	39,2	84	24
Haſe	38,0	120	36
Pferd	36,8	56	16
Menſch	37,0	72	18
Menſch Mann (J. L.)	36,5 *	65	17
Menſch Weib (J. L.)	36,8 *	60	15

Temperatur des Kindes 39°.

Die Wärme des Menſchen beträgt in den inneren Theilen, welche zunächſt zugänglich ſind, wie Mund, Maſtdarm 29,20 — 29,60° R. = 36,50 — 37° C. Die Wärme des Blutes (Magendie) 30,5 — 31° R. = 38,1 — 38,7° C. Als mittlere Temperatur iſt p. 20. 37,5° C. angenommen.

Note 6. Seite 37.

Die Gefangenen in dem Arreſthaus in Gießen erhalten täglich 1½ Pfd. Brod (48 Loth), welche 14½ Loth Kohlenſtoff enthalten. Sie erhalten ferner 1 Pfd. Suppe und in je zwei Tagen 1 Pfd. Kartoffeln.

1½	Pfund	Brod	enthalten	14,5	Loth Kohlenſtoff
1	»	Suppe	»	1,5	» »
½	»	Kartoffeln	»	2,00	» »
				17,00	Loth Kohlenſtoff

Note 7. Seite 43.

Zuſammenſetzung des Blut-Fibrins und -Albumins †).

	Albumin aus Blutſerum			Fibrin		
	Scherer*			Scherer*		Mulder
	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Kohlenſtoff	53,850	55,461	55,097	53,671	54,454	54,56
Waſſerſtoff	6,983	7,201	6,880	6,878	7,069	6,90
Stickſtoff	15,673	15,673	15,681	15,763	15,762	15,72
Sauerſtoff, Schwefel, Phosphor	23,494	21,655	22,342	23,688	22,715	22,82

Die weiteren Analyſen des Thier-Albumins und Fibrins ſiehe in der Note 28 S. 319, ſo wie auch die Analyſen der Organe oder ihrer Theile.

†) Annal. der Chemie u. Pharm. Bd. XXVIII. S. 74 u. Bd. XL. S. 33 u. 36.

Note 8. Seite 49.

Zuſammenſetzung des Pflanzen-Fibrins, -Albumins, -Caſeins und -Leims.

Pflanzenfibrin

	Scherer †)*			Jones ††)*	Roher Kleber a. Weizenmehl Marcet †††)	Bouſſingault
	I.	II.	III.			
Kohlenſtoff . . .	53,064	54,603	54,617	53,83	55,7	53,5
Waſſerſtoff . . .	7,132	7,302	7,491	7,02	14,5	15,0
Stickſtoff	15,359	15,810	15,809	15,58	7,8	7,0
Sauerſtoff, Schwefel, Phosphor	24,445	22,285	22,083	23,56	22,0	24,5

†) Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 7.
††) Ebendaſelbſt. S. 65.
†††) L. Gmelin's th. Chem. Bd. II. S. 1092.

Pflanzenalbumin †)

	a. Roggen Jones*	a. Weizen	a. Pflanzenleim Varrentrapp u. Will*	a. Mandeln Jones*
Kohlenſtoff	54,74	55,01	54,85	57,03
Waſſerſtoff	7,77	7,23	6,96	7,53
Stickſtoff	15,85	15,92	15,88	13,45
Sauerſtoff, Schwefel, Phosphor	21,64	21,84	22,39	21,96

†) Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 66. u. Bd. XXXIX. S. 291.

	Bouſſingault.	Varrentrapp u. Will.*
Kohlenſtoff . . .	52,7	—
Waſſerſtoff . . .	6,9	—
Stickſtoff	18,4	15,70
Sauerſtoff . . .	22,0	—

Pflanzencaſein †)

	Scherer*	Jones*	ſchwefelſaures Caſeinkali Varrentrapp u. Will*	
Kohlenſtoff . . .	54,138	55,05	51,41	51,24
Waſſerſtoff . . .	7,156	7,59	7,83	6,77
Stickſtoff . . .	15,672	15,89	14,48	13,23
Sauerſtoff u. ſ. w.	23,034	21,47	—	—

†) Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. XXXIX. S. 291 und Bd. XL. S. 8 u. 67.

Pflanzenleim

	Jones †)*	Bouſſingault I.	Bouſſingault II.
Kohlenſtoff . . .	55,22	54,2	52,3
Waſſerſtoff . . .	7,42	7,5	6,5
Stickſtoff . . .	15,98	13,9	18,9
Sauerſtoff u. ſ. w.	21,38	24,4	22,3

†) Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 66.

Note 9. Seite 53.

Zusammensetzung des Thier-Caseins.

	Scherer †)				
	a. frisch. Milch	a. saur. Milch		a. Milch m. Essigs.	Zieger
	I.	II.	III.	IV.	V.
Kohlenstoff	54,825	54,721	54,665	54,580	54,507
Wasserstoff	7,153	7,239	7,465	7,352	6,913
Stickstoff	15,628	15,724	15,724	15,696	15,670
Sauerstoff } Schwefel }	22,394	22,316	22,146	22,372	22,910

†) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 40 u. f. f.

	Mulder ††)
Kohlenstoff	54,96
Wasserstoff	7,15
Stickstoff	15,80
Sauerstoff	21,73
Schwefel	0,36

††) Die Analyse des Pflanzencaseins siehe in der vorhergehenden Note.

Note 10. Seite 66.

Gehalt der festen Excremente an in Alkohol löslichen Bestandtheilen (Will*).

18,3 Grm. bei 100° getrocknete Pferdexcremente verloren durch Behandlung mit Alkohol 0,995 am Gewichte, der trockne Rückstand besaß die Beschaffenheit von ausgekochten Sägespänen.

14,98 Grm. trockner Kuhexcremente verloren durch die nämliche Behandlung 0,625 Grm.

Note 11. S. 72.

Zuſammenſetzung des Amylons †).

	berechnet $C_{12}H_{20}O_{10}$	Strecker: aus Erbſen	Linſen	Bohnen	Heidekorn
Kohlenſtoff	44,91	44,33	44,46	44,16	44,23
Waſſerſtoff	6,11	6,57	6,54	6,69	6,40
Sauerſtoff	48,98	49,09	49,00	49,15	49,37

	Strecker: aus Mais	Roßkaſtanien	Weizen	Roggen
Kohlenſtoff	44,27	44,44	44,26	44,16
Waſſerſtoff	6,67	6,47	6,70	6,64
Sauerſtoff	49,06	49,08	49,04	49,20

	Strecker: aus Reis	Dahlienwurzel	unreif. Aepfeln	unreif. Birnen
Kohlenſtoff	44,69	44,13	44,10	44,14
Waſſerſtoff	6,36	6,56	6,57	6,75
Sauerſtoff	48,95	49,31	49,33	49,11

	aus Kartoffeln: Berzelius	Gay Luſſac u. Thenard	a. Pfeilwurzeln: Prout	a. Yamswurzeln: Ortigoſa*
Kohlenſtoff	44,250	43,55	44,40	44,2
Waſſerſtoff	6,674	6,77	6,18	6,5
Sauerſtoff	49,076	49,68	49,42	49,3

†) Die in den Analyſen von Strecker und Ortigoſa verwendete Stärke wurde in dem Laboratorium zu Gießen aus den Samen, Knollen und Früchten dargeſtellt.

Note 12. Seite 72.

Zuſammenſetzung des Trauben- (Stärke-) zuckers.

	a. Trauben †)	a. Stärke ††)	a. Honig †††)	berechn.
	Sauſſure		Prout	$C_{12}H_{28}O_{14}$
Kohlenſtoff . . .	36,71	37,29	36,36	36,80
Waſſerſtoff . .	6,78	6,84	7,09	7,01
Sauerſtoff . .	56,51	55,87	56,55	56,19

†) Ann. de Chim. Bd. XI. S. 381.

††) Ann. of Philosoph. T. VI. p. 426.

†††) Philos. Transact. 1827 p. 373.

Note 13. Seite 73.

Zuſammenſetzung des Milchzuckers.

	Gay L. u. Then.	Prout	Brunn.	Berzelius	J. L.*	berechnet $C_{12}H_{24}O_{12}$
Kohlenſtoff	38,825	40,00	40,437	39,474	40,00	40,46
Waſſerſtoff	7,341	6,66	6,711	7,167	6,73	6,61
Sauerſtoff	53,834	53,34	52,852	53,359	53,27	52,93

Note 14. Seite 74.

Zuſammenſetzung des Gummis.

	Gay Luſſ. u. Then.	Goebel	Berzelius	berechnet $C_{12}H_{22}O_{11}$
Kohlenſtoff . . .	42,23	42,2	42,682	42,58
Waſſerſtoff . . .	6,93	6,6	6,374	6,37
Sauerſtoff . . .	50,84	15,2	50,944	51,05

Note 15. Seite 76.

Analyſe des Hafers nach Bouſſingault †).

100 Theile Hafer enthalten trockne Subſtanz 84,9
Waſſer 17,1
100,0

100 Theile trockner Hafer = 117,7 lufttrocknem enthalten:

Kohlenſtoff	50,7
Waſſerſtoff	6,4
Sauerſtoff	36,7
Stickſtoff	2,2
Aſche	4,0
	100,0
	17,7 Waſſer

lufttrockner Hafer 117,7 in 100 Theilen 1,867 Stickſtoff.

†) Ann. de Chim. et de Phys. T. LXXI. p. 130.

Analyſe des Heu's †).

100 Theile Heu enthalten lufttrocken 86 trockne Subſtanz
14 Waſſer
100

100 Th. bei 100° getrocknetes Heu = 116,2 lufttrocknes Heu enthalten:

Kohlenſtoff	45,8
Waſſerſtoff	5,0
Sauerſtoff	38,7
Stickſtoff	1,5
Aſche	9,0
	100,0
Hierzu	16,2 Waſſer
	116,2 lufttrocknes Heu.

100,0 lufttrocknes Heu enthalten 1,29 Stickſtoff

480 Loth Heu lufttrocken = 15 Pfund enthalten 6,19 Loth Stickſtoff

144 » Hafer » = 4½ » » 2,68 » »

Zuſammen . . 8,87 Loth Stickſtoff.

†) Ann. de Chim. et de Phys. T. LXXI. p. 129.

Note 16. Seite 78.

Kohlenſtoffgehalt des Fleiſches und Amylons.

100 Loth Amylon enthalten 44 Loth Kohlenſtoff, 128 Loth (4 Pfund) enthalten 56,32 Loth Kohlenſtoff.

100 Loth friſches Fleiſch enthalten 13,6 Loth Kohlenſtoff (ſiehe Note 3)

480 » » » (15 Pfund) mithin 55,28 Loth.

Note 17. Seite 85.

Zuſammenſetzung des

	Schweineſchmalzes	Hammelstalges	Menſchenfettes †)
		Chevreul	
Kohlenſtoff	79,098	78,996	79,000
Waſſerſtoff	11,146	11,700	11,416
Sauerſtoff	9,756	9,304	9,584

†) Recherch. chim. sur les corps gras. Paris 1823.

Note 18. Seite 85.

Zuſammenſetzung des Rohrzuckers nach den Analyſen

	Berzelius	Prout	W. Crum	von Liebig	Gay-L. u. Then.	berechnet $C_{12}H_{22}O_{11}$
Kohlenſtoff	42,225	42,86	42,14	42,301	42,47	42,58
Waſſerſtoff	6,600	6,35	6,42	6,384	6,90	6,37
Sauerſtoff	51,175	50,79	51,44	51,315	50,63	51,05

Die Zuſammenſetzung des Gummis und der Stärke ſiehe Note 14 u. 11.

Note 19. Seite 86.

Zuſammenſetzung des Cholſterins.

	Chevreul †)	Couerbe ††)	Marchand	berechnet $C_{36}H_{44}O$
Kohlenſtoff . .	85,095	84,895	84,90	84,641
Waſſerſtoff . .	11,880	12,099	12,00	12,282
Sauerſtoff . .	3,025	3,006	3,10	3,077

†) Recherch. sur les corps gras. p. 185.

††) Ann. de Chim. et de Phys. T. LVI. p. 164.

Note 20. Seite 88.

Die Entſtehung des Wachſes aus Zucker †).

Sobald die Bienen ihren Magen oder die ſogenannte Honigblaſe mit Honig angefüllt haben, und dieſen nicht ablegen können, geht derſelbe in Menge nach und nach in den Darmkanal, wird hier verdauet, der größte Theil davon als Excremente ausgeſchieden und der andere in die Säfte der Bienen übergeführt. Durch dieſen großen Zufluß von Säften bildet ſich ein Fett, welches auf den vorn erwähnten acht Fleckchen, die ſich an den untern 4 Schuppen der Bauchringel befinden, als eine flüſſige Maſſe hervorquillt und bald als Wachsblättchen erhärtet; während, wenn die

†) Aus Ferdinand Wilhelm Gundlach's Naturgeſchichte der Bienen, S. 15. ff. Caſſel 1842 bei Bohne. — Wir kennen keinen ſchöneren und überzeugenderen Beweis der Fettbildung aus Zucker, als den folgenden, aus der Beobachtung entnommenen, Proceß der Wachsbildung bei den Bienen.

Biene den Honig ablegen kann, nur ſo viel in den Darmkanal übergeht, als zur Ernährung derſelben nöthig iſt. Die Honigblaſe der Bienen braucht kaum 40 Stunden mit Honig angefüllt zu ſein, um auf den 8 Fleckchen, 8 Wachsblättchen vollkommen zur Reife zu bringen, ſo daß dieſe abfallen. Ich machte den Verſuch und gab Bienen, die ich am Ende des Monats September mit ihrer Königin in ein Käſtchen ſetzte, ſtatt Honig aufgelöſ'ten Candiszucker. Es bildeten ſich auch davon Wachsblättchen; aber ſie wollten nicht recht abſpringen, ſondern die weiter ausquellende Maſſe blieb an den oberen Wachsblättchen bei den meiſten Bienen hängen, ſo daß die Blättchen ſo dick wurden, als es ſonſt viere zuſammen ſind. Die Schuppen der Bienen wurden dadurch ganz in die Höhe gehoben, und die Blättchen ragten hervor. Beim Nachſehen fand ich, daß dieſe dicken Blättchen, welche unter der Lupe mehrere Lamellen zeigten, nach dem Kopfe der Biene hin von oben nach unten, und nach der Schwanzſpitze hin von unten nach oben eine ſchiefe Fläche hatten. Es war alſo das ſich zuerſt gebildete Blättchen durch das nächſtfolgende, und weil da, wo die Schuppen an der Fugenhaut feſtſitzen, kein Raum für 2 Blättchen vorhanden iſt, etwas abgeſchoben worden, und ſo war es denn auch mit dem dritten Blättchen gegangen, wodurch die ſchiefen Flächen an den Seiten der Blättchen nach vorn und hinten entſtanden waren. Ich habe hieraus recht deutlich erſehen, daß die Wachsblättchen durch die nächſtfolgend ſich bildenden Blättchen abgeſchoben werden. Der Zuckerſaft war von den Bie-

nen auch in Wachs zerſetzt worden; allein es ſcheint doch, daß die Bildung irgend eine Unvollkommenheit erlitten hatte, indem die reifen Wachsblättchen ſich nicht ablöſ'ten, ſondern an den nächſtfolgenden hängen blieben. Zum Wachsausſchwitzen bedürfen die Bienen keines Blumenſtaubes, ſondern nur Honig. Ich habe ſchon im October Bienen in ein leeres Käſtchen gebracht und ihnen Honig untergeſetzt, und ſie bauten bald Waben, obſchon das Wetter ſo war, daß ſie gar nicht fliegen konnten. Ich kann deßhalb gar nicht glauben, daß der Blumenſtaub eine Nahrung für die Bienen abgebe, ſondern ich glaube, daß ſie ihn nur verſchlucken, um mit Honig und Waſſer vermiſcht, den Nahrungsſaft für die Maden daraus zu bereiten. Die Bienen verhungern auch oft noch im April, wenn ihr Honigvorrath aufgezehrt iſt, und ſie Blumenſtaub in Menge, aber keinen Honig eintragen können. Sie reißen in der Noth die Nymphen aus den Zellen und zernagen dieſe, um durch den ſüßen Saft, den ſie in dieſen finden, ſich das Leben zu friſten. Werden ſie aber in dieſer Lage nicht gefüttert, oder tritt nicht alsbald Nahrung auf dem Felde ein, ſo ſterben ſie in wenigen Tagen. Wäre nun aber der Blumenſtaub eine wirkliche Nahrung für die Bienen, ſo müßten ſie doch wohl von dieſem, mit Waſſer vermiſcht, ſich ihr Leben friſten können.

Die Bienen bauen nie Waben, wenn ſie nicht eine Königin haben, oder nicht mit Brut verſehen ſind, aus welcher ſie ſich eine Königin erziehen können. Sperrt man aber Bienen ohne Königin in ein Käſtchen und füttert ſie mit

Honig, ſo ſieht man, daß ſie nach 48 Stunden Wachsblättchen auf den Schuppen haben, und daß deren auch ſchon einige abgefallen ſind. Das Wabenbauen iſt alſo etwas Willkürliches und an gewiſſe Bedingungen geknüpft; das Wachsausſchwitzen aber etwas Unwillkürliches.

Man ſollte glauben, daß eine große Menge dieſer Wachsblättchen verloren gingen, da ſie ja den Bienen eben ſo gut außer dem Stocke als in demſelben abfallen könnten; allein der Schöpfer hat weiſe dafür geſorgt, daß ſolche nicht verloren gehen. Stellt man den Bienen, welche im Bauen begriffen ſind, Honig in einem flachen Gefäße unter und bedeckt dieſen, damit die Bienen nicht in den Honig einſinken, mit einem durchlöcherten Papier, ſo ſieht man am andern Morgen, daß der Honig aufgetragen iſt, und daß auf dem Papier eine große Menge Wachsblättchen liegen. Man ſollte wohl glauben, daß die Bienen, welche den Honig aufgetragen haben, dieſe Blättchen hätten fallen laſſen; allein es iſt nicht ſo. Legt man über das Honiggefäß zwei dünne Stäbchen und auf dieſe ein Brett, welches das Gefäß von allen Seiten überragt, ſo alſo, daß die Bienen unter dem Brette durchkriechen und den Honig holen können, aber nichts von oben aus dem Stocke auf den Honig fallen kann, ſo findet man am andern Morgen den Honig aufgetragen, aber keine Wachsblättchen auf dem Papier liegen; wohl aber liegen deren auf dem das Gefäß überragenden Brettchen. Die Bienen, welche den Honig holen, laſſen alſo keine Blättchen fallen, ſondern es thun dieſes nur die Bienen, welche oben

im Stocke hängen. Wiederholte Verſuche dieſer Art haben mich überzeugt, daß die Bienen, ſobald ihre Wachsblättchen zum Abfallen reif ſind, ſich in den Stock zurückziehen und der Ruhe pflegen, eben ſo wie die Raupen es thun, wenn ſie ſich häuten wollen. Bei einem Schwarme, der ſtark baut, ſieht man Tauſende von Bienen, welche ganz unthätig oben im Stocke hängen; es ſind dies lauter Bienen, deren Wachsblättchen zum Abfallen reif ſind; haben ſie ſich abgelöſet, ſo erwacht wieder die Thätigkeit der Biene, und ihre Stelle wird nun von einer andern zu gleichem Zwecke eingenommen.

Seite 28. derſelben Schrift. Um zu ermitteln, wie viel Honig die Bienen zur Erzeugung des Wachſes nöthig haben, und wie oft, bei einem im Bauen begriffenen Schwarme, die Wachsblättchen ihre Reife erhalten und abfallen, machte ich folgenden, wie ich glaube, nicht unintereſſanten Verſuch.

Am 29ſten Auguſt d. J., zu einer Zeit, wo hier kein Honig mehr für die Bienen auf dem Felde zu finden war, trieb ich einen kleinen Bienenſtock ab, that die Bienen in einen kleinen, aus Holz angefertigten, Bienenkaſten, ſuchte aber vorher die Königin aus und ſperrte dieſe in eine mit Drahtgitter verſehene Büchſe, welche ich in das Stopfenloch des Bienenkaſtens einfügte, damit keine Brut in die Zellen kommen konnte, und ſtellte ſodann, um die Bienen genau beobachten zu können, dieſes Stöckchen in ein Fenſter auf meinen Boden. Des Nachmittags um 6 Uhr gab ich den Bienen 12 Loth aus zugeſpundeten Zellen ausgelaufenen Honig, der alſo ganz die Conſiſtenz des fertigen Honigs hatte. Die-

ſer war am andern Morgen von den Bienen aufgeleckt. Am 30ſten Auguſt des Abends gab ich den Bienen wieder 12 Loth, der am andern Morgen ebenfalls aufgeleckt war; es lagen aber auch ſchon einige Wachsblättchen auf dem durchlöcherten Papiere, womit ich den Honig bedeckt hatte. Am 31ſten Auguſt und 1ſten September erhielten die Bienen des Abends 20 Loth und am 3ten September des Abends 14 Loth; in Summa alſo 1 Pfund 26 Loth Honig, der aus Zellen, welche die Bienen ſchon zugeſpundet hatten, kalt ausgelaufen war. Am 5ten September betäubte ich die Bienen, indem ich ſie durch Boviſt herabfallen ließ. Ich zählte ſolche, und fand 2765 Bienen; ſie wogen 20 Loth. Nun wog ich das Käſtchen, deſſen darin befindliche Waben ſehr mit Honig angefüllt, jedoch die Zellen noch nicht bedeckelt waren, bemerkte mir das Gewicht und ließ nun von einem ſtarken Stocke den Honig auftragen, was in ein Paar Stunden geſchehen war. Ich wog jetzt das Käſtchen wieder und fand, daß es 24 Loth leichter geworden war; folglich hatten die Bienen 24 Loth Honig von dem ihnen gegebenen 1 Pfund 26 Loth noch im Stocke gehabt. Nun brach ich die kleinen Waben aus und fand, daß ſie 1¼ Loth wogen. Ich ließ die Bienen in einem andern Käſtchen erwachen, welches mit leeren Waben verſehen war, und fütterte ſie mit ganz ähnlichem Honig. In den erſten paar Tagen verloren ſie täglich über 2 Loth an Gewicht, nachher aber jeden Tag 1 Loth, was daher kam, daß der Darmkanal der Bienen in Folge der Verdauung des vielen Honigs voll von Excrementen

war, denn 1170 Bienen wiegen im Herbste, wenn sie noch nicht lange eingesessen haben, 8 Loth; mithin müßten 2765 Bienen etwa 18 Loth wiegen. Sie wogen aber 20 Loth und hatten deßhalb 2 Loth Excremente bei sich, denn ihre Honigblasen waren leer. Des Nachts verminderte sich das Gewicht des Stöckchens gar nicht, weil der wenige Honig, den die Bienen im Stöckchen hatten, und weil derselbe schon die nöthige Consistenz erlangt hatte, keinen merkbaren Verlust des Gewichts durch das Verdunsten erlitt und die Bienen keine Excremente von sich geben konnten; daher geschah die Verminderung des Gewichts nur jedesmal von des Morgens bis zum Abend. Hatten nun die Bienen in den 7 Tagen 7 Loth Honig zur Ernährung ihres Körpers bedurft, so hatten sie zur Bildung von 1¼ Loth Wachs 27 Loth Honig verbraucht, und mithin sind zur Bildung eines Pfundes Wachses an 20 Pfund Honig nöthig. Daher kommt es auch, daß die stärksten Schwärme bei der ergiebigsten Honigerndte, wo andere Stöcke, die nicht zu bauen brauchen, oft in einem Tage 3—4 Pfunde zunehmen, fast gar nicht schwerer werden, obschon ihre Thätigkeit ohne Grenzen ist; es wird alles Gewonnene zu Wachs verwendet. Es ist dieses ein Wink für die Bienenhalter, den Wachsbau einzuschränken. Cnauf empfahl dieses schon, obgleich ihm das eigentliche Verhältniß unbekannt war. Von einem Loth Wachs können die Bienen so viel Zellen bauen, daß sie darin 1 Pfund Honig aufbewahren können.

100 Wachsblättchen wiegen 0,024 Gramm, folglich ge-

hen auf ein Kilogramm 4,166,666 Wachsblättchen, 50 Kilogramm ſind gleich 106 Pfund Cöllniſch Gewicht, 1 Pfund gleich 32 Loth. Es gehen daher auf 1¼ Loth 81,367 Wachsblättchen. Dieſe waren von 2765 Bienen in 6 Tagen ausgeſchwitzt worden; es kommen daher auf jede Biene in 24 Stunden 5 Blättchen, und mithin bedarf die Biene zur Bildung ihrer 8 Blättchen etwa 38 Stunden; was auch mit meinen Beobachtungen ſehr genau übereinſtimmt. Die ausgeſchwitzten Wachsblättchen ſind vollkommen ſo weiß, als gut gebleichtes Wachs. Auch die Waben ſind anfänglich ganz weiß, ſie werden aber durch den Honig und beſonders durch den Blumenſtaub gelb gefärbt. Sowie es anfängt kalt zu werden, ziehen ſich die Bienen in dem Stocke unter dem Honig zuſammen und zehren nun von ihrem Vorrathe.

S. 54. Viele glauben, die Bienen hätten einen Winterſchlaf; allein dieſes iſt ganz falſch. Die Bienen ſind den ganzen Winter über munter; es bleibt immer warm in ihrem Stocke, durch die Wärme, welche ſie ſelbſt entwickeln. Je mehr Bienen in einem Stocke ſind, deſto mehr Wärme wird entwickelt, und deßhalb können ſtarke Stöcke der heftigſten Kälte trotzen. Ich hatte den Fall, daß ich vergeſſen hatte, einem Stocke, welchem ich im Juli zur Verminderung der Hitze ein durchlöchertes Blech auf das ſehr weite Stopfenloch geheftet hatte, dieſes im Herbſte abzunehmen; und obſchon der Winter ungemein heftig war, und die Kälte mehrere Tage über — 18° betrug, kam dieſer Stock doch ſehr gut durch den Winter; ich hatte aber im Herbſte zu dieſem Stocke das Volk von

2 anderen Stöcken gethan! Wird die Kälte ſehr heftig, ſo fangen die Bienen an zu brauſen; dadurch wird der Reſpirationsproceß erhöht, und die Wärmeentwicklung vermehrt. Sperrt man im Sommer Bienen ohne Königin in einen Glaskaſten, ſo werden dieſe unruhig und fangen an zu brauſen; dadurch entwickelt ſich eine ſolche Hitze, daß die Glasſcheiben ganz heiß werden. Oeffnet man in dieſem Falle nicht das Flugloch, oder ſucht den Bienen mehr Luft zu verſchaffen, und durch Waſſer die Glasſcheiben abzukühlen, ſo erſticken die Bienen bald.

Zuſammenſetzung des Bienenwachſes.

	Gay-L. u. Then. 1)	Sauſſure 2)	Opperm. 3)*	Ettl. 4)*	Heß 5)	berechnet $C_{20}H_{40}O$
Kohlenſtoff	81,784	81,607	81,291	81,15	81,52	81,38
Waſſerſtoff	12,672	13,859	14,073	13,75	13,23	13,28
Sauerſtoff	5,544	4,534	4,636	5,09	5,25	5,34

1) Traité de Chim. par Thénard, 6me ed. IV. p. 477.
2) Ann. de Chim. et de Phys. T. XIII. p. 310.
3) Ibid. T. XLIX. p. 224.
4) Annal. der Pharm. Bd. II. S. 267.
5) Ibid. Bd. XXVII. S. 6.

Note 21. S. 106.

Zuſammenſetzung der Cyanurſäure, des Cyamelids und des Cyanſäurehydrats, nach den Analyſen von

Wöhler und Liebig †)*

	Cyanurſäure, Cyamelid, Cyanſäurehydrat
Kohlenſtoff	28,19
Waſſerſtoff	2,30
Stickſtoff	32,63
Sauerſtoff	36,87

†) Poggend. Annal. Bd. XX. S. 375 u. f. f.

Note 22. Seite 106.

Zuſammenſetzung des Aldehyds, Metaldehyds, Elaldehyds †).

	Aldehyd	Metaldehyd	Elaldehyd		berechnet
	Liebig*	Fehling*			$C_4H_8O_2$
Kohlenſtoff	55,024	54,511	54,620	54,467	55,024
Waſſerſtoff	8,983	9,054	9,248	9,075	8,983
Sauerſtoff	35,993	36,435	36,132	36,458	35,993

†) Ann. der Pharm. Bd XIV. S. 142 u. Bd. XXVII. S. 319.

Note 23. Seite 107.

Zuſammenſetzung des Proteins

	aus Kryſtallinſe	aus Albumin	aus Fibrin
	Scherer †)*		
	I.	II.	III.
Kohlenſtoff . . .	55,300	55,160	54,848
Waſſerſtoff . . .	6,940	7,055	6,959
Stickſtoff . . .	16,216	15,966	15,847
Sauerſtoff . . .	21,544	21,819	22,346

	Scherer*				
	aus Haaren		aus Horn		berechnet $C_{48}H_{72}N_{12}O_{14}$
Kohlenſtoff	54,746	55,150	55,408	54,291	55,742
Waſſerſtoff	7,129	7,197	7,238	7,082	6,827
Stickſtoff	15,727	15,727	15,593	15,593	16,143
Sauerſtoff	22,398	21,926	21,761	23,034	21,288

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 43.

	aus Pflanzeneiweiß	aus Fibrin	aus Albumin	aus Käſe
		Mulder†)		
Kohlenſtoff	54,99	55,44	55,30	55,159
Waſſerſtoff	6,87	6,95	6,94	7,176
Stickſtoff	15,66	16,05	16,02	15,857
Sauerſtoff	22,48	21,56	21,74	21,808

†) Annal. der Pharm Bd. XXVIII. S. 75.

Note 24. Seite 109.

Zuſammenſetzung des Albumins aus dem Dotter und Weißen des Ei's †).

	aus Eigelb		aus Eiweiß
	Jones*		Scherer*
	I.	II.	
Kohlenſtoff . . .	53,72	53,45	55,000
Waſſerſtoff . . .	7,55	7,66	7,073
Stickſtoff . . .	13,60	13,34	15,920
Sauerſtoff, Schwefel, Phosphor . . .	25,13	25,55	22,007

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 36 u. 67.

Note 25. S. 113

Zuſammenſetzung der Milchſäure.

	$C_6H_{10}O_5$
Kohlenſtoff	44,90
Waſſerſtoff	6,11
Sauerſtoff	48,99

Note 26. Seite 117.

Gas aus dem Unterleib von Kühen, nach dem Genuß von zu vielem Klee durch Punctur erhalten:

a) unterſucht von Lameyran u. Fremy b) von Vogel c) von Pflüger.

	Luft	kohlenſaures Gas	brennbares Gas	Schwefelwaſſerſtoffgas (?)
a)	5	5 —	15	80 Vol.
b)	25	— 27	48	—
c)	—	— 60	40	—
c)	—	— 20	80	—

Note 27. Seite 120.

Magendie fand in dem Magen und den Eingeweiden Hingerichteter:

bei einem Individuum a) welches eine Stunde, b) bei einem zweiten Individuum, welches 2 Stunden und c) bei einem dritten Individuum, welches 4 Stunden vor der Hinrichtung eine leichte Mahlzeit zu ſich genommen hatte,

in 100 Volum-Theilen befanden ſich:

		Sauerſtoffgas		Stickgas	kohlenſ. Gas	brennb. Gas
a	im Magen .	11,00 Vol.	auf	71,45	14,00	3,55
a	im Dünndarm	00,00 »	»	20,03	24,39	55,53
a	im dicken Darm	00,00 »	»	51,03	43,50	5,47
b	im Magen .	00,00 »	»	00,00	00,00	00,00
b	im Dünndarm	00,00 »	»	8,85	40,00	51,15
b	im Dickdarm .	00,00 »	»	18,4	70,00	11,6

		Sauerstoffgas		Stickgas	kohlens. Gas	brennb. Gas
c	im Magen .	00,00 Vol.	auf	00,00	00,00	00,00
	im Dünndarm	00,00 »	»	66,6	25,0	8,4
	im Mastdarm	00,00 »	»	45,96	42,86	11,18

Note 28. S. 127.

Zusammensetzung des Thieralbumins.

	aus Blutserum (Scherer†)*			aus Eiern	aus Eigelb (Jones††)*	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Kohlenstoff	53,850	55,461	55,097	55,000	53,72	53,45
Wasserstoff	6,983	7,201	6,880	7,073	7,55	7,66
Stickstoff	15,673	15,673	15,681	15,920	13,60	13,34
Sauerstoff, Schwefel, Phosphor	23,494	21,655	22,342	22,007	25,13	25,55

In den Analysen V. u. VI. ist das Verhältniß des Stickstoffs zum Kohlenstoff gleich 1 : 8.

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 36.
††) Ebendas. S. 67.

	Jones*	Scherer* Albumin aus				
	Gehirnalbumin	Hydrocele	Congestionsabsceß	Eiter		hydropisch. Flüss.
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kohlenstoff	55,50	54,921	54,757	54,663	54,101	54,302
Wasserstoff	7,19	7,077	7,171	7,022	6,947	7,176
Stickstoff	16,31	15,465	15,848	15,839	15,660	15,717
Sauerstoff, Schwefel, Phosphor	21,00	22,537	22,224	22,476	23,292	22,805

	Mulder †)
Kohlenſtoff	54,84
Waſſerſtoff	7,09
Stickſtoff	15,83
Sauerſtoff	21,23
Schwefel	0,68
Phosphor	0,33

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVIII. S. 74.

Zuſammenſetzung des Thierfibrins.

	Scherer †)						
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Kohlenſtoff	53,671	54,454	55,002	54,967	53,471	54,686	54,844
Waſſerſtoff	6,878	7,069	7,216	6,867	6,895	6,835	7,219
Stickſtoff	15,763	15,762	15,817	15,913	15,720	15,720	16,065
Sauerſtoff, Schwefel, Phosphor	23,688	22,715	21,965	22,244	23,814	22,759	21,872

†) Annal. der Chemie u. Pharm. Bd. XL. S. 33.

	Mulder †)
Kohlenſtoff	54,56
Waſſerſtoff	6,90
Stickſtoff	15,72
Sauerſtoff	22,13
Schwefel	0,33
Phosphor	0,36

†) Annal. der Pharm. Bd. XXIII. S. 74.

Ueber die Zuſammenſetzung des Thier-Caſeins vergl. Note 9.

Zuſammenſetzung der leimgebenden Gewebe.

	Scherer †) *					berechnet
	Hauſenblaſe	Kalbsfußſehnen			Sclerotica	$C_{48}H_{82}N_{15}O_{18}$
Kohlenſtoff	50,557	49,563	50,960	50,774	50,995	50,207
Waſſerſtoff	6,903	7,148	7,188	7,152	7,075	7,001
Stickſtoff	18,790	18,470	18,320	18,320	18,723	18,170
Sauerſtoff	23,750	24,819	23,532	23,754	23,207	24,622

†) Annal der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 46.

	Mulder	
Kohlenſtoff	50,048	50,048
Waſſerſtoff	6,477	6,643
Stickſtoff	18,350	18,388
Sauerſtoff	25,125	24,921

Zuſammenſetzung der Chondrin-gebenden Gewebe.

	Kalbsrippenknorpel		Cornea	berechnet	
	Scherer †) *			$C_{48}H_{80}N_{12}O_{20}$	Mulder
Kohlenſtoff	49,496	50,895	49,522	50,745	50,607
Waſſerſtoff	7,133	6,962	7,097	6,904	6,578
Stickſtoff	14,908	14,908	14,399	14,692	14,437
Sauerſtoff	28,463	27,235	28,982	27,659	28,378

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 49.

Zusammensetzung der mittleren Arterienhaut.

	Scherer †)		berechnet
	I.	II.	$C_{48}H_{76}N_{12}O_{16}$
Kohlenstoff	53,750	53,393	53,91
Wasserstoff	7,079	6,973	6,96
Stickstoff	15,360	15,360	15,60
Sauerstoff	23,811	24,274	23,53

†) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 51.

Zusammensetzung der Horngebilde.

	Scherer †)						
	Oberhaut d. Fußsohle		Bart-haare	Kopf-haare	blonde	braune	schwarze
Kohlenstoff	51,036	50,752	51,529	50,652	49,345	50,622	49,935
Wasserstoff	6,801	6,761	6,687	6,769	6,576	6,613	6,631
Stickstoff	17,225	17,225	17,936	17,936	17,936	17,936	17,936
Sauerstoff, Schwefel	24,938	25,262	23,848	24,643	26,143	24,829	25,498

	Büffelhorn				Nägel	Wolle	berechnet
							$C_{48}H_{78}N_{14}O_{17}$
Kohlenstoff	51,990	51,162	51,620	51,540	51,089	50,653	51,718
Wasserstoff	6,717	6,597	6,754	6,779	6,824	7,029	6,860
Stickstoff	17,284	17,284	17,284	17,284	16,901	17,710	17,469
Sauerstoff, Schwefel	24,009	24,957	24,342	24,397	25,186	24,608	23,953

†) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 53.

Hiermit ſtimmt nahe die Zuſammenſetzung der die innere Schale des Hühnerei's auskleidenden Haut;

ſie enthält nach Scherer †)*

Kohlenſtoff	50,674
Waſſerſtoff	6,608
Stickſtoff	16,761
Sauerſtoff } Schwefel }	25,957

†) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 60.

Zuſammenſetzung der Federn.

	Scherer †)*		berechnet
	Federfahne	Federſpule	$C_{48}H_{76}N_{14}O_{16}$
Kohlenſtoff	50,434	52,427	52,457
Waſſerſtoff	7,110	7,213	6,958
Stickſtoff	17,682	17,893	17,719
Sauerſtoff	24,774	22,467	22,866

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 61.

Zuſammenſetzung des Augenſchwarzes.

	Scherer †)*		
	I.	II.	III.
Kohlenſtoff	58,273	58,672	57,908
Waſſerſtoff	5,973	5,962	5,817
Stickſtoff	13,768	13,768	13,768
Sauerſtoff	21,986	21,598	22,507

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 63.

Note 29. S. 135.

Nach den Analyſen von Playfair und Boeckmann* gaben

0,452 trocknes Muskelfleiſch 0,836 Kohlenſäure
0,407 » » 0,279 Waſſer
0,242 » » 0,450 Kohlenſäure u. 0,164 Waſſer
0,191 » » 0,360 » 0,130 »

Blut

0,305 Subſtanz gaben 0,575 Kohlenſäure u. 0,202 Waſſer
0,214 » » 0,402 » 0,138 »
1,471 Blut hinterließen 0,065 Aſche.

	Ochſenfleiſch		Ochſenblut		Mittel
	Playfair*	Boeckmann*	Playfair*	Boeckmann*	
Kohlenſtoff . .	51,83	51,89	51,95	51,96	51,96
Waſſerſtoff . .	7,57	7,59	7,17	7,33	7,25
Stickſtoff . . .	15,01	15,05	15,07	15,08	15,07
Sauerſtoff . .	21,37	21,24	21,39	21,21	21,30
Aſche	4,23	4,23	4,42	4,42	4,42

Zieht man den Aſchengehalt ab, ſo iſt die Zuſammenſetzung des organiſchen Theils des

	Ochſenfleiſchs		Ochſenbluts	
	Playfair*	Boeckmann*	Playfair*	Boeckmann*
Kohlenſtoff . .	54,12	54,18	54,19	54,20
Waſſerſtoff . .	7,89	7,93	7,48	7,65
Stickſtoff . . .	15,67	15,71	15,72	15,73
Sauerſtoff . .	22,32	22,18	22,31	22,12

Dieſer Zuſammenſetzung entſpricht die Formel:

C_{48}	54,62
H_{78}	7,24
N_{12}	15,81
O_{15}	22,33

Note 30. S. 137.

Zuſammenſetzung der Choleinſäure †).

	Demarçay *	Dumas	berechnet $C_{76}H_{182}N_4O_{22}$
Kohlenſtoff	63,707	63,5	63,24
Waſſerſtoff	8,821	9,3	8,97
Stickſtoff	3,255	3,3	3,86
Sauerſtoff	24,217	23,9	23,95

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVII. S. 284 u. 293.

Note 31. S. 137.

Zuſammenſetzung des Taurins und der Choloidinſäure.

Taurin †).

	Demarçay *	Dumas	berechnet $C_4H_{14}N_2O_{10}$
Kohlenſtoff	19,24	19,26	19,48
Waſſerſtoff	5,78	5,66	5,57
Stickſtoff	11,29	11,19	11,27
Sauerſtoff	63,69	63,89	63,68

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVII. S. 287 u. 292.

Choloidinſäure †).

	Demarçay		Dumas	berechnet $C_{72}H_{112}O_{12}$
Kohlenſtoff	73,301	73,522	73,3	74,4
Waſſerſtoff	9,511	9,577	9,7	9,4
Sauerſtoff	17,188	16,901	17,0	16,2

†) Ebendaſ. S. 289 u. S. 293.

Ich habe zu den Unterſuchungen von Demarçay Folgendes zu bemerken:

Der Stoff, den ich als Choleinſäure bezeichnet habe, iſt die Galle ſelbſt, getrennt von den anorganiſchen Beſtandtheilen (Salze u. ſ. w.), die ſie enthält; durch Bleieſſig, bei Gegenwart von Ammoniak, treten alle ihre organiſchen Beſtandtheile an Bleioxyd, indem ſie ſich damit zu einem unlöslichen, harzartigen Niederſchlage verbinden; der mit dem Bleioxyd verbundene Körper enthält allen Kohlenſtoff und Stickſtoff der Galle. Was ich mit Choloidinſäure bezeichnet habe, iſt die Subſtanz, welche man erhält, wenn die durch Alkohol von den darin unlöslichen Stoffen befreite Galle mit einem Uebermaße von Salzſäure im Sieden erhalten wird. Dieſe Subſtanz enthält allen Kohlenſtoff und Waſſerſtoff der Galle, bis auf diejenige Mengen dieſer Elemente, welche in der Form von Taurin und Ammoniak ausgetreten ſind. Die Cholinſäure enthält die Beſtandtheile der Galle, von denen ſich die Elemente des kohlenſauren Ammoniaks getrennt haben.

Diese drei Stoffe enthalten also die Producte der Metamorphose der ganzen Galle, ihre Formeln drücken die Anzahl der Elemente ihrer Bestandtheile aus. Keiner davon ist in der Form, in der wir ihn gewinnen, fertig gebildet in der Galle enthalten; ihre Elemente sind in einer andern Weise mit einander verbunden wie in der Galle, allein die Art, wie sie geordnet sind, hat auf die Festsetzung ihres relativen Verhältnisses durch die Analyse nicht den geringsten Einfluß. In der Formel selbst liegt demnach keine Hypothese, sie ist ein reiner Ausdruck der Analyse. Aus wieviel verschiedenen Substanzen die Choleinsäure, Choloidinsäure u. s. w. auch bestehen mag, die relative Anzahl ihrer Elemente zusammengenommen wird durch die aufgefundene Formel ausgedrückt.

Die Untersuchung der Producte, welche aus der Galle durch die Einwirkung der Luft und chemischer Agentien hervorgebracht werden, können für pathologische Zustände von Wichtigkeit werden, allein bis auf das allgemeine Verhalten der Galle ist die Kenntniß dieser Producte dem Physiologen völlig unnütz, es ist eine Last, die ihm das Voranschreiten erschwert. Von keinem einzigen der 38 oder 40 Stoffe, in die man die Galle zerlegt hat, läßt sich mit Gewißheit behaupten, daß er fertig gebildet darin enthalten ist, von den meisten weiß man mit Bestimmtheit, daß sie Erzeugnisse der Materien sind, die man darauf einwirken ließ.

Die Galle enthält Natron, allein sie ist eine Natronverbindung der merkwürdigsten Art; wenn wir ihre in Alkohol

löslichen organischen Bestandtheile an Bleioxyd binden und das Bleioxyd wieder davon scheiden, so haben wir einen Körper (Choleinsäure), der mit Natron zusammengebracht eine der Galle dem Geschmacke nach ähnliche Verbindung wieder bildet, allein es ist keine Galle mehr; die Galle kann mit Pflanzensäuren, ja mit verdünnten Mineralsäuren, vermischt werden, ohne Trübung, ohne einen Niederschlag zu bilden, während die ebenerwähnte Verbindung der Choleinsäure durch die schwächsten Säuren zersetzt und alle Choleinsäure wieder abgeschieden wird. Die Galle ist demnach keineswegs als choleinsaures Natron zu betrachten. In welchem Zustande, kann man weiter fragen, ist das Cholsterin, die Margarin- und Talgsäure, die man darin nachweis't, in der Galle enthalten? Das Cholsterin ist in Wasser nicht löslich, mit Alkalien nicht verseifbar, die Verbindungen der genannten, fetten Säuren mit Alkalien, wären sie wirklich als Seifen in der Galle enthalten, sie müßten durch Säuren mit der größten Leichtigkeit abgeschieden werden. Allein es erfolgt durch verdünnte Säuren keine Abscheidung von Margarin- oder Talgsäure.

Es ist möglich, daß in neuen und wiederholten Untersuchungen Abweichungen in der procentischen Zusammensetzung, von der in den analytischen Entwicklungen gegebenen sich herausstellen werden, allein auf die Formel selbst kann dies nur von geringem Einfluß sein; wenn das relative Verhältniß des Kohlenstoffs zum Stickstoff sich nicht ändert, so werden sich diese Abweichungen auf den Sauerstoff uud Wasserstoffgehalt beschränken; man wird alsdann für die Ausein-

anderſetzungen in Formeln annehmen müſſen, daß mehr Waſſer oder mehr Sauerſtoff, oder weniger Waſſer und weniger Sauerſtoff an der Metamorphoſe der Gebilde Antheil nehmen, allein die Wahrheit der Entwicklungen ſelbſt wird hierdurch nicht gefährdet.

Note 32. Seite 137.

Zuſammenſetzung der Cholinſäure †)

	Dumas	berechnet $C_{74}H_{120}O_{18}$
Kohlenſtoff	68,5	68,9
Waſſerſtoff	9,7	9,2
Sauerſtoff	21,8	21,9

†) Ebendaſelbſt Bd. XXVII. S. 295.

Note 33. S. 139.

Zuſammenſetzung der Hauptbeſtandtheile des Harns der Menſchen und Thiere.

Harnſäure.

	Liebig †) *	Mitſcherlich ††)	berechnet $C_{10}H_8N_8O_6$
Kohlenſtoff . . .	36,083	35,82	36,00
Waſſerſtoff . . .	2,441	2,38	2,36
Stickſtoff	33,361	34,60	33,37
Sauerſtoff . . .	28,126	27,20	28,27

†) Annal. der Pharm. Bd. X. S. 47.

††) Poggend. Annal. Bd. XXXIII. S. 335.

Alloxan †).

Product der Oxydation der Harnſäure.

	Wöhler u. L. *		berechnet $C_8H_8N_4O_{10}$
Kohlenſtoff	30,38	30,18	30,34
Waſſerſtoff	2,57	2,48	2,47
Stickſtoff	17,96	17,96	17,55
Sauerſtoff	49,09	49,38	49,64

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVI. S. 260.

Harnſtoff.

	Prout †)	Wöhler u. Liebig ††)	berechnet $C_2N_4H_8O_4$
Kohlenſtoff	19,99	20,02	20,192
Waſſerſtoff	6,65	6,71	6,595
Stickſtoff	46,65	46,73	46,782
Sauerſtoff	26,63	26,54	26,425

†) Thoms. Ann. T. XI. p. 352.

††) Poggend. Ann. Bd. XX. S. 375.

Kryſtalliſirte Hippurſäure.

	Liebig †) *	Dumas ††)	Mitſcherlich †††)	berechnet $C_{18}N_2H_{16}O_5$
Kohlenſtoff . . .	60,742	60,5	60,63	60,76
Waſſerſtoff . . .	4,959	4,9	4,98	4,92
Stickſtoff	7,816	7,7	7,90	7,82
Sauerſtoff . . .	26,483	26,9	26,49	26,50

†) Annal. d. Pharm. Bd. XII. S. 20.

††) Ann. de Chim. et de Phys. T. LVII. p. 327.

†††) Pogg. Ann. Bd. XXXIII. S. 335.

Allantoin†)

	Wöhler u. Liebig*	berechnet $C_8N_8H_{12}O_6$
Kohlenſtoff	30,60	30,66
Waſſerſtoff	3,83	3,75
Stickſtoff	35,45	35,50
Sauerſtoff	30,12	30,09

†) Ann. der Pharm. Bd. XXVI. S. 215.

Harnoxyd†)

	Wöhler u. J. L.*	berechnet $C_5H_4N_4O_3$
Kohlenſtoff . . .	39,28	39,86
Waſſerſtoff	2,95	2,60
Stickſtoff	36,35	37,72
Sauerſtoff	21,24	20,82

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVI. S. 344.

Cyſticoxyd†)

	Thaulow*	berechnet $C_5N_2H_{12}O_4S_2$
Kohlenſtoff	30,01	30,31
Waſſerſtoff	5,10	4,94
Stickſtoff	11,00	11,70
Sauerſtoff	28,38	46,47
Schwefel	25,51	26,58

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVII. S. 200.

Das Cyſtic-Oxyd iſt durch ſeinen Schwefelgehalt ganz beſonders ausgezeichnet vor allen anderen in der Harnblaſe vorkommenden Concretionen. Es läßt ſich mit Beſtimmtheit

darthun, daß der Schwefel in dieſem Körper weder im oxydirten Zuſtande noch in der Form einer Cyanverbindung enthalten iſt, und in dieſer Beziehung iſt die Bemerkung vielleicht nicht ohne Intereſſe, daß 4 Atome Cyſtic-Oxyd die Elemente von Harnſäure, Benzoeſäure, Schwefelwaſſerſtoff und Waſſer enthalten, lauter Subſtanzen, deren Erzeugbarkeit im Thierorganismus keinem Zweifel unterliegt.

1 At.	Harnſäure	$C_{10}N_8H_8O_6$
1 »	Benzoeſäure	$C_{14}H_{10}O_2$
8 »	Schwefelwaſſerſtoff . .	$H_{16}S_8$
7 »	Waſſer	$H_{14}O_7$

1 At. Cyſticoxyd $= C_{24}N_8H_{48}O_{16}S_8 = 4(C_6N_2H_{12}O_4S_2)$

Ein vortreffliches Mittel, um bei Harnſteinen die Gegenwart des Cyſticoxyds darzuthun iſt folgendes:

Man löſ't den fraglichen Harnſtein in ſtarker Kalilauge auf und ſetzt einige Tropfen eſſigſaures Bleioxyd hinzu, nicht mehr als Bleioxyd in Auflöſung erhalten werden kann. Beim Kochen dieſer Miſchung entſteht ein ſchwarzer Niederſchlag von Schwefelblei, der ihr das Anſehen von Dinte giebt. Es entwickelt ſich hierbei eine reichliche Menge Ammoniak; die alkaliſche Flüſſigkeit enthält unter anderen Producten Oxalſäure.

Note 34. Seite 139.

Zuſammenſetzung der Oxalſäure, Oxalurſäure und der Parabanſäure

Oxalſäure.

	Gay-Luſſ. u. Thenard	Bertholl.	berechnet $C_2H_2O_4$
Kohlenſtoff . . .	26,566	25,13	26,66
Waſſerſtoff . . .	2,745	3,09	2,22
Sauerſtoff . . .	70,689	71,78	71,12

Oxalurſäure †).

	Wöhler u. Liebig*		berechnet $C_6H_6N_4O_6$
Kohlenſtoff . . .	27,600	27,318	27,59
Waſſerſtoff . . .	3,122	3,072	3,00
Stickſtoff . . .	21,218	21,218	21,29
Sauerſtoff . . .	48,060	48,392	48,12

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVI. S. 289.

Parabanſäure †).

	Wöhler u. Liebig*		berechnet $C_6H_4N_4O_6$
Kohlenſtoff . . .	31,95	31,940	31,91
Waſſerſtoff . . .	2,09	1,876	1,73
Stickſtoff	24,66	24,650	24,62
Sauerſtoff . . .	41,30	41,534	41,74

†) Ebendaſelbſt S. 286.

Note 35. S. 141.

Zuſammenſetzung des gebratenen Fleiſch's.

(1) 0,307 Subſtanz gaben 0,584 Kohlenſäure und 0,206 Waſſerſtoff
(2) 0,255 » » 0,485 » » 0,181 »
(3) 0,179 » » 0,340 » » 0,125 »

	Rehfleiſch (1) Boeckmann *	Ochſenfleiſch (2) Playfair *	Kalbfleiſch (3) Playfair *
Kohlenſtoff . . .	52,60	52,590	52,52
Waſſerſtoff . . .	7,45	7,886	7,87
Stickſtoff	15,23	15,214	14,70
Sauerſtoff, Aſche . .	24,72	24,310	24,91

Note 36. S. 144.

Die Formel $C_{27}H_{42}N_9O_{10}$ giebt nämlich in 100 Theilen:

C_{27}	50,07
H_{42}	6,35
N_9	19,32
O_{10}	24,26

Die Zuſammenſetzung des Leims ſ. Note 28.

Note 37. S. 158.

Zuſammenſetzung der Lithofellinſäure †)

	Ettling u. Will *			Wöhler	berechnet $C_{40}H_{72}O_8$
Kohlenſtoff	71,19	70,80	70,23	70,83	70,83
Waſſerſtoff	10,85	10,78	10,95	10,60	10,48
Stickſtoff	17,96	18,42	18,92	18,57	18,69

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XXXIX. S. 242. Bd. XLI. S. 154.

Note 38. Seite 181.

Zuſammenſetzung des Solanins aus Kartoffelkeimen †).

	Blanchet *
Kohlenſtoff	62,11
Waſſerſtoff	8,92
Stickſtoff	1,64
Sauerſtoff	27,33

†) Annal. der Pharm. Bd. VII. S. 150.

Note 39. Seite 181.

Zuſammenſetzung des Picrotoxins †).

	Francis *
Kohlenſtoff	60,26
Waſſerſtoff	5,70
Stickſtoff	1,30
Sauerſtoff	32,74

†) In einer andern Analyſe erhielt Francis 0,75 pCt. Stickſtoff. Das zu den Analyſen verwandte Picrotoxin war theilweiſe aus der Fabrik des Herrn Merck in Darmſtadt, theils von Herrn Francis dargeſtellt; es war vollkommen weiß und ſchön kryſtalliſirt. — Regnault fand bekanntlich keinen Stickſtoff in dem Picrotoxin.

Note 40. Seite 181.

Zuſammenſetzung des Chinins.

	*	Z. L. *	berechnet $C_{20}H_{24}N_2O_2$
Kohlenſtoff	. .	75,76	74,39
Waſſerſtoff	. .	7,52	7,25
Stickſtoff	. . .	8,11	8,62
Sauerſtoff	. .	8,62	9,64

Note 41. Seite 182.

Zuſammenſetzung des Morphins †).

	Liebig*	Regnault		berechnet $C_{35}H_{40}N_2O_6$
Kohlenſtoff . .	72,340	72,87	72,41	72,28
Waſſerſtoff . .	6,366	6,86	6,84	6,74
Stickſtoff . . .	4,995	5,01	5,01	4,80
Sauerſtoff . .	16,299	15,26	15,74	16,18

†) Annal. der Pharm. Bd. XXVI. S. 23.

Note 42. Seite 182

Zuſammenſetzung des Caffeins, Theins und Guaranins †).

	Caffein Pfaff u. Liebig*	Thein Jobſt	Guaranin Martius	berechnet $C_8H_{10}N_4O_2$
Kohlenſtoff . .	49,77	50,101	49,679	49,798
Waſſerſtoff . .	5,33	5,214	5,139	5,082
Stickſtoff . . .	28,78	29,009	29,180	28,832
Sauerſtoff . .	16,12	15,676	16,002	16,288

†) Annal. d. Pharm. Bd. I. S. 17, Bd. XXV. S. 63 u. Bd. XXVI. S. 95.

Note 43. Seite 182.

Zuſammenſetzung des Theobromins †).

	Woskreſensky			berechnet $C_8H_{10}N_4O_2$
Kohlenſtoff . .	47,21	46,97	46,71	46,43
Waſſerſtoff . .	4,53	4,61	4,52	4,21
Stickſtoff . . .	35,38	35,38	35,38	35,85
Sauerſtoff . .	12,88	13,04	13,39	13,51

†) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XLI. S. 125

Zuſammenſetzung des Aſparagins †).

	Liebig *	berechnet $C_8H_{16}N_4O_6 + 2aq.$
Kohlenſtoff . . .	32,351	32,35
Waſſerſtoff . . .	6,844	6,60
Stickſtoff . . .	18,734	18,73
Sauerſtoff . . .	42,021	42,32

†) Annal. der Pharm. Bd. VII. S. 146.

Ueber

Verwandlung der Benzoesäure in Hippursäure*).

Von

Wilhelm Keller aus Grosheim.

(Aus den Annalen der Chemie und Pharmacie.)

Schon in der früheren Ausgabe von Berzelius' Lehrbuch der Chemie (1831 Bd. IV. S. 376) hatte Herr Professor Wöhler die Vermuthung ausgesprochen, daß die Benzoesäure bei der Verdauung wahrscheinlich in Hippur-

*) Zu den Beweisen, welche Ure für die Umwandlung der Benzoesäure in Hippursäure im menschlichen Körper angegeben hat, sind durch Herrn Keller einige ganz entscheidende gekommen, die ich ihrer physiologischen Wichtigkeit wegen diesem Buche beigebe. Die Versuche des Herrn Keller sind in dem Laboratorium des Herrn Prof. Wöhler in Göttingen angestellt worden; sie setzen die Thatsache außer allen Zweifel, daß ein in der Nahrung genossener stickstofffreier Körper an dem Act der Umsetzung der thierischen Gebilde und an der Bildung eines Secretes durch seine Bestandtheile Antheil nehmen kann. Diese Thatsache verbreitet auf die Wirkung der meisten Arzneimittel ein unzweideutiges Licht, und wenn sich der Einfluß des Caffeins auf die Bildung des Harnstoffs oder der Harnsäure in einer ähnlichen Weise nachweisen läßt, so ist damit der Schlüssel zu der Wirkung des Chinins und der anderen organischen Basen gegeben. J. L.

säure umgewandelt werde. Diese Vermuthung gründete sich auf einen Versuch, den derselbe über den Uebergang der Benzoesäure in den Harn angestellt hatte. Er fand in dem Harne eines Hundes, der mit dem Futter ½ Drachme Benzoesäure gefressen hatte, eine in nadelförmigen Prismen krystallisirende Säure, die im Allgemeinen die Eigenschaften der Benzoesäure hatte und die er auch für solche hielt (Tiedemann's Zeitschrift für Physiologie Bd. I. S. 142). Indessen waren diese Krystalle offenbar Hippursäure, wie aus der Angabe, daß sie wie Salpeter ausgesehen und bei der Sublimation Kohle hinterlassen hätten, deutlich hervorgeht. Allein die Hippursäure war damals noch nicht entdeckt und es ist bekannt, daß sie bis 1829, wo sie zuerst von Liebig unterschieden wurde, allgemein mit der Benzoesäure verwechselt worden ist.

Die neuerlich publicirte Angabe von Ure *), daß er in dem Harne eines Patienten, der Benzoesäure eingenommen hatte, wirklich Hippursäure gefunden habe, brachte dieses in physiologischer Hinsicht so wichtige Verhalten wieder in Erinnerung und gab zu den folgenden Versuchen Veranlassung, die ich auf den Vorschlag des Herrn Professors Wöhler an mir selbst angestellt habe. Seine Vermuthung ist dadurch unzweideutig bestätigt worden.

Ich nahm Abends vor dem Schlafengehen mit Zuckersyrup 2 Gramme (ungefähr 32 Gran) reine Benzoesäure.

*) Pharmac. Centralblatt No. 46, aus Prov. med. and. surg. Journ. 1841.

In der Nacht gerieth ich in Schweiß, was wohl eine Wirkung dieser Säure sein mochte, da ich sonst nur sehr schwer in stärkere Transpiration komme. Eine andere Wirkung konnte ich nicht wahrnehmen, selbst als ich auch an den folgenden Tagen dieselbe Dosis dreimal täglich zu mir nahm, wo auch nicht einmal der Schweiß wieder eintrat.

Der am Morgen gelassene Harn reagirte ungewöhnlich stark sauer und zwar selbst noch, nachdem er abgedampft worden war und 12 Stunden lang gestanden hatte. Er setzte dabei nur das gewöhnliche Sediment von Erdsalzen ab. Als er aber mit Salzsäure vermischt und stehen gelassen wurde, bildeten sich darin lange, prismatische, braungefärbte Krystalle in großer Menge, die schon dem Ansehen nach nicht für Benzoesäure zu halten waren. Ein anderer Theil, der durch Abdampfen bis zur Syrupsdicke concentrirt war, verwandelte sich beim Vermischen mit Salzsäure in ein Magma von Krystallblättchen. Diese so erhaltene krystallinische Substanz wurde ausgepreßt, in siedendem Wasser gelöst, mit Thierkohle behandelt und umkrystallisirt. Sie wurde dadurch in farblosen, zollangen Prismen erhalten.

Diese Krystalle waren reine Hippursäure. Beim Erhitzen schmolzen sie leicht, bei etwas stärkerer Hitze verkohlte sich die Masse unter Entwicklung eines Geruchs nach Bittermandelöl und unter Sublimation von Benzoesäure. Um jeden Zweifel zu beseitigen, bestimmte ich ihren Kohlenstoffgehalt, 0,3 Grm. gaben 60,4 pCt. Kohlenstoff. Nach der Formel $C_{18} H_{16} N_2 O_5 + aq.$ enthält die krystallisirte Hip-

pursäure 60,67 pCt. Kohlenstoff, die krystallisirte Benzoesäure dagegen enthält 69,10 pCt. Kohlenstoff.

So lange ich das Einnehmen der Benzoesäure fortsetzte, konnte ich aus dem Harne mit Leichtigkeit und in Menge Hippursäure darstellen, und da die Benzoesäure so ohne allen Nachtheil für die Gesundheit zu sein scheint, so wäre es leicht, sich auf diese Weise größere Mengen von Hippursäure zu verschaffen. Man könnte sich dazu eine Person halten, die Wochen lang diese Fabrication fortsetzen müßte.

Es war wichtig, den Harn, welcher Hippursäure enthielt, auf seine beiden normalen Hauptbestandtheile, den Harnstoff und die Harnsäure, zu untersuchen. Sie waren beide darin enthalten, und, dem Anschein nach, in keiner andern Quantität, als im normalen Harn.

Als der durch Abdampfen concentrirte Harn, aus dem durch Salzsäure die Hippursäure geschieden war, mit Salpetersäure vermischt wurde, setzte er eine große Menge salpetersauren Harnstoff ab. Schon vorher hatte er ein pulveriges Sediment fallen lassen, dessen Auflösung in Salpetersäure bei dem Abdampfen auf Porzellan die bekannte, purpurrothe Reaction der Harnsäure gab. Diese Beobachtung widerspricht der Angabe von Ure, und es ist daher wohl etwas zu voreilig, wenn er die Benzoesäure als Mittel gegen die aus Harnsäure bestehenden Gicht- und Harn-Concretionen empfiehlt; er scheint sich vorzustellen, daß die Harnsäure zur Umwandlung der Benzoesäure in Hippursäure verwendet werde. Da er seine Beobachtung an dem Harn ei-

ner Arthritischen machte, so ist anzunehmen, daß dieser Harn auch ohne den innern Gebrauch der Benzoesäure keine Harnsäure enthalten haben würde. — Uebrigens ist es klar, daß die Hippursäure, da sie sich erst nach Zusatz einer Säure abscheidet, an eine Basis gebunden, im Harne enthalten ist.

Druckfehler.

Seite 61 Zeile 5 v. o. anstatt venösem setze arteriellem.
» 65 » 12 v. o. anstatt Pferd lese man Ochse.